

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Paragol® N**

**Streuli Pharma AG**

### ***Che cos'è Paragol N e quando si usa?***

Paragol N è un lassativo con l'agente attivo, la paraffina liquida che può ammolliare e lubrificare i feci ma anche stimolare la motilità intestinale. Tutto questo porta ad un miglioramento e ad una normalizzazione delle feci. E' assolutamente necessario bere molto durante l'uso di Paragol N.

Paragol N serve al trattamento di costipazione occasionale. La cura in nessun caso deve durare più di 10 giorni e deve essere intrapresa solo se un cambiamento dell'alimentazione con una dieta prevalentemente ricca di verdure e frutta non ha dato risultati positivi.

Paragol N può essere usato per corti periodi in caso di malattie che richiedono un alleggerimento della defecazione delle feci (per es. emorroidi, malattie all'uscita intestinale).

### ***Quando non si può assumere/usare Paragol N?***

Paragol N non va usato in nessun caso quando esiste una malattia grave al basso ventre (appendicite, spasmi intestinali e forti dolori al ventre).

Paragol N non deve essere assunto in caso d'ipersensibilità all'agente attivo o ad una delle sostanze ausiliarie.

### ***Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Paragol N?***

Paragol N dovrebbe essere preso solo occasionalmente e per periodi che non dovrebbero oltrepassare 10 giorni. Un trattamento prolungato deve essere controllato dal medico.

#### ***Alginato di glicole propilenico***

Questo medicamento contiene 12,306 mg di alginato di glicole propilenico per misurino (5 ml) corrispondenti a 2,46 mg di alginato di glicole propilenico per ml.

#### ***Metilidrossi benzoato (E 218)***

Questo medicamento contiene Metilidrossi benzoato (E 218). Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

#### ***Saccarosio***

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

#### ***Etanolo***

Questo medicamento contiene piccole quantità di etanolo. La piccola quantità di alcol in questo medicamento non produrrà effetti rilevanti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.



## ***Si può assumere/usare Paragol N durante la gravidanza o l'allattamento?***

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento.

Se siete incinta o volete diventarlo, potrete prendere Paragol N solamente dopo aver consultato il medico.

Questo medicamento non va impiegato durante l'allattamento; si consiglia pertanto di sospenderlo o di rinunciare all'allattamento al seno.

## ***Come usare Paragol N?***

Salvo diversa prescrizione medica:

### ***Adulti e adolescenti oltre i 12 anni***

3-9 (= 15-45 ml) misurini prima di dormire, se necessario, la mattina a digiuno la stessa dose.

### ***Bambini sotto i 12 anni***

Prendere Paragol N solo secondo la prescrizione del medico.

### ***Bambini a partire da 2 anni***

1-3 (= 5-15 ml) misurini secondo l'età prima di dormire.

### ***Bambini al di sotto dei 2 anni***

L'utilizzo e la sicurezza nei bambini sotto i 2 anni non sono stati esaminati. Pertanto, questo medicamento non deve essere impiegato in questa fascia d'età.

Agitare prima dell'uso. Nel corso della conservazione, può verificarsi una separazione delle fasi dell'emulsione. Il prodotto può essere nuovamente omogeneizzato agitando. Paragol N deve essere preso solo in posizione dritta.

Paragol N può essere assunto non diluito, ma anche con acqua, succhi di frutta o altre bevande.

Non aumentare le dosi se il medicamento non ha effetto immediato. Paragol N comincia a fare effetto dopo 6-8 ore, quindi il mattino dopo.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

## ***Quali effetti collaterali può avere Paragol N?***

Con l'assunzione di Paragol N possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Un trattamento prolungato o un dosaggio troppo alto può causare una mancanza di vitamine liposolubili oltre a una mancanza di acqua e di sali minerali. In caso di un dosaggio troppo alto spesso la paraffina liquida può trapeolare attraverso l'ano e raramente un prurito nella regione anale è possibile.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

## ***Di che altro occorre tener conto?***

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Conservare alla temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

## ***Cosa contiene Paragol N?***

### ***Principi attivi***

5 ml di emulsione orale contengono: 1,9 g di Paraffina liquida



### ***Sostanze ausiliarie***

Gomma arabica nebulizzato essiccato (E 414), Acido citrico monoidrato (E 330), alginato di glicole propilenico (E 405), Gomma adragante (E 413), Vanillina, Saccarina (E 954), aroma di bergamotto/aroma di pera (contiene basse quantità di etanolo e olio di bergamotto), Saccarosio, Metilidrossi benzoato (E 218), acqua purificata.

### ***Numero dell'omologazione***

55041 (Swissmedic)

### ***Dove è ottenibile Paragol N? Quali confezioni sono disponibili?***

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni da 200 ml, 500 ml e 1000 ml.

### ***Titolare dell'omologazione***

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

