

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Anginova® Pastilles

Medinova AG

Qu'est-ce que Anginova et quand doit-il être utilisé?

Anginova est utilisé dans le traitement local des maladies inflammatoires aiguës de la cavité bucco-pharyngée telles que maux de gorge, troubles de la déglutition, muguet buccal (infection à Candida), aphtes, et comme traitement associé en cas d'angine.

Anginova contient deux principes actifs: le chlorure de déqualinium agit sur la plupart des bactéries et champignons impliqués dans les infections de la bouche et du pharynx ainsi que sur les levures (Candida). La lidocaïne atténue la douleur et soulage les troubles de la déglutition.

Quand Anginova ne doit-il pas être utilisé?

Anginova ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un de ses composants.

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Anginova?

Anginova ne doit pas être utilisé juste avant ou après le brossage des dents, car son efficacité est réduite par le dentifrice. En cas de fièvre élevée ou si aucune amélioration n'est constatée au bout d'une semaine, consultez un médecin.

Les pastilles Anginova contiennent de la lactose (sucre de lait) et de la glucose. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre Anginova si vous savez que vous souffrez d'une intolérance au sucre.

Anginova contient 1,031 mg de fructose par pastille.

En outre, Anginova contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par pastille, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Anginova peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par mesure de précaution, si vous êtes enceinte ou désirez le devenir, vous devez renoncer dans la mesure du possible à prendre des médicaments ou demander conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Pendant la grossesse ou l'allaitement, vous ne devez pas prendre Anginova sans avoir consulté votre médecin.

Comment utiliser Anginova?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans:

En l'absence de prescription particulière du médecin, laisser fondre une pastille dans la bouche toutes les deux heures, sans dépasser douze pastilles par jour.



À ce jour, l'utilisation et la sécurité d'Anginova n'ont pas été étudiées chez l'enfant de moins de 12 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Anginova peut-il provoquer?

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester lors de la prise d'Anginova:

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

Des réactions d'hypersensibilité

En cas de réactions d'hypersensibilité, le médicament ne doit plus être pris.

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10'000)

Irritation de la muqueuse buccale, éruption cutanée

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste). Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à 15-30 °C.

Conserver le médicament hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Anginova?

Principes actifs

1 pastille contient:

chlorure de déqualinium 0,25 mg, chlorhydrate de lidocaïne monohydrate 1 mg.

Excipients

Lactose, cyclamate de sodium, povidone, dibéhénate de glycéryle, arôme de menthe poivrée (contient: glucose, fructose et sodium)

Numéro d'autorisation

30003 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Anginova? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Anginova est disponible en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballages de 20 pastilles.

Titulaire de l'autorisation

Medinova AG, 8050 Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

