

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Anginova® Pastiglie

Medinova AG

Che cos'è Anginova e quando si usa?

Anginova si usa per il trattamento locale di malattie infettive acute del cavo oro-faringeo, come mal di gola, difficoltà di deglutizione, infezione da Candida (mughetto) e afte, nonché come trattamento coadiuvante nell'angina.

Anginova contiene due principi attivi: il dequalinio cloruro, attivo contro la maggior parte dei batteri e dei funghi che provocano infezioni nella bocca e nella gola, nonché contro i saccaromiceti (Candida), e la lidocaina, che ha un'azione analgesica e allevia le difficoltà di deglutizione.

Quando non si può usare Anginova?

Anginova non dovrebbe essere usato in casi di riconosciuta ipersensibilità contro uno dei componenti.

Non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Anginova?

Non si deve usare Anginova poco prima o poco dopo aver lavato i denti, perché il dentifricio ne compromette l'efficacia. In caso di febbre alta o se non si registrano miglioramenti entro una settimana, è necessario rivolgersi al medico.

Le pastiglie Anginova contengono lattosio e glucosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Anginova.

Anginova contiene 1'031 mg di fruttosio per pastiglia.

Anginova contiene inoltre meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per pastiglia, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Anginova durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o progetta una gravidanza, per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o al droghiere. Durante la gravidanza e il periodo d'allattamento Anginova può essere preso solo con il consenso del medico.

Come usare Anginova?

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:

Salvo diversa prescrizione medica, sciogliere in bocca una compressa ogni due ore, per un massimo di dodici pastiglie al giorno.

L'uso e la sicurezza di Anginova nei bambini di età inferiori a 12 anni finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere Anginova?

Con l'assunzione di Anginova possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Reazioni di ipersensibilità

In caso di ipersensibilità sospendere l'assunzione del medicamento.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Irritazioni della mucosa orale, eruzioni cutanee.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a 15-30 °C.

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Anginova?

Principi attivi

Una pastiglia contiene:

dequalinio cloruro 0,25 mg, lidocaina cloridrato monoidrato 1 mg

Sostanze ausiliarie

Lattosio, sodio ciclamato, povidone, glicerolo dibeenato, aroma menta piperita (contiene glucosio, fruttosio e sodio)

Numero dell'omologazione

30003 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Anginova? Quali confezioni sono disponibili?

Anginova è ottenibile in farmacia o in drogheria senza prescrizione medica.

Confezioni da 20 pastiglie.

Titolare dell'omologazione

Medinova AG, 8050 Zurigo

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

