Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista, al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucokehl® D4, capsule

Medicamento omeopatico

Quando si usa Mucokehl® D4, capsule?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici Mucokehl® D4, capsule può essere usato in caso di disturbi della circolazione.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Mucokehl® D4, capsule. Se i sintomi persistono, bisogna consultare un medico. Qualora compaiano improvvisamente o persistano a lungo sintomi quali polso irregolare, forti palpitazioni, dolori lancinanti alla regione toracica e dispnea, è indicato consultare un medico che appurerà se il cuore o i vasi sanguigni presentino alterazioni organiche o se i disturbi siano di natura nervosa.

Quando non si può usare Mucokehl® D4, capsule e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Mucokehl® D4, capsule non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità alla penicillina. Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

– soffre di altre malattie
– soffre di allergie o
– assume o applica esternamente altri medicamenti (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Mucokehl® D4, capsule durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Mucokehl® D4, capsule?

Salvo diversa prescrizione medica, prendere 1 – 3 capsule ogni giorno prima della collazione o alla sera prima di coricarsi, con un po' di liquido. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo/bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Mucokehl® D4, capsule?

In seguito all’assunzione di Mucokehl® D4, capsule possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: in casi molto rari, reazioni allergiche quali prurito, arrossamenti cutanei, difficoltà respiratorie. In casi di questo genere, si deve subito sospendere il medicamento e consultare immediatamente il medico. Se osserva effetti collaterali non menzionati, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l’assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l’aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucokehl® D4, capsule e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?
Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con “verwendbar bis” sulla confezione. Conservare il medicamento fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucokehl® D4, capsule?
1 capsula contiene:
330 mg Mucor racemosus D4 trituratio (HAB; 6).
Questo preparato contiene inoltre sostanze ausiliarie: lattosio, capsula: ipromellosa.

Numero dell’omologazione
50229 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucokehl® D4, capsule? Quali confezioni sono disponibili?
In farmacia senza prescrizione medica.
Confezione da 20 capsule.

Titolare dell’omologazione
ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l’ultima volta nel febbraio 2004 dall’autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).