

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Coryzalia[®], compresse rivestite

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Coryzalia?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Coryzalia può essere usato in caso di raffreddore.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Coryzalia.

Quando non si può usare Coryzalia e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Contiene 273,5 mg di saccarosio per ogni dose. Questo elemento deve essere considerato per i pazienti affetti da diabete mellito. Può essere nocivo per i denti.

Se il suo medico l'ha informata che lei soffre di un'intolleranza ad alcuni zuccheri, si metta in contatto con lui prima di assumere questo medicamento.

Coryzalia non deve essere usato se lei o il suo bambino soffrite di ipersensibilità al cromo o se siete allergici a una delle sostanze attive o agli altri componenti contenuti nel medicamento.

Non somministrare ai bambini di meno di 6 anni di età, per via del rischio di soffocamento legato alla forma farmaceutica.

Consultare un medico nel caso in cui i sintomi persistano oltre 7 giorni o si aggravino oppure in caso di apparizione dei seguenti sintomi:

- febbre alta (superiore a 38,5 °C),
- forte tosse,
- difficoltà a respirare,
- dolori o suppurazione dell'orecchio,
- secrezioni purulente dagli occhi,
- gonfiore della palpebra,
- disturbi digestivi (difficoltà di alimentazione, vomito, diarrea).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere Coryzalia durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Coryzalia?

Non somministrare ai bambini di meno di 6 anni di età, per via del rischio di soffocamento legato alla forma farmaceutica.

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti e bambini a partire dai 6 anni di età: succhiare lentamente 1 compressa ogni ora. Poi, distanziare le somministrazioni in funzione del miglioramento. Non oltrepassare 8 compresse al giorno.

Interrompere il trattamento alla scomparsa dei sintomi.

Le compresse devono essere succhiate lentamente lontano dai pasti. Non bere né mangiare nei 10 minuti che precedono o seguono la somministrazione. Per i bambini, se necessario, schiacciare le compresse in un po' d'acqua.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Coryzalia?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Coryzalia e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Coryzalia.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Coryzalia?

Una compressa rivestita di 300 mg contiene:

Principi attivi

Allium cepa (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10): 0.333 mg

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10): 0.333 mg

Gelsemium (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10): 0.333 mg

Kalium bichromaticum (Ph.Eur.Hom) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 3.1.3): 0.333 mg

Pulsatilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10): 0.333 mg

Sabadilla (Ph.Fr.) 3 CH (Ph.Eur.Hom. 1.1.10): 0.333 mg

Sostanze ausiliarie

Saccarosio (273,5 mg), talco, gomma arabica, stearato di magnesio, gelatina, cera bianca, cera di carnauba.



Numero dell'omologazione

44250 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Coryzalia? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione di 40 compresse rivestite.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA, CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA, Francia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

