

Informazioni importanti sugli oppioidi come Morphini HCl Streuli gocce orali:

- **Dipendenza e abuso:** in caso di uso ripetuto di oppioidi come Morphini HCl Streuli gocce orali si può sviluppare tolleranza e dipendenza fisica e/o psicologica e può verificarsi un abuso.
- **Problemi respiratori:** con l'uso di Morphini HCl Streuli gocce orali la respirazione può diventare pericolosamente lenta o superficiale e la pressione sanguigna può diminuire. In tal caso, si rivolga al Suo medico.
- **Uso concomitante con alcol e altri medicinali:** l'uso concomitante di Morphini HCl Streuli gocce orali con alcol e altri medicinali che possono causare sonnolenza aumenta il rischio di insorgenza di effetti collaterali pericolosi e potenzialmente letali.
- **Uso involontario:** la somministrazione accidentale di Morphini HCl Streuli gocce orali, in particolare nei bambini, può causare un sovradosaggio mortale.
- **Gravidanza:** l'uso prolungato di Morphini HCl Streuli gocce orali in gravidanza può causare una sindrome da astinenza potenzialmente letale nel neonato qualora non venga riconosciuta e trattata tempestivamente.

Per ulteriori informazioni consultare la rubrica «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Morphini HCl Streuli gocce orali?».

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Morphini HCl Streuli® gocce orali, soluzione

Streuli Pharma AG

Che cos'è Morphini HCl Streuli gocce orali e quando si usa?

Morphini HCl Streuli gocce orali è un analgesico utilizzato per il trattamento del dolore acuto e persistente di intensità medio-elevata e/o in caso di efficacia insufficiente di altri analgesici. Contiene il principio attivo morfina. Morphini HCl Streuli gocce orali è sottoposto al controllo della legge sugli stupefacenti e Le può essere consegnato o prescritto esclusivamente sotto regolare controllo medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento Le è stato prescritto dal Suo medico per curare la Sua malattia. Non lo utilizzi perciò mai di propria iniziativa per curare altri sintomi o altre persone. Anche in caso di nuove malattie comparse in un secondo tempo non deve usare Morphini HCl Streuli gocce orali senza aver prima nuovamente consultato il medico. Come tutti gli antidolorifici, Morphini HCl Streuli gocce orali non deve essere usato per un lungo periodo e in dosi elevate senza controllo medico.

Quando non si può assumere/usare Morphini HCl Streuli gocce orali?

In caso di ipersensibilità alla morfina cloridrato o ad uno dei costituenti secondo la composizione.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Morphini HCl Streuli gocce orali?

Morphini HCl Streuli gocce orali deve essere dosato con prudenza nei pazienti affetti da disfunzioni epatiche, renali, tiroidee e surrenali e nei pazienti anziani.

Inoltre è richiesta prudenza in caso di ipertrofia prostatica, stati di shock, grave compromissione della funzione respiratoria, disfunzioni gastrointestinali, malattie epatiche acute, grave compromissione della



funzione epatica e renale, gravi traumi cranici ed elevata pressione endocranica, respirazione limitata in particolare in caso di asma, determinate forme di ipotensione arteriosa, patologie delle vie urinarie e biliari e infiammazione del pancreas, patologie intestinali infiammatorie, disturbi convulsivi, persone affette da alcolismo acuto.

Il trattamento con Morphini HCl Streuli gocce orali può ridurre la capacità di reazione. Eviti quindi di guidare o di utilizzare macchine, in particolare se si manifestano capogiri.

Durante il trattamento con Morphini HCl Streuli gocce orali si astenga dal bere alcolici.

Nei bambini al di sotto di 1 anno, Morphini HCl Streuli gocce orali può essere utilizzato soltanto con estrema prudenza.

Se deve sottoporsi a un intervento chirurgico, informi il medico dell'ospedale che Lei sta utilizzando Morphini HCl Streuli gocce orali.

Dipendenza e abuso

In caso di uso ripetuto di oppioidi come Morphini HCl Streuli gocce orali, si può sviluppare tolleranza e dipendenza fisica e/o psicologica e può verificarsi un abuso. L'abuso di Morphini HCl Streuli gocce orali può provocare un sovradosaggio potenzialmente letale ed eventualmente causare il decesso. Se teme di aver sviluppato una dipendenza da Morphini HCl Streuli gocce orali, si rivolga al Suo medico.

Problemi respiratori

Con l'uso di Morphini HCl Streuli gocce orali, la respirazione può diventare pericolosamente lenta o superficiale (depressione respiratoria) e la pressione sanguigna può diminuire. Può verificarsi una riduzione dello stato di coscienza, si può avvertire sonnolenza o si può essere prossimi allo svenimento. In tal caso, si rivolga al Suo medico. Morphini HCl Streuli gocce orali può causare disturbi respiratori correlati al sonno come apnea nel sonno (interruzioni della respirazione durante il sonno) e ipossiemia correlata al sonno (bassi livelli di ossigeno nel sangue). I sintomi possono includere interruzioni della respirazione durante il sonno, risvegli notturni per fiato corto, insonnia o eccessiva sonnolenza durante il giorno. Qualora Lei o un'altra persona osservi tali sintomi, si rivolga al Suo medico. Il Suo medico prenderà in considerazione una riduzione della dose.

Uso involontario

La somministrazione accidentale di Morphini HCl Streuli gocce orali, in particolare nei bambini, può causare un sovradosaggio mortale. Tenere Morphini HCl Streuli gocce orali fuori dalla portata dei bambini e smaltire correttamente i dosatori aperti o inutilizzati.

Gravidanza

L'uso prolungato di Morphini HCl Streuli gocce orali in gravidanza può causare una sindrome da astinenza (sindrome neonatale da astinenza da oppioidi) potenzialmente letale nel neonato qualora non venga riconosciuta e trattata tempestivamente. Informi il Suo medico se è incinta o pianifica una gravidanza. Il Suo medico deciderà se utilizzare Morphini HCl Streuli gocce orali.

Maggiore sensibilità al dolore

Si rivolga al Suo medico qualora, durante l'uso di Morphini HCl Streuli gocce orali, soffra di dolori o di maggiore sensibilità al dolore (iperalgisia) non dovuti alla prescrizione di una dose più alta del medicamento da parte del Suo medico o qualora senta dolore quando il Suo corpo entra in contatto con qualcosa che normalmente non provoca dolore (allodinia).

Insufficienza surrenalica

Debolezza, stanchezza, perdita di appetito, nausea, vomito o pressione bassa possono essere sintomi di una produzione insufficiente di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali; potrebbe essere necessario assumere un integratore ormonale.

Diminuzione degli ormoni sessuali e aumento della prolattina



L'uso prolungato di oppioidi può causare una riduzione dei livelli di ormoni sessuali e un aumento dei livelli dell'ormone della prolattina. Contatti il Suo medico qualora insorgano sintomi come riduzione della libido, impotenza o l'assenza di mestruazioni (amenorrea).

Reazioni cutanee gravi

Durante il trattamento con Morphini HCl Streuli gocce orali è stata segnalata una pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG). I sintomi si verificano generalmente nei primi 10 giorni di trattamento. Informi il Suo medico in caso di una grave eruzione cutanea, distaccamento della pelle, formazione di vesciche e/o sviluppo di piaghe in bocca dopo l'assunzione di Morphini HCl Streuli gocce orali o altri oppioidi. Interrompa l'assunzione di Morphini HCl Streuli gocce orali e si rivolga subito al Suo medico se nota uno dei seguenti sintomi: formazione di vesciche, pelle squamosa estesa o aree contenenti pus e febbre.

Dolori addominali/Infiammazione del pancreas

Si rivolga al Suo medico qualora avverta un forte dolore nella parte superiore dell'addome, che eventualmente si irradia verso la schiena, nausea, vomito o febbre, in quanto potrebbero essere sintomi associati a un'infiammazione del pancreas (pancreatite) e del sistema dei dotti biliari.

Assunzione/uso di Morphini HCl Streuli gocce orali con altri medicinali

Chieda consiglio al Suo medico prima di utilizzare Morphini HCl Streuli gocce orali con altri medicinali, in particolare i seguenti:

- rifampicina, ad es. per il trattamento della tubercolosi;
- l'effetto di un medicamento per il trattamento dei coaguli del sangue (ad es. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) può essere ritardato e ridotto in caso di concomitante assunzione di oppio.

Durante il trattamento con medicinali del gruppo degli inibitori della monoamminossidasi (determinati medicinali contro la depressione o il morbo di Parkinson) oppure entro due settimane dal termine della loro assunzione, assuma la morfina esclusivamente con molta prudenza e solo dopo aver consultato il medico.

Se assume contemporaneamente medicinali con il principio attivo cimetidina (contro la produzione eccessiva di acidi gastrici), l'effetto di Morphini HCl Streuli gocce orali può risultare rafforzato. L'uso concomitante di Morphini HCl Streuli gocce orali con alcol e altri medicinali che possono causare sonnolenza (ad es. sonniferi, medicinali per il trattamento dell'epilessia, della nevralgia o dell'ansia, alcuni medicinali per le reazioni allergiche (antistaminici) o tranquillanti (come le benzodiazepine)) aumenta il rischio di insorgenza di effetti collaterali pericolosi e potenzialmente letali. Informi il Suo medico su tutti i medicinali che assume e segua precisamente le dosi raccomandate dal Suo medico.

Il rischio di effetti collaterali aumenta se assume Morphini HCl Streuli gocce orali contemporaneamente a antidepressivi (come citalopram, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina). Si rivolga al Suo medico se insorgono i seguenti sintomi: alterazioni dello stato di coscienza (ad es. agitazione, allucinazioni, coma), battito cardiaco accelerato, pressione sanguigna instabile, febbre, aumento dei riflessi, coordinazione compromessa, rigidità muscolare, sintomi gastrointestinali (ad es. nausea, vomito, diarrea).

Informi il Suo medico o il Suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di Sua iniziativa) o li applica esternamente.

Sostanze ausiliarie di particolare interesse

Morphini HCl Streuli gocce orali può provocare reazioni allergiche, anche ritardate, a causa dei conservanti E 218 ed E 216 contenuti.

Morphini HCl Streuli gocce orali contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per 1 ml ed è, dunque, quasi «privo di sodio».



Morphini HCl Streuli gocce orali contiene 0,01 g di alcol per 1 ml. La quantità in 1 ml di questo medicamento corrisponde a meno di 0,1 ml di vino rosso. La bassa quantità contenuta in questo medicamento non ha effetti percettibili.

Si può assumere/usare Morphini HCl Streuli gocce orali durante la gravidanza o l'allattamento?

Morphini HCl Streuli gocce orali deve essere assunto in gravidanza soltanto se il Suo medico lo ritiene esplicitamente necessario. Comunichi al Suo medico se è incinta o pianifica una gravidanza.

L'uso prolungato di Morphini HCl Streuli gocce orali in gravidanza può causare una sindrome da astinenza (sindrome neonatale da astinenza da oppioidi) potenzialmente letale nel neonato qualora non venga riconosciuta e trattata tempestivamente. Informi il Suo medico se è incinta o pianifica una gravidanza. Il Suo medico deciderà se utilizzare Morphini HCl Streuli gocce orali.

Non allatti durante la terapia con Morphini HCl Streuli gocce orali.

Come usare Morphini HCl Streuli gocce orali?

In generale, il medico stabilisce la posologia adatta a Lei, che dipende da fattori individuali, ad esempio l'intensità del dolore, l'età, il peso, la presenza di determinate patologie ecc.

Tenere il flacone in posizione verticale per il corretto dosaggio delle gocce; avvitare bene il tappo dopo ogni utilizzo.

Adulti e bambini sopra i 12 anni

La somministrazione avviene di norma ogni 4 ore o in base alle indicazioni del medico. La posologia abituale all'inizio della terapia è di 10 mg (20 gocce di Morphini HCl Streuli 10 mg/ml oppure 10 gocce di Morphini HCl Streuli 20 mg/ml) ogni 4 ore. In caso di necessità, il medico può aumentare gradatamente la posologia.

Bambini al di sotto dei 12 anni

Per i bambini al di sotto dei 12 anni, il medico stabilisce individualmente lo schema posologico in considerazione dell'età e delle circostanze.

La soluzione in gocce viene assunta con una quantità di liquido sufficiente. L'assunzione può avvenire indipendentemente dai pasti.

Rispetti rigorosamente gli orari di assunzione fissati, anche se in quel momento non ha dolore.

Se ha assunto una quantità di Morphini HCl Streuli superiore a quella prescritta

Nelle persone che hanno assunto una dose eccessiva può verificarsi una polmonite causata dall'inspirazione di vomito o corpi estranei; i sintomi possono essere insufficienza respiratoria, tosse e febbre.

Le persone che hanno assunto una dose eccessiva possono inoltre avere difficoltà respiratorie che possono provocare svenimento o perfino il decesso.

Un sovradosaggio di Morphini HCl Streuli gocce orali può causare una malattia del cervello (nota come leucoencefalopatia tossica).

Se interrompe l'assunzione di Morphini HCl Streuli

Concluda il trattamento con Morphini HCl Streuli solo dopo aver consultato il Suo medico. Se desidera concludere il trattamento con Morphini HCl Streuli, chiedi al Suo medico come può ridurre lentamente la dose in modo da poter evitare sintomi di astinenza.

Sintomi di astinenza possono essere dolori diffusi in tutto il corpo, tremore, diarrea, dolori addominali, nausea, sintomi influenzali, battito cardiaco accelerato e pupille grandi.

Sintomi psichici sono una marcata sensazione di insoddisfazione, ansia e irritabilità.



Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al Suo medico o al Suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Morphini HCl Streuli gocce orali?

Spesso si rilevano alterazioni dell'umore, depressione, alterazioni dello stato di vigilanza (per lo più riduzione, raramente aumento), insonnia, disturbi percettivi, allucinazioni e stati di agitazione. Spesso si manifesta una diminuzione della libido o riduzione della potenza sessuale.

Occasionalmente possono manifestarsi mal di testa, capogiri, sudorazione, offuscamento della vista, vista doppia, coliche, ritenzione urinaria, restringimento delle vie respiratorie, reazioni di ipersensibilità della pelle come orticaria, prurito, esantemi ed edemi e, in particolare all'inizio della terapia, vomito, perdita dell'appetito e alterazioni del gusto.

Raramente si manifestano bradicardia e diminuzione o aumento clinicamente rilevante della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

A seconda della posologia, la morfina può indurre depressione respiratoria e sedazione di varia intensità, dalla leggera stanchezza fino allo stordimento, nausea e secchezza della bocca.

L'uso di morfina può condurre a euforia e allo sviluppo di una dipendenza.

In caso di trattamento a lungo termine, un tipico effetto secondario è la stipsi, in casi isolati fino all'occlusione intestinale.

Possono manifestarsi arrossamenti del viso, brividi, palpitazioni, debolezza generale fino a perdita della conoscenza e insufficienza cardiaca.

Inoltre, in caso di assunzione di Morphini HCl Streuli, possono comparire i seguenti effetti collaterali con una frequenza ignota:

- gravi reazioni allergiche che provocano insufficienza respiratoria o vertigini;
- sindrome da astinenza o dipendenza da medicamento;
- sensazione di dolore a causa di stimoli che solitamente non provocano alcun dolore (allodinia);
- eccessiva sensibilità al dolore (iperalgia);
- assenza di mestruazioni, disfunzione erettile, riduzione della libido;
- problemi respiratori (depressione respiratoria);
- interruzioni della respirazione durante il sonno (apnea nel sonno);
- reazioni cutanee gravi con formazione di vesciche, pelle squamosa estesa o aree contenenti pus e febbre (pustolosi esantematica acuta generalizzata; PEAG);
- sintomi correlati a un'inflammatione del pancreas (pancreatite) e del sistema dei dotti biliari, come forti dolori alla parte superiore dell'addome, che eventualmente si irradiano verso la schiena, nausea, vomito o febbre.

Se sospetta un sovradosaggio, informi immediatamente il Suo medico, che adotterà i provvedimenti adeguati. I sintomi di un sovradosaggio sono pupille ristrette, estremo rallentamento della respirazione, pressione arteriosa molto bassa e condizioni simili alla narcosi.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il Suo medico o il Suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) nella confezione originale, al riparo dalla luce.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Dopo l'apertura del flacone, utilizzare la soluzione in gocce entro 8 settimane.



Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Il medico, il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darLe ulteriori informazioni.

Cosa contiene Morphini HCl Streuli gocce orali?

1 ml (= 20 gocce) di gocce orali 10 mg/ml oppure 20 mg/ml contiene:

Principi attivi

Morfina cloridrato triidrato 10 mg oppure 20 mg.

Sostanze ausiliarie

Sodio edetato, etanolo 96 %, metile p-idrossibenzoato (E 218), p-idrossibenzoato di propile (E 216), idrossido di sodio, acido idroclorico, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

56554 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Morphini HCl Streuli gocce orali? Quali confezioni sono disponibili?

Morphini HCl Streuli gocce orali sottostà alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

Morphini HCl Streuli 10 mg/ml e 20 mg/ml, gocce orali (soluzione):

confezioni da 20 ml e 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

