

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Xgeva® solution injectable en seringue préremplie

Amgen Switzerland AG

Qu'est-ce que XGEVA et quand doit-il être utilisé?

XGEVA contient du denosumab, une protéine (anticorps monoclonal) qui ralentit la destruction osseuse due à un cancer se disséminant dans les os (métastases osseuses) ou à une tumeur osseuse à cellules géantes.

- XGEVA est utilisé chez l'adulte dans le traitement de cancers avancés avec métastases osseuses, en association avec un traitement standard contre les tumeurs.
- XGEVA est également utilisé chez l'adulte et l'adolescent ayant terminé sa croissance osseuse dans le traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes qui ne peuvent pas être opérées ou pour lesquelles la chirurgie ne constitue pas la meilleure option thérapeutique.

Selon prescription du médecin.

Quand XGEVA ne doit-il pas être utilisé?

Vous ne devez pas utiliser XGEVA si vous êtes allergique au denosumab ou à l'un des excipients de XGEVA.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de XGEVA?

Supplémentation en calcium et en vitamine D

Pendant le traitement par XGEVA, vous devez prendre des suppléments de calcium et de vitamine D, à moins que votre taux de calcium ne soit élevé. Votre médecin en parlera avec vous. Si votre taux de calcium dans le sang est faible, votre médecin peut décider de vous donner des préparations de supplémentation en calcium avant que vous ne commenciez le traitement par XGEVA.

Faible taux de calcium dans le sang

Si, au cours du traitement par XGEVA, vous ressentez des spasmes, des contractions ou des crampes dans vos muscles et/ou un engourdissement ou des picotements dans vos doigts, vos orteils ou au niveau de la bouche et/ou des convulsions, une confusion ou une perte de conscience, informez-en immédiatement votre médecin. Il est possible que votre taux de calcium dans le sang soit trop faible.

Trouble de la fonction rénale

Si vous présentez actuellement ou avez présenté dans le passé des problèmes de reins ou une insuffisance rénale ou si vous avez déjà eu besoin d'une dialyse, informez-en votre médecin. Dans ce cas, il est possible que vous soyez plus exposé(e) au risque de faible taux de calcium dans le sang, en particulier si vous ne prenez pas de suppléments de calcium.

Problèmes au niveau de la bouche, des dents ou de la mâchoire

Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (lésion des os de la mâchoire) a fréquemment été rapporté (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) chez les patients recevant des injections de XGEVA pour le traitement de maladies cancéreuses. Une ostéonécrose de la mâchoire peut également survenir après l'arrêt du traitement.



Il est important d'essayer de prévenir l'apparition de l'ostéonécrose de la mâchoire, car il s'agit d'une affection qui peut être douloureuse et difficile à traiter. Voici quelques précautions qu'il vous est conseillé de prendre afin de réduire le risque d'ostéonécrose de la mâchoire:

- Avant de recevoir le traitement, prévenez votre médecin ou infirmier(ère) (professionnel de santé) si vous avez des problèmes au niveau de la bouche ou des dents. Votre médecin devra retarder le début de votre traitement si vous présentez des plaies non cicatrisées dans la bouche suite à des traitements dentaires ou une chirurgie bucco-dentaire. Votre médecin vous recommandera éventuellement un examen dentaire avant de commencer le traitement par XGEVA.
- Pendant le traitement, vous devrez veiller à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et à faire des bilans dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires, vous devrez vous assurer qu'elles sont bien ajustées.
- Si vous suivez un traitement dentaire ou devez subir une intervention de chirurgie dentaire (extraction d'une dent par exemple), informez votre médecin de votre traitement dentaire et votre dentiste de votre traitement par XGEVA.
- Consultez immédiatement votre médecin ou votre dentiste si vous présentez des problèmes au niveau de la bouche ou des dents, comme par exemple une dent qui se déchausse, des douleurs ou des gonflements, des plaies qui ne guérissent pas ou un écoulement, car cela pourrait être le signe d'une ostéonécrose de la mâchoire.

Le risque d'ostéonécrose de la mâchoire peut être plus élevé chez les patients traités par chimiothérapie et/ou radiothérapie, par corticoïdes ou par un inhibiteur de l'angiogenèse (utilisé dans le traitement du cancer), ayant subi une chirurgie dentaire, ne recevant pas de soins dentaires réguliers, ayant une affection des gencives et chez les fumeurs.

Fractures vertébrales multiples après l'arrêt du traitement

Après l'arrêt du traitement par XGEVA, des fractures osseuses peuvent se produire, en particulier dans votre colonne vertébrale (fractures vertébrales multiples), celles-ci ne sont pas dues à des métastases osseuses et surviennent surtout chez les patients présentant des facteurs de risque tels que l'ostéoporose ou des fractures antérieures. N'arrêtez donc en aucun cas le traitement par XGEVA sans en parler d'abord à votre médecin.

Infections de la peau

Si, pendant le traitement par XGEVA, vous voyez apparaître une zone gonflée et rouge sur votre peau qui est chaude et douloureuse au toucher et qui peut s'accompagner de fièvre, informez-en immédiatement votre médecin.

Fractures inhabituelles du fémur

Certaines personnes ont présenté des fractures inhabituelles du fémur lors du traitement par XGEVA. Consultez votre médecin si vous ressentez une douleur nouvelle ou inhabituelle au niveau de la hanche, de l'aîne ou de la cuisse.

Taux élevé de calcium dans le sang après arrêt du traitement par XGEVA

Des taux élevés de calcium dans le sang ont été observés plusieurs semaines à plusieurs mois après l'arrêt du traitement chez certains patients atteints d'une tumeur osseuse à cellules géantes. Votre médecin surveillera tout signe ou symptôme d'un taux élevé de calcium après l'arrêt de XGEVA.

Utilisation de XGEVA avec d'autres médicaments:

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament qui contient le même principe actif (denosumab). Vous ne devez pas utiliser XGEVA en même temps qu'un autre médicament contenant également du denosumab.

Excipients:

Ce médicament contient 37 mg de sorbitol par seringue préremplie.



Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose de 120 mg, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Ce médicament contient 6,1 mg de phénylalanine par seringue préremplie.

La phénylalanine peut être dangereuse pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

L'effet de ce médicament sur l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines n'a pas été étudié.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

XGEVA peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

XGEVA n'a pas été étudié chez la femme enceinte. Si vous êtes enceinte, pensez l'être ou envisagez de l'être, il est important d'en informer votre médecin. Il est déconseillé de prendre XGEVA si vous êtes enceinte. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception efficaces pendant le traitement par XGEVA et pendant au moins 5 mois après l'arrêt du traitement par XGEVA.

Si vous débutez une grossesse pendant le traitement par XGEVA ou moins de 5 mois après l'arrêt de votre traitement par XGEVA, merci d'en informer votre médecin.

On ne sait pas si XGEVA passe dans le lait maternel. Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter, il est important d'en informer votre médecin. Votre médecin vous aidera ainsi à décider si vous devez cesser d'allaiter ou interrompre le traitement par XGEVA, en tenant compte aussi bien du bénéfice de l'allaitement pour le nourrisson que de celui du traitement par XGEVA pour vous (la mère).

Comment utiliser XGEVA?

XGEVA doit être administré sous la responsabilité d'un professionnel de santé.

Adultes

La dose recommandée de XGEVA est de 120 mg administrés une fois toutes les 4 semaines sous la forme d'une seule injection sous la peau (injection sous-cutanée). L'injection avec la seringue préremplie de XGEVA peut être réalisée sur votre cuisse ou votre ventre (à l'exception d'une zone de 5 cm autour de votre nombril). La première auto-administration avec la seringue préremplie de XGEVA doit être réalisée sous la surveillance d'un professionnel de santé. Vous pouvez demander à une autre personne de vous injecter XGEVA dans la cuisse, le ventre ou la partie externe du bras. Pour cela, vous ou votre aidant devez être formé(e) aux techniques d'injection par un professionnel de santé. Si vous êtes traité(e) pour une tumeur osseuse à cellules géantes, vous recevrez une dose supplémentaire 1 semaine et 2 semaines après la dose initiale.

Enfants et adolescents

XGEVA n'est pas recommandé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, à l'exception des adolescents atteints d'une tumeur osseuse à cellules géantes chez qui la croissance osseuse est terminée. Dans ce cas, la posologie est la même que pour les adultes.

L'utilisation de XGEVA chez les enfants et adolescents atteints d'autres affections cancéreuses qui se sont propagées aux os n'a pas été étudiée et n'est pas recommandée.

Votre médecin décidera le cas échéant s'il est préférable que vous procédiez vous-même à l'injection de XGEVA ou si un aidant doit s'en charger. Votre médecin, votre infirmier ou votre pharmacien vous montrera, à vous ou à votre aidant, comment utiliser XGEVA. Pour les instructions concernant la technique d'injection de XGEVA, veuillez vous reporter à la fin de cette notice.



Chez les adolescents de moins de 18 ans, XGEVA doit être administré par un professionnel de santé ou par une personne chargée des soins, formée à cet effet.

Pendant le traitement par XGEVA, vous devez en outre prendre des suppléments de calcium et de vitamine D, à moins que votre taux de calcium dans le sang ne soit trop élevé. Votre médecin en parlera avec vous.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires XGEVA peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir durant le traitement par XGEVA:

Veuillez informer *immédiatement* votre médecin ou votre pharmacien si vous constatez l'un des symptômes suivants pendant le traitement par XGEVA (symptômes pouvant affecter plus de 1 personne sur 10):

- Spasmes, contractions, crampes dans vos muscles, engourdissement ou picotements dans vos doigts, vos orteils ou autour de votre bouche, et/ou convulsions, confusion ou perte de conscience. Il pourrait s'agir de signes indiquant un faible taux de calcium dans le sang. Un faible taux de calcium dans le sang peut en outre entraîner une modification du rythme cardiaque appelée allongement de l'intervalle QT qui peut être constatée en pratiquant un électrocardiogramme (ECG).

Veuillez informer *immédiatement* votre médecin ou votre dentiste si vous constatez l'un des symptômes suivants pendant le traitement par XGEVA ou après la fin du traitement (symptômes pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10):

- Une douleur persistante dans la bouche et/ou la mâchoire et/ou un gonflement ou des plaies dans la bouche ou sur la mâchoire qui ne cicatrisent pas, un écoulement, un engourdissement ou une sensation de lourdeur de la mâchoire ou un déchaussement des dents peuvent être les signes d'une lésion osseuse dans la mâchoire (ostéonécrose).

Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Douleur osseuse, articulaire et/ou musculaire parfois forte,
- Essoufflement,
- Diarrhée.

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Faible taux de phosphate dans le sang (hypophosphatémie),
- Faible taux de calcium dans le sang (hypocalcémie)
- Lésion osseuse dans la mâchoire
- Transpiration excessive,
- Perte de cheveux
- Chez les patients présentant un cancer avancé: développement d'un autre type de cancer.

Occasionnel (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Taux élevé de calcium dans le sang (hypercalcémie) après la fin du traitement chez les patients atteints de tumeurs osseuses à cellules géantes
- Fracture du fémur. *Veuillez informer votre médecin de toute douleur nouvelle ou inhabituelle au niveau de la cuisse, de la hanche ou de l'aîne*, il peut s'agir d'un des premiers signes d'une éventuelle fracture.
- Éruption sur la peau ou plaies de la muqueuse buccale (éruption médicamenteuse lichénoïde)
- Infection du tissu sous-cutané (zone de peau gonflée, rouge chaude et douloureuse au toucher et qui peut s'accompagner de fièvre).



- Si vous constatez l'un de ces symptômes, informez-en immédiatement votre médecin.
- Réactions au site d'injection, y compris douleurs au niveau du site d'administration de l'injection.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

- Réactions allergiques (par exemple sifflements ou difficultés respiratoires; gonflement du visage, des lèvres, de la langue, de la gorge ou d'autres parties du corps; éruption, démangeaisons ou urticaire sur la peau). Dans de rares cas, les réactions allergiques peuvent évoluer vers un état sévère.
- Fractures de la colonne vertébrale après l'arrêt de XGEVA (fractures vertébrales multiples)

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Réactions allergiques sévères
- Très faible taux de calcium dans le sang (hypocalcémie sévère)

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver au réfrigérateur (2-8 °C) dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants.

Ne pas congeler. Ne pas agiter.

Autre mode de conservation dans des cas exceptionnels

La seringue préremplie peut être laissée hors du réfrigérateur afin d'atteindre la température ambiante (jusqu'à 25 °C) avant l'injection. Cela permettra une injection plus confortable. Une fois revenue à température ambiante (jusqu'à 25 °C), la seringue préremplie ne doit pas être remise au réfrigérateur et doit être utilisée dans les 30 jours.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient XGEVA?

XGEVA est une solution limpide, incolore à légèrement jaunâtre. La solution peut contenir des traces de particules transparentes à blanches.

Principes actifs

Denosumab.

Chaque seringue préremplie contient 120 mg de denosumab dans 1 ml de solution (soit 120 mg/ml).

Excipients

Acide acétique 99%, hydroxyde de sodium, sorbitol (E420), L-phénylalanine, polysorbate 20 et eau pour préparations injectables.

Numéro d'autorisation

69520 (Swissmedic)

Où obtenez-vous XGEVA? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Chaque boîte contient une seringue préremplie avec un dispositif de protection de l'aiguille.




Titulaire de l'autorisation

Amgen Switzerland AG, Risch

Domicile: 6343 Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Instructions d'utilisation

Instructions d'utilisation: Seringue préremplie XGEVA à usage unique Voie sous-cutanée	
Apprendre à connaître votre seringue préremplie avec dispositif de protection automatique de l'aiguille	
 The diagram shows a vertical cross-section of the XGEVA prefilled syringe. Labels on the left side from top to bottom are: 'Tête du piston' (Piston head), 'Clips de protection de l'aiguille' (Needle protection clips), 'Ailettes' (Fingers), 'Corps de la seringue' (Syringe body), and 'Capuchon de l'aiguille (l'aiguille se trouve à l'intérieur)' (Needle cap (the needle is inside)). Labels on the right side from top to bottom are: 'Tige du piston' (Piston rod), 'Piston' (Piston), 'Étiquette' (Label), 'Fenêtre de contrôle' (Control window), and 'Capuchon de l'aiguille (l'aiguille se trouve à l'intérieur)' (Needle cap (the needle is inside)).	
Important	
Lisez ENTIÈREMENT la notice d'emballage (information destinée aux patients) et les présentes instructions d'utilisation AVANT de procéder à l'injection de XGEVA:	

1 Utilisation de votre seringue préremplie XGEVA	
• •	Il est important de ne pas procéder vous-même à l'injection avant d'avoir été formé par votre médecin ou par un professionnel de santé. XGEVA est administré par une injection dans le tissu situé juste sous la peau (injection sous-cutanée).




- N'utilisez **pas** la seringue préremplie si l'emballage a été endommagé ou déjà ouvert (dispositif d'inviolabilité rompu).
- N'agitez **pas** la seringue préremplie.
- N'enlevez le capuchon de l'aiguille que lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection.
- N'utilisez **pas** la seringue préremplie si elle est tombée sur une surface dure. La seringue préremplie peut être partiellement cassée, même si aucun dommage n'est visible. Si possible, utilisez une nouvelle seringue préremplie et contactez votre médecin ou un professionnel de santé.

Important: conservez la seringue préremplie et le conteneur pour objets pointus hors de portée des enfants.

2 Préparation de l'injection de XGEVA

2a Saisissez la seringue préremplie par le corps et sortez-la de son emballage.



- Ne saisissez **pas** la seringue par la tige du piston, les ailettes ou le capuchon de l'aiguille.
- Ne saisissez **pas** la seringue par les clips de protection de l'aiguille.
- Remplacez les seringues préremplies non utilisées au réfrigérateur.

2b Attendez 30 minutes pour permettre à la seringue préremplie de revenir à température ambiante.

ATTENDRE


30


minutes

- Laissez la seringue préremplie revenir d'elle-même à température ambiante.



•	Ne la réchauffez pas dans l'eau bouillante, au four à micro-ondes ou en l'exposant directement au soleil.
•	Ne secouez jamais la seringue préremplie.
•	L'utilisation de la seringue préremplie à température ambiante rend l'injection plus confortable.
•	Une fois revenue à température ambiante, la seringue préremplie ne doit pas être remise au réfrigérateur et doit être utilisée dans les 30 jours.

2c	Préparez le matériel nécessaire à l'injection et posez-le sur une surface propre et bien éclairée.
Conteneur pour objets tranchants 	 Cotons imbibés d'alcool  Pansement  Tampon de coton ou compresse
•	Seringue préremplie XGEVA (à température ambiante)
•	Conteneur pour objets tranchants
•	Cotons imbibés d'alcool
•	Pansement
•	Tampon de coton ou compresse


3	Préparation de votre injection
3a	Procédez à un contrôle visuel du médicament.
	



•	La solution doit être transparente, incolore à légèrement jaunâtre.
•	La présence de petites bulles d'air dans la seringue préremplie n'est pas un problème.
•	N'utilisez pas le médicament si la solution est trouble, colorée ou contient des particules.

Important: si la solution est trouble, colorée ou contient des particules, adressez-vous à votre médecin ou à un professionnel de santé.

3b	Vérifiez la date de péremption (EXP) et la seringue préremplie.
-----------	--




•	N'utilisez pas la seringue préremplie si la date de péremption est dépassée.
•	N'utilisez pas la seringue préremplie si: • il n'y a pas de capuchon sur l'aiguille ou si celui-ci bouge, • certaines parties de la seringue sont fissurées ou cassées, • si la seringue est tombée sur une surface dure.

Important: dans tous les cas ci-dessus, adressez-vous à votre médecin ou à un professionnel de santé.

3c	Procédez à l'injection dans l'une de ces zones.
-----------	--






- Injectez le médicament dans votre cuisse ou votre ventre (en évitant une zone de 5 cm autour de votre nombril).
- Vous pouvez demander à une autre personne de procéder à l'injection dans votre cuisse, votre ventre ou la partie externe de votre bras.
- Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.
- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
- Laissez la peau sécher.
- Ne touchez **plus** à cette zone avant l'injection.

Important: évitez les zones présentant des cicatrices, des vergetures ou dans lesquelles la peau est sensible ou présente une ecchymose, une rougeur ou une induration.

4 Injection de XGEVA

Important: ne retirez le capuchon de l'aiguille que lorsque vous êtes prêt(e) à procéder à l'injection (dans les 5 minutes), sans quoi le médicament peut sécher.

4a Tenez la seringue préremplie par le corps et retirez le capuchon de l'aiguille en le tirant tout droit.



•	Ne tordez pas ou ne pliez pas le capuchon de l'aiguille.
•	Ne remettez jamais le capuchon de l'aiguille en place. Cela pourrait endommager l'aiguille.
•	Une fois le capuchon de l'aiguille retiré, aucun objet ne doit entrer en contact avec l'aiguille.
•	Après le retrait du capuchon, ne posez pas la seringue préremplie sur une quelconque surface.
•	N'essayez pas d'enlever les bulles d'air en poussant sur le piston de la seringue préremplie. La présence de petites bulles d'air n'est pas problématique.
•	Il est normal de voir apparaître une goutte de médicament à l'extrémité de l'aiguille.

4b	Avant l'injection, pincez la peau de la zone choisie.
PINCER LA PEAU	
	
•	Pincez la peau entre votre pouce et votre index de manière à former un bourrelet.
•	Dans la mesure du possible, ce bourrelet de peau doit faire environ 5 cm de large.

4c	Introduisez l'aiguille dans le bourrelet ainsi formé.
INTRODUIRE L'AIGUILLE	
	
•	Introduisez l'aiguille soit perpendiculairement à la peau, soit selon un angle de 45° dans le bourrelet de peau pincé.
•	Pendant l'introduction de l'aiguille, ne placez pas votre doigt sur la tige du piston, car cela pourrait entraîner une perte de médicament.



4d	Poussez lentement sur la tête du piston jusqu'à ce qu'elle se trouve entièrement entre les clips de protection de l'aiguille. Il est possible que vous ressentiez ou entendiez un clic d'enclenchement.
----	---


PROCEDER A L'INJECTION



•	Ne tirez jamais le piston vers l'arrière.
•	Ne retirez l'aiguille qu'une fois que tout le médicament a été administré.

4e	Continuez à exercer une pression sur la tête du piston et retirez l'aiguille de la peau.
----	--

RETIRER L'AIGUILLE



•	Continuez à exercer une pression sur la tête du piston et retirez l'aiguille de la peau.
•	Relâchez la peau après le retrait de l'aiguille.
•	Enlevez lentement votre pouce de la tête du piston. La seringue préremplie vide se déplace alors vers le haut jusqu'à ce que l'aiguille soit entièrement recouverte par le dispositif de protection.
•	Ne frottez pas le site d'injection.
•	Si du sang s'écoule, appuyez sur le site d'injection avec un tampon de coton ou une compresse. Si nécessaire, appliquez un pansement.



5 Fin de la procédure et élimination de la seringue XGEVA

Important: ne remettez jamais le capuchon de l'aiguille en place.

5a Éliminez la seringue préremplie usagée et le capuchon de l'aiguille dans le conteneur pour objets tranchants.



- Les médicaments doivent être éliminés conformément à la réglementation nationale. Demandez à votre pharmacien comment éliminer le médicament que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

La seringue préremplie ne doit **pas** être recyclée ou jetée avec les ordures ménagères.

- La seringue préremplie ne doit **pas** être réutilisée.

