

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Warz-ab® Extor

Che cos'è Warz-ab Extor e quando si usa?

Il Warz-ab Extor è una soluzione da applicare sulla pelle mediante tamponamento. Applicando il prodotto si forma in breve tempo una pellicola. Non è necessario fasciare la zona trattata. Le sostanze contenute nella pellicola agiscono per lungo tempo sulla cute sviluppando così la loro azione cheratolitica. Il prodotto viene utilizzato per eliminare le verruche, i calli, le callosità e i duroni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

I calli, le callosità e i duroni sono ispessimenti dello strato corneo dell'epidermide, che penetrano più o meno profondamente negli strati dermici causando dolori talvolta intensi alla pressione. Le verruche sono infezioni cutanee di origine virale. Dopo un contatto con il virus delle verruche si sviluppa – spesso dopo parecchio tempo – una intensa proliferazione cellulare che diventa visibile come verruca. Le verruche sono contagiose e possono diffondersi facilmente, per cui è bene trattare subito ogni verruca formatasi sulla pelle. Ci si può proteggere dalla contaminazione con virus delle verruche evitando di camminare a piedi nudi negli stabilimenti pubblici (sauna, piscine, palestre, ecc.) nonché disinfettando e asciugando bene mani e piedi dopo aver frequentato la piscina. E'consigliabile non usare asciugamani in comune con altre persone.

Quando non si può usare Warz-ab Extor?

Non utilizzare il preparato in caso di nota ipersensibilità all'acido salicilico o a un altro costituente della composizione. Il Warz-ab Extor non deve essere applicato sul viso, nella regione genitale nonché su voglie e verruche pelose.

Warz-ab Extor non deve essere somministrato a bambini sotto i 3 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Warz-ab Extor?

Il Warz-ab Extor può provocare irritazioni locali della pelle sana. Deve quindi essere applicato soltanto ed esattamente sulla zona da trattare (tale superficie non deve mai avere un diametro superiore ai 2 cm). A scopo protettivo, coprire la pelle circostante con pasta di zinco, vaselina o con un unguento. L'asportazione della callosità provoca un temporaneo assottigliamento dello strato corneo, che diviene anche più sensibile alla luce. Bisogna quindi evitare un'eccessiva esposizione alla luce solare. Evitare il contatto con gli occhi, le mucose e le piaghe. Se soffre di diabete o disturbi circolatori, utilizzi il Warz-ab Extor solo sotto controllo medico.

Questo medicamento contiene 161.8 mg di alcol (etanolo) per 1 g soluzione.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,



- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Warz-ab Extor durante la gravidanza o l'allattamento?

Benché la quantità assorbita dall'applicazione sulla pelle sia minima, in via precauzionale si sconsiglia l'uso di Warz-ab Extor durante la gravidanza, a meno che ciò non sia assolutamente necessario.

L'acido salicilico viene escreto nel latte materno. Benché la quantità assorbita dall'applicazione sulla pelle sia minima, in via precauzionale si sconsiglia l'uso di Warz-ab Extor durante l'allattamento, a meno che ciò non sia assolutamente necessario.

Come usare Warz-ab Extor?

(Salvo diversa prescrizione medica)

Per calli, callosità e duroni: Con l'aiuto della spatola applicare leggermente un po' di Warz-ab Extor sul punto colpito, spalmare con delicatezza e lasciare asciugare. Eseguire questo trattamento due volte al giorno per 4-5 giorni consecutivi. Infine asportare gli strati callosi ammorbiditi insieme alla pellicola formatasi: un bagno molto caldo faciliterà ulteriormente il distacco.

Per le verruche: Eseguire lo stesso trattamento descritto per calli, callosità e duroni, ma per un periodo più lungo, asportando ogni 2-3 giorni la pellicola con gli strati callosi ad essa attaccati. Per eliminare completamente la verruca occorreranno da due a tre settimane, a seconda del tipo e della grossezza. Se dopo questo periodo il trattamento non avrà avuto successo, si consiglia di consultare il medico.

L'uso e la sicurezza di Warz-ab Extor non sono stati finora sui bambini sotto i 3 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Warz-ab Extor?

A livello o a prossimità della zona di pelle trattata con Warz-ab Extor può eventualmente osservare i sintomi seguenti:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Irritazione cutanea, arrossamento della pelle, desquamazione della pelle, sensazione di bruciore, prurito, pelle secca.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Eruzione cutanea, ispessimento della pelle.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Reazioni allergiche con infiammazione, gonfiore, rossore e bruciore, dolori, colorazione della pelle.

In tal caso bisogna interrompere il trattamento e sciacquare con abbondante acqua il punto colpito.

L'asportazione della callosità provoca un temporaneo assottigliamento dello strato corneo, che diviene anche più sensibile alla luce. Bisogna quindi evitare un'eccessiva esposizione alla luce solare.

Se involontariamente applica Warz-ab Extor su pelle sana possono insorgere i seguenti effetti:

- Formazione di bolle
- Desquamazione

Se involontariamente ingerisce Warz-ab Extor o lo utilizza troppo spesso, per un periodo prolungato o su una grande superficie, il suo corpo può probabilmente assumere troppo acido salicilico. Questo potrebbe portare a un avvelenamento da acido salicilico (salicilismo). Sintomi usuali connessi a un salicilismo sono



tra l'altro sensazione di sete, tintinnio alle orecchie o sordità, nausea o vomito, stanchezza, frequenza respiratoria aumentata, vertigini, mani e piedi caldi o umore/pensieri insoliti.

Se compaiono i sintomi riportati qui sopra o altri non elencati, interrompa il trattamento con Warz-ab Extor e consulti il suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare ben chiuso.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Destinato esclusivamente ad uso esterno!

Infiammabile!

Se la soluzione non è più sottile, deve essere distrutta.

Evitare di spargere sugli abiti, perché le macchie non possono più essere eliminate.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Warz-ab Extor?

Principi attivi

1 g di soluzione contiene: acido salicilico 100 mg, acido lattico 111 mg.

Sostanze ausiliarie

Proxilina, etere, olio di ricino vergine, etanolo 96 per cento 152.64 mg/g soluzione, etanolo anidro 16.49 mg/g soluzione, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

17035 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Warz-ab Extor? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Flacone da 10 ml di soluzione.

Titolare dell'omologazione

F. Uhlmann-Eyraud SA, 5600 Lenzburg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

