

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement ou prescrit à votre enfant sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

PALFORZIA, poudre orale

Stallergenes AG

Qu'est-ce que PALFORZIA et quand doit-il être utilisé?

Selon prescription du médecin.

PALFORZIA est un médicament obtenu à partir de cacahuètes. Il est utilisé pour traiter les patients qui présentent une allergie cliniquement pertinente aux arachides. PALFORZIA agit en augmentant progressivement la capacité de l'organisme à tolérer de faibles quantités d'arachides. PALFORZIA est destiné au traitement des patients présentant une allergie confirmée aux arachides. Il n'est pas efficace contre les allergies à d'autres fruits à coques ou contre d'autres allergies alimentaires.

PALFORZIA est destiné aux enfants et aux jeunes âgés de 1 à 17 ans et aux adolescents qui atteignent l'âge adulte pendant le traitement.

PALFORZIA est prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et le traitement des allergies et des réactions allergiques, y compris de l'anaphylaxie.

Vous devez continuer d'éviter toute consommation d'arachides pendant le traitement par PALFORZIA.

Si vous vous sentez mal après avoir pris PALFORZIA, parlez-en à un médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Consultez votre médecin avant de prendre PALFORZIA.

Vous devez éviter de consommer d'autres produits ou aliments contenant des arachides pendant votre traitement par PALFORZIA.

PALFORZIA ne traite pas les symptômes d'une réaction allergique à l'arachide et ne doit pas être pris au cours d'une réaction allergique.

Votre médecin vous prescrira de l'adrénaline en seringue pour auto-injection que vous devrez avoir continuellement avec vous. Votre médecin vous expliquera comment reconnaître les signes et symptômes d'une réaction allergique et vous indiquera quand et comment utiliser l'adrénaline. Si vous utilisez l'adrénaline, ne prenez pas d'autres doses de PALFORZIA et consultez immédiatement un médecin.

Pour toute question sur l'utilisation de l'adrénaline, adressez-vous à votre médecin et/ou lisez la notice du médicament.

PALFORZIA contient des protéines d'arachide. Il s'agit de l'allergène auquel les patients souffrant d'une allergie aux arachides réagissent. Des réactions allergiques à PALFORZIA peuvent survenir pendant le traitement. Ces réactions surviennent le plus souvent dans les deux heures suivant la prise d'une dose de PALFORZIA et sont généralement légères ou modérées, mais peuvent parfois être sévères.

Certaines situations peuvent augmenter le risque de réaction allergique, notamment:

- l'activité physique;
- les maladies telles que le rhume, la grippe ou d'autres infections virales;
- une fatigue intense ou un manque de sommeil;
- les menstruations (chez la femme);



- la prise de certains médicaments antalgiques tels que l'aspirine ou l'ibuprofène;
- la consommation d'alcool;
- le stress.

Arrêtez de prendre PALFORZIA et consultez immédiatement un médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants:

- difficultés à respirer;
- sensation de gorge serrée ou gonflement;
- difficultés à avaler;
- modifications de la voix;
- sensations vertigineuses ou évanouissement ou sensation de danger imminent;
- fortes crampes ou douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée;
- fortes bouffées congestives, fortes rougeurs ou démangeaisons cutanées;
- aggravation de l'asthme ou de toute autre affection respiratoire;
- brûlures d'estomac, difficultés à avaler, douleur en avalant ou douleur thoracique qui ne disparaît pas ou qui s'aggrave.

L'augmentation de la tolérance aux arachides est progressive avec PALFORZIA. La capacité à tolérer de faibles quantités d'arachides augmentées progressivement a été démontrée après l'administration de tous les paliers de la phase d'augmentation de la dose de PALFORZIA et après au moins 3 mois de traitement d'entretien. Cet effet continue à s'améliorer au fil du temps.

Afin de maintenir cette meilleure tolérance aux arachides qui y est associée, PALFORZIA doit être pris quotidiennement.

Il se peut que PALFORZIA n'entraîne pas une augmentation de la tolérance aux arachides chez tous les patients.

PALFORZIA ne doit pas être pris à jeun ou après une période de jeûne. PALFORZIA doit être prise au cours d'un repas. Vous trouverez les instructions de préparation de PALFORZIA ci-après dans cette notice (voir «Comment utiliser PALFORZIA?»).

PALFORZIA ne doit pas être mélangé à des liquides.

Quand PALFORZIA ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas prendre PALFORZIA:

- si vous êtes allergique à l'un des composants de ce médicament (voir «Que contient PALFORZIA?»);
- si vous souffrez d'asthme sévère ou si votre asthme n'est pas contrôlé (selon l'avis de votre médecin);
- si vous avez eu dans le passé des difficultés à avaler ou des problèmes digestifs de longue durée;
- si vous avez souffert d'un syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA), une réaction intestinale retardée aux protéines alimentaires, qui provoque des vomissements violents et persistants) au cours des 12 derniers mois
- si vous avez connu des problèmes de croissance ou de développement, par exemple un retard staturo-pondéral (concernant les enfants âgés de 1 à 3 ans);
- si vous avez une mastocytose sévère;
- si votre hypertension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée (selon l'avis de votre médecin) ou si vous souffrez d'une maladie cardio-vasculaire;
-



si vous avez eu une réaction allergique sévère ou potentiellement mortelle (anaphylaxie) dans les 60 jours précédant le début du traitement.

PALFORZIA peut ne pas vous convenir si vous avez un problème de santé qui affecte votre capacité à tolérer une réaction allergique sévère. Il peut s'agir par exemple:

- d'une fonction pulmonaire réduite (mucoviscidose sévère par exemple);
- d'affections cardiaques, telles qu'une angine de poitrine instable, un infarctus du myocarde récent, des battements cardiaques très anormaux ou une maladie cardiaque congénitale sévère;
- d'une hypertension artérielle non contrôlée;
- d'un autre trouble métabolique congénital.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de PALFORZIA?

Informez votre médecin de toutes les affections médicales dont vous souffrez, telles que l'asthme ou d'autres affections allergiques.

Enfants et adolescents

PALFORZIA est destiné aux enfants et aux jeunes âgés de 1 à 17 ans et à ceux qui atteignent l'âge adulte pendant le traitement. La sécurité et l'efficacité de PALFORZIA chez les enfants âgés de moins de 1 an ne sont pas établies à ce jour.

Autres médicaments et PALFORZIA

Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments disponibles sans ordonnance.

Il est possible que PALFORZIA ne vous convienne pas si vous prenez certains médicaments qui réduisent l'effet de l'adrénaline, tels que:

- les bêtabloquants ou alfabloquants (en cas d'hypertension)
- les alcaloïdes de l'ergot de seigle (en cas de maux de tête et de migraine)

si vous prenez certains médicaments susceptibles de renforcer l'effet de l'adrénaline, tels que:

- les glycosides cardiaques (en cas d'insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme cardiaque)
- les diurétiques (médicaments qui augmentent la production d'urine, en cas d'affections cardiaques et d'hypertension artérielle)
- les inhibiteurs de la monoamine oxydase ou les antidépresseurs tricycliques (en cas de dépression)
- les hormones thyroïdiennes (en cas d'insuffisance fonctionnelle de la thyroïde)
- certains antihistaminiques (consultez votre médecin à ce sujet).

Ce médicament n'a pas été étudié chez les patientes et patients recevant une immunothérapie allergénique concomitante. La prudence est de mise lors de l'administration de ce médicament en association avec d'autres immunothérapies allergiques, car un risque plus élevé de réactions allergiques graves est possible.

Ce médicament peut affecter la vigilance, l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser ou manipuler des outils ou des machines! Faites preuve de prudence pendant 2 heures après avoir pris une dose de PALFORZIA, en cas de survenue d'une réaction allergique qui affecte votre capacité à réagir, à conduire et à utiliser des outils ou des machines. Attendez que tous les symptômes d'une telle réaction allergique aient disparu avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

Votre médecin vous indiquera si vous pouvez prendre d'autres médicaments avec PALFORZIA, par exemple d'autres traitements contre les allergies, des médicaments pour votre estomac ou des médicaments pour traiter d'autres maladies dont vous souffrez.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie



- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

PALFORZIA peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Vous ne devez pas commencer le traitement par PALFORZIA si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Comment utiliser PALFORZIA?

Vous devez préparer et prendre PALFORZIA exactement comme prescrit par votre médecin.

PALFORZIA est une poudre orale à mélanger à des aliments semi-solides comme la compote de pommes, le yaourt, le flan ou d'autres aliments auxquels vous n'êtes pas allergique.

Ne consommez pas d'alcool ni de médicaments contenant de l'alcool pendant les 2 heures précédant la prise de PALFORZIA, puis pendant les 2 heures suivantes, car cela peut augmenter la probabilité d'une réaction allergique.

PALFORZIA est disponible en gélules ou en sachets. La poudre orale PALFORZIA doit être extraite des gélules ou sachets avant d'être mélangée à un aliment.

Ne pas avaler les gélules.

Schéma thérapeutique

Le traitement par PALFORZIA comporte 3 phases: la phase initiale à doses croissantes, la phase d'augmentation de la dose et la phase d'entretien. Vous devez suivre les phases du traitement dans l'ordre prescrit par votre médecin. Pendant la phase initiale à doses croissantes et pendant celle de l'augmentation progressive de la dose, le traitement par PALFORZIA est pris en doses précises et croissantes. Pendant la phase d'entretien, la même dose de PALFORZIA doit être prise chaque jour.

Afin de maintenir l'effet du traitement, PALFORZIA doit être pris quotidiennement.

Informez votre médecin le jour de chaque consultation si vous ne vous sentez pas bien ou si vous pensez que votre asthme est moins bien contrôlé.

Phase initiale à doses croissantes

Les premières doses (phase initiale à doses croissantes) de PALFORZIA vous seront administrées sur une seule journée en l'espace de 4-5 heures au cabinet médical.

Enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans:

Le premier jour, PALFORZIA est administré selon les doses suivantes: 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 3 mg et 6 mg.

Enfants âgés de 1 à 3 ans:

Le premier jour, PALFORZIA est administré selon les doses suivantes: 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg et 3 mg.

Phase d'augmentation de la dose

Si vous tolérez la phase de traitement initial à doses croissantes, vous devrez retourner chez votre médecin un autre jour (généralement le lendemain) pour commencer la phase d'augmentation de la dose.

La première dose de chaque palier d'augmentation de la dose vous est administrée par votre médecin à son cabinet ou en milieu hospitalier. Si vous tolérez la première dose d'un nouveau palier de dose, votre médecin vous demandera de continuer à prendre cette dose chaque jour à domicile pendant environ 2 semaines.

Enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans:



Il y a 11 paliers différents d'augmentation de la dose, de PALFORZIA 3 mg (palier 1) à PALFORZIA 300 mg (palier 11).

Les 11 paliers d'augmentation de la dose doivent être terminés avant de pouvoir commencer le traitement d'entretien. Terminer tous les paliers de la phase d'augmentation de la dose prendra au moins 22 semaines.

Pendant la phase d'augmentation de la dose, une consultation avec votre médecin aura lieu toutes les 2 semaines environ pour une évaluation en vue du passage à un nouveau palier de dose.

Les paliers de la phase d'augmentation de la dose sont les suivants: 3 mg (palier 1), 6 mg (palier 2), 12 mg (palier 3), 20 mg (palier 4), 40 mg (palier 5), 80 mg (palier 6), 120 mg (palier 7), 160 mg (palier 8), 200 mg (palier 9), 240 mg (palier 10) et 300 mg (palier 11).

Enfants âgés de 1 à 3 ans:

Il y a 12 paliers différents d'augmentation de la dose, de PALFORZIA 1 mg (palier 0) à PALFORZIA 300 mg (palier 11).

Les 12 paliers d'augmentation de la dose doivent être terminés avant de pouvoir commencer le traitement d'entretien. Terminer tous les paliers de la phase d'augmentation de la dose prendra au moins 24 semaines.

Pendant la phase d'augmentation de la dose, une consultation avec votre médecin aura lieu toutes les 2 semaines environ pour une évaluation en vue du passage à un nouveau palier de dose.

Les paliers de la phase d'augmentation de la dose sont les suivants: 1 mg (palier 0), 3 mg (palier 1), 6 mg (palier 2), 12 mg (palier 3), 20 mg (palier 4), 40 mg (palier 5), 80 mg (palier 6), 120 mg (palier 7), 160 mg (palier 8), 200 mg (palier 9), 240 mg (palier 10) et 300 mg (palier 11).

Traitement d'entretien

Si vous avez toléré tous les paliers de la phase d'augmentation de la dose, votre médecin vous demandera de continuer à prendre PALFORZIA à la dose de 300 mg chaque jour en traitement d'entretien.

Préparation pour l'administration

Ouvrez la ou les gélule(s) correspondant à la dose quotidienne de PALFORZIA.

- Pour ouvrir une gélule, tirez doucement chacune de ses deux extrémités et faites-les rouler délicatement entre le pouce et l'index. Tapotez les extrémités de chaque moitié de la gélule pour vous assurer que toute la poudre est sortie.
- Ouvrez les sachets en les découpant ou les déchirant soigneusement le long de la ligne indiquée. Retournez le sachet et tapotez-le pour vous assurer que son contenu a bien été entièrement vidé.

Saupoudrez la totalité de la dose de PALFORZIA poudre orale sur des aliments semi-solides tels que de la compote de pommes, du yaourt ou du flan. Assurez-vous de ne pas être allergique à l'aliment utilisé pour le mélange.

L'aliment utilisé pour le mélange ne doit pas être chauffé ou pas à une température supérieure à la température ambiante.

Bien mélanger.

La quantité de nourriture utilisée doit permettre de consommer la totalité de la dose de PALFORZIA en quelques cuillerées.

Prenez PALFORZIA immédiatement après l'avoir mélangée à l'aliment. Cependant, si nécessaire, vous pouvez conserver le mélange au réfrigérateur pendant une durée maximum de 8 heures avant de l'ingérer. S'il n'est pas utilisé dans les 8 heures, il doit être éliminé et une nouvelle dose doit être préparée.

Remarques concernant la manipulation

N'inhalez pas la poudre contenue dans la gélule ou le sachet de PALFORZIA, car cela pourrait provoquer des difficultés respiratoires (aggravation de l'asthme) ou une réaction allergique.



N'avez pas les gélules.

Lavez-vous les mains immédiatement après avoir manipulé les gélules ou les sachets de PALFORZIA.

Lorsque votre médecin vous aura dit qu'un palier de la phase d'augmentation de la dose est terminé, vous devrez éliminer les gélules ou sachets restant dans la boîte (voir «À quoi faut-il encore faire attention?»).

Instructions pour l'administration

Prenez PALFORZIA à peu près à la même heure chaque jour avec un aliment, de préférence au dîner.

La prise doit avoir lieu au moins 2 heures avant le coucher.

Chez les enfants, chaque dose de PALFORZIA doit être administrée par un adulte qui doit le surveiller ensuite pendant environ une heure afin d'identifier tout symptôme éventuel de réaction allergique.

Vous ne devez pas prendre de bain chaud ou de douche chaude juste avant la prise de PALFORZIA et pendant les deux à trois heures qui suivent.

N'ayez pas d'activité physique intense juste avant de prendre PALFORZIA ou pendant les deux à trois heures qui suivent.

Si vous avez eu une activité physique intense ou que vous avez pris un bain ou une douche chaude et que vous avez chaud, ou si vous transpirez et que votre cœur bat vite, attendez d'avoir moins chaud et un rythme cardiaque à nouveau normal pour prendre PALFORZIA.

Ne dépassez pas la dose quotidienne de PALFORZIA qui vous a été prescrite.

Ne prenez pas PALFORZIA chez vous les jours de votre consultation médicale, car c'est votre médecin qui vous administrera PALFORZIA ces jours-là.

Si vous avez pris plus de PALFORZIA que vous n'auriez dû

La prise de doses de PALFORZIA supérieures aux doses recommandées augmente le risque de réactions allergiques.

En cas de réactions sévères telles que des difficultés à avaler, des difficultés à respirer, des modifications de la voix ou une sensation de gorge serrée, traitez cette réaction selon les instructions médicales préalablement obtenues puis contactez immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre PALFORZIA

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

L'oubli de doses de PALFORZIA peut entraîner un risque important de réactions allergiques aux arachides, car l'effet du traitement peut être perdu.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur ce qu'il faut faire si vous manquez une dose.

- Si vous avez oublié de prendre votre dose de PALFORZIA pendant un ou deux jours consécutifs, prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.
- Si vous oubliez 3 doses quotidiennes ou plus à la suite, ne prenez pas votre prochaine dose de PALFORZIA et demandez conseil à votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre PALFORZIA

L'arrêt de PALFORZIA peut entraîner un risque important de réactions allergiques aux arachides, car l'effet du traitement a vraisemblablement été perdu.

Si vous avez arrêté de prendre PALFORZIA pendant 3 jours ou plus, parlez-en à votre médecin avant de prendre une autre dose, car la prochaine dose devra peut-être être prise sous la surveillance d'un médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.



Quels effets secondaires PALFORZIA peut-il provoquer?

PALFORZIA peut provoquer des réactions allergiques sévères qui peuvent engager le pronostic vital. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre PALFORZIA, traitez la réaction selon les instructions reçues précédemment de votre médecin, puis consultez *immédiatement* un médecin.

- Difficultés à respirer
- Sensation d'oppression ou de corps étranger dans la gorge
- Difficultés à avaler ou à parler
- Voix modifiée
- Vertiges ou évanouissement ou sentiment de malaise imminent
- Fortes crampes ou douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée
- Fortes bouffées congestives, rougeur (bouffées vasomotrices) ou démangeaisons de la peau

PALFORZIA peut provoquer des troubles gastriques et digestifs, y compris une œsophagite à éosinophiles. Il s'agit d'une affection qui apparaît dans la zone située entre la bouche et l'estomac et qui touche jusqu'à 1 personne traitée sur 1000. L'œsophagite à éosinophiles peut se manifester par les symptômes suivants:

- Difficultés à avaler
- Aliments coincés dans la gorge
- Sensation de brûlure dans la poitrine, la bouche ou la gorge
- Reflux (régurgitation)
- Difficultés à s'alimenter
- Prise de poids insuffisante
- Perte d'appétit

Si ces symptômes persistent, contactez un médecin.

PALFORZIA peut provoquer les effets secondaires suivants, qui ont été observés lors des études cliniques menées avec PALFORZIA.

Très fréquent (concerne plus d'un utilisateur sur 10)

- Réaction allergique sévère
- Toux
- Irritation de la gorge
- Sensation de gorge serrée
- Douleur dans la gorge et la bouche
- Rhinite allergique (nez qui coule, éternuements, nez qui démange, gêne au niveau du nez)
- Éternuements
- Nez bouché
- Vomissements
- Maux d'estomac
- Gêne gastrique (nausées)
- Démangeaisons de la bouche
- Picotements ou engourdissement de la bouche
- Démangeaisons



- Éruption cutanée
- Papules

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

- Détresse respiratoire
- Sifflement
- Voix rauque
- Tousotements
- Picotements ou engourdissement de la gorge
- Troubles digestifs
- Difficultés à avaler
- Salivation accrue
- Inflammation des lèvres
- Diarrhée
- Gonflement de la bouche
- Plaies dans la bouche
- Gêne dans la poitrine
- Bouffées de chaleur
- Fatigue
- Gonflement du visage
- Sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge
- Maux de tête
- Oppression
- Gonflements sous la peau
- Eczéma
- Yeux qui démangent
- Yeux gonflés
- Larmolement accru
- Conjonctivite allergique (yeux qui démangent, yeux larmoyants)
- Rougeur des yeux
- Oreilles qui démangent

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

- Symptômes de l'œsophagite à éosinophiles (difficulté à avaler, aliments coincés dans la gorge, sensation de brûlure dans la poitrine, la bouche ou la gorge, éructations, difficulté à s'alimenter, faible prise de poids, diminution de l'appétit)

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.



Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Tenir hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

La couleur de la poudre orale PALFORZIA varie du blanc au blanc crème (gélules de 0,5 mg, 1 mg et 10 mg), du blanc crème au beige clair (gélules de 20 mg) jusqu'au beige (gélules de 100 mg, sachet de 300 mg). N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des amas solides de poudre qui ne se délitent pas facilement ou si la poudre présente une couleur anormale.

Ne jetez aucun médicament avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient PALFORZIA?

Principes actifs

Allergènes d'arachide (*Arachis hypogaea*) correspondant à 1 mg, 10 mg, 20 mg, 100 mg ou 300 mg de protéines d'arachide.

Excipients

PALFORZIA 0,5 mg, 1 mg, 10 mg, 20 mg:

Amidon prégélatinisé, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

PALFORZIA 100 mg und 300 mg:

Cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

67733 (Swissmedic)

Où obtenez-vous PALFORZIA? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Présentation pour l'augmentation de la dose:

Palier 0 (1 mg): 16 gélules à 1 mg (soit 16 doses à 1 x 1 mg)

Palier 1 (3 mg): 48 gélules à 1 mg (soit 16 doses à 3 x 1 mg)

Palier 2 (6 mg): 96 gélules à 1 mg (soit 16 doses à 6 x 1 mg)

Palier 3 (12 mg): 32 gélules à 1 mg, 16 gélules à 10 mg (soit 16 doses à 2 x 1 mg + 1 x 10 mg)

Palier 4 (20 mg): 16 gélules à 20 mg (soit 16 doses à 1 x 20 mg)

Palier 5 (40 mg): 32 gélules à 20 mg (soit 16 doses à 2 x 20 mg)

Palier 6 (80 mg): 64 gélules à 20 mg (soit 16 doses à 4 x 20 mg)

Palier 7 (120 mg): 16 gélules à 20 mg, 16 gélules à 100 mg (soit 16 doses à 1 x 20 mg + 1 x 100 mg)

Palier 8 (160 mg): 48 gélules à 20 mg, 16 gélules à 100 mg (soit 16 doses à 3 x 20 mg + 1 x 100 mg)

Palier 9 (200 mg): 32 gélules à 100 mg (soit 16 doses à 2 x 100 mg)

Palier 10 (240 mg): 32 gélules à 20 mg, 32 gélules à 100 mg (soit 16 doses à 2 x 20 mg + 2 x 100 mg)

Palier 11 (300 mg): 15 sachets à 300 mg (soit 15 doses à 300 mg)



Présentation pour le traitement d'entretien:

30 sachets à 300 mg (soit 30 doses à 300 mg)

Titulaire de l'autorisation

Stallergenes AG, 8305 Dietlikon

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

