

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Diclo-Acino 140 mg/140 cm², emplâtre médicamenteux

Qu'est-ce que Diclo-Acino emplâtre médicamenteux et quand doit-il être utilisé?

Diclo-Acino emplâtre médicamenteux est un emplâtre médicamenteux flexible et autoadhésif à appliquer sur la peau qui contient le principe actif diclofénac, une substance possédant des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires.

Diclo-Acino emplâtre médicamenteux est utilisé pour le traitement local de douleurs, d'inflammations et de tuméfactions secondaires à des contusions, luxations, entorses et claquages.

Quand Diclo-Acino emplâtre médicamenteux ne doit-il pas être utilisé?

Diclo-Acino emplâtre médicamenteux ne doit pas s'utiliser:

- en cas d'hypersensibilité à l'égard du principe actif ou à l'un des excipients selon la composition (voir «Que contient Diclo-Acino emplâtre médicamenteux?»)
- en cas d'hypersensibilité à d'autres analgésiques et anti-inflammatoires (p.ex. l'acide acétylsalicylique)
- pendant les 3 derniers mois de la grossesse (voir aussi «Diclo-Acino emplâtre médicamenteux peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Diclo-Acino emplâtre médicamenteux ne doit pas s'utiliser sur des plaies ouvertes (p.ex. écorchures, coupures etc.) ni sur une peau eczémateuse.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Diclo-Acino emplâtre médicamenteux?

Il faut éviter que Diclo-Acino emplâtre médicamenteux entre en contact avec les yeux et les muqueuses. Ce médicament contient 1400 mg de propylène glycol par emplâtre médicamenteux. Le propylène-glycol peut causer une irritation cutanée.

Ce médicament contient du dibutylhydroxytoluène, qui peut causer des irritations cutanées localisées (p. ex. dermatite de contact) et irriter les yeux et les muqueuses.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous avez déjà utilisé des préparations similaires (pommades antirhumatismales) qui ont provoqué des réactions allergiques
- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).



Diclo-Acino emplâtre médicamenteux peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Par mesure de précaution, sauf avis contraire du médecin, vous devriez renoncer à utiliser Diclo-Acino emplâtre médicamenteux durant les premier et deuxième trimestres de la grossesse et l'allaitement. Diclo-Acino emplâtre médicamenteux ne doit pas être utilisé pendant le troisième trimestre de la grossesse.

Comment utiliser Diclo-Acino emplâtre médicamenteux?

Appliquer 1 emplâtre médicamenteux autoadhésif sur la région cutanée à traiter 2x par jour, matin et soir. Avant la pose, enlever le film transparent protégeant la surface gélatineuse.

La durée du traitement ne devrait pas dépasser 14 jours.

L'utilisation de Diclo-Acino emplâtre médicamenteux chez les enfants n'a pas été examinée systématiquement jusqu'à présent.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Diclo-Acino emplâtre médicamenteux peut-il provoquer?

Diclo-Acino emplâtre médicamenteux est en général bien toléré. L'utilisation de Diclo-Acino emplâtre médicamenteux peut provoquer les effets secondaires suivants: démangeaisons, rougeurs, tuméfactions ou vésicules à l'endroit traité.

Ont été observés de très rares cas d'éruption cutanée violente, réactions allergiques telles que respiration sifflante, difficultés respiratoires ou gonflement du visage ou plus grande sensibilité à la lumière du soleil. Si l'un des effets indésirables suivants se présente, interrompez le traitement avec Diclo-Acino emplâtre médicamenteux et informez-en immédiatement votre médecin: éruption cutanée violente, respiration sifflante, difficultés respiratoires ou gonflement du visage.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage. Les emplâtres médicamenteux doivent être utilisés dans les 3 mois suivant la première ouverture de l'enveloppe. L'emballage peut être refermé de façon étanche à l'air à tout moment après avoir été ouvert, afin que les emplâtres médicamenteux puissent garder leur humidité.

Conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas conserver au-dessus de 25 °C. Ne pas congeler et ne pas conserver au réfrigérateur. Conserver hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Diclo-Acino emplâtre médicamenteux?

Principes actifs

140 mg de diclofénac sodique par 14 g correspondant à une concentration de 1% de diclofénac sodique.

Excipients

Couche de support: non-tissé de polyester.



Pâte contenant le principe actif: éther laurique de macrogol, adipate de diisopropyle, glycérol, propylène glycol, sorbitol liquide (crystallisable), polyacrylate de sodium, carmellose sodique, copolymère basique d'acrylate de butyle et de méthyle, silice colloïdale anhydre, argile légère, sulfate de sodium anhydre, édétate disodique, butylhydroxytoluène (E 321), sulfate d'aluminium et de potassium déshydraté, acide tartrique, menthol, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

62770 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Diclo-Acino emplâtre médicamenteux? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Diclo-Acino 140 mg/140 cm² : emballages de 2, 5 et 10 emplâtres médicamenteux.

Titulaire de l'autorisation

Acino Pharma AG, Liesberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

