

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggiore beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Diclo-Acino 140 mg/140 cm², cerotto medicato

Che cos'è Diclo-Acino cerotto medicato e quando si usa?

Diclo-Acino cerotto medicato è un cerotto medicato flessibile e autoadesivo da applicare sulla pelle, contenente il principio attivo diclofenac, una sostanza con proprietà analgesiche e antiinfiammatorie.

Diclo-Acino cerotto medicato è utilizzato nel trattamento locale di dolori, infiammazioni e tumefazioni in seguito a slogature, lussazioni, contusioni e strappi muscolari.

Quando non si può usare Diclo-Acino cerotto medicato?

Diclo-Acino cerotto medicato non deve essere utilizzato in caso di:

- ipersensibilità al principio attivo o ad una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione (vedi «Cosa contiene Diclo-Acino cerotto medicato?»),
- ipersensibilità ad altri analgesici ed antinfiammatori (per es. l'acido acetilsalicilico),
- negli ultimi 3 mesi di gravidanza (vedi anche «Si può usare Diclo-Acino cerotto medicato durante la gravidanza o l'allattamento?»).

Diclo-Acino cerotto medicato non deve essere applicato su ferite aperte (escoriazioni, tagli ecc.) o su pelle eczematosa.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Diclo-Acino cerotto medicato?

Evitare che Diclo-Acino cerotto medicato entri in contatto con gli occhi o con le mucose.

Questo medicamento contiene 1400 mg di glicole propilenico per cerotto medicato. Il glicole propilenico può causare irritazioni della pelle.

Questo medicamento contiene butilidrossitoluene. Può causare irritazioni della pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto), irritazioni degli occhi e delle mucose.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- in passato ha avuto reazioni allergiche in seguito all'impiego di medicinali simili (pomate antireumatiche),
- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Diclo-Acino cerotto medicato durante la gravidanza o l'allattamento?

Per prudenza dovrebbe rinunciare all'impiego di Diclo-Acino cerotto medicato durante il 1° e il 2° trimestre di gravidanza e durante il periodo d'allattamento, se non prescritto espressamente dal medico.

Diclo-Acino cerotto medicato non deve essere utilizzato nell'ultimo trimestre di gravidanza.

Come usare Diclo-Acino cerotto medicato?



Applicare 1 cerotto medicato autoadesivo sulla parte da trattare 2 volte al giorno, uno al mattino e uno alla sera.

Togliere il foglio trasparente protettivo dalla superficie gelatinosa prima dell'uso. La durata del trattamento non deve superare i 14 giorni.

L'utilizzo di Diclo-Acino cerotto medicato nei bambini non è stato fino ad ora controllato sistematicamente. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Diclo-Acino cerotto medicato?

In generale Diclo-Acino cerotto medicato è ben tollerato. I seguenti effetti collaterali possono manifestarsi con l'applicazione di Diclo-Acino cerotto medicato: prurito, arrossamento, gonfiore o formazione di vesciche sulla zona trattata.

Molto raramente si sono manifestate forti eruzioni cutanee, reazioni allergiche come respirazione affannosa, dispnea, gonfiore al volto oppure aumentata sensibilità alla luce solare.

Interrompa la terapia con Diclo-Acino cerotto medicato e informi immediatamente il medico se si dovessero manifestare i seguenti effetti collaterali: forte eruzione cutanea, respirazione affannosa, dispnea oppure gonfiore al volto.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Dopo l'apertura della busta, i cerotti medicati vanno utilizzati entro 3 mesi. Dopo l'apertura la confezione può essere richiusa ermeticamente in ogni momento, in modo che i cerotti medicati conservino la loro umidità.

Conservare nella confezione originale. Non conservare a temperature superiori ai 25°C.

Non congelare e non conservare in frigorifero.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Diclo-Acino cerotto medicato?

Principio attivo

140 mg di diclofenac sodico per 14 g corrispondono ad una concentrazione di diclofenac sodico all'1%.

Sostanze ausiliarie

Pellicola di copertura: tessuto di supporto in TNT di poliestere.

Pasta contenente il principio attivo: macrogol laurile etere, diisopropil adipato, glicerolo, glicole propilenico, sorbitolo liquido cristallizzabile, poliacrilato sodico, carmellosa sodica, butile metacrilato copolimero basico, silice colloidale anidra, caolino leggero, solfato sodico anidro, edetato disodico, butilidrossitoluene (E 321), alluminio potassio solfato essiccato, acido tartarico, mentolo, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

62770 (Swissmedic)



Dove è ottenibile Diclo-Acino cerotto medicato? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Diclo-Acino 140 mg/140 cm²: confezioni da 2, 5 e 10 cerotti medicati.

Titolare dell'omologazione

Acino Pharma AG, Liesberg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

