

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Notakehl® D3, pommade

Médicament homéopathique

Quand Notakehl® D3, pommade est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique Notakehl® D3, pommade peut être utilisé sur ordonnance médicale en cas de dermatose purulente.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Notakehl® D3, pommade peut être utilisé simultanément.

Quand Notakehl® D3, pommade ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

Notakehl® D3, pommade ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à la pénicilline ou à des substances similaires.

Les expériences documentées sur l'utilisation de la pommade Notakehl D3 chez les enfants et les adolescents sont insuffisantes. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez les enfants et les adolescents. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si,

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Notakehl® D3, pommade peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

Comment utiliser Notakehl® D3, pommade?

Posologie / mode d'emploi chez l'adulte:

Sauf prescription contraire du médecin appliquer 1–3 fois par jour une couche mince sur la partie atteinte ou plus épaisse sur le pansement.

L'utilisation et la sécurité de Notakehl D3 solution injectable ne sont pas encore étudiées chez les enfants et les adolescents

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.



Quels effets secondaires Notakehl® D3, pommade peut-il provoquer?

L'utilisation de Notakehl® D3, pommade peut provoquer les effets secondaires suivants: dans des cas très rares des réactions d'hypersensibilité (allergie à la pénicilline et à des substances similaires) sont possibles. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien. L'utilisation de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Notakehl® D3, pommade et informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient. Garder les médicaments hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient Notakehl® D3, pommade?

1 g de pommade contient:

Penicillium notatum (chrysogenum) D3 dilutio (HAB, 5a) 100 mg.

Cette préparation contient en outre des excipients: Alcoholes adipis lanae; Alcohol cetylicus et stearylicus; Vaselinum album; Triglycerida saturata media; Glyceroli monostearas 40-55; Propylenglycolum; Magnesii sulfas heptahydricus; Acidum lacticum; Aqua.

Numéro d'autorisation

50290 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Notakehl® D3, pommade? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage de 30 g.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

