

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Cocculine[®], comprimés

Boiron SA

Médicament homéopathique

Quand Cocculine est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Cocculine peut être utilisé en cas de nausées ou vomissements sans fièvre ou en cas de mal des transports: mal de mer, mal de voiture, mal de l'air, mal de train.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Cocculine peut être pris/utilisé simultanément.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Quand Cocculine ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas de fièvre ou de troubles d'estomac persistants ou récurrents, se manifestant par une région douloureuse circonscrite ou par une douleur localisée à la palpation ou qui sont associées à un sentiment de mal-être général requièrent un examen chez le médecin.

Les troubles d'estomac survenant chez les enfants de moins de 6 ans doivent être investigués par un médecin. Ce médicament ne doit par conséquent pas être remis aux enfants de moins de 6 ans sans ordonnance médicale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Cocculine peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Cocculine?

Sauf prescription contraire du médecin:

Nausées et vomissements sans fièvre:

Adultes et enfants dès 6 ans:



Dès l'apparition des symptômes, 1 comprimé à chaque nausée et/ou vomissement. Espacer selon amélioration. Ne pas prendre plus de 8 comprimés par jour.

La durée du traitement sans avis médical ne doit pas dépasser 48 heures.

Avant utilisation, veuillez lire les précautions d'utilisation indiquées dans la section «Quand Cocculine ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?»

Mal des transports:

Adultes et enfants dès 2 ans:

Préventif: 2 comprimés 3 fois par jour la veille du départ si possible et le jour du voyage.

Curatif: 2 comprimés toutes les heures pendant le voyage.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés par jour.

Chez les enfants de moins de 2 ans, utiliser le médicament uniquement après consultation de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Les comprimés de saveur légèrement sucrée peuvent être sucés ou doivent être dissous dans un peu d'eau pour les enfants de moins de 6 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Cocculine peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Cocculine et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Cocculine n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Cocculine?

Principes actifs

Anamirta cocculus 4 CH

Nicotiana tabacum 4 CH

Petroleum 4 CH

Strychnos nux vomica 4 CH

à parties égales.



Excipients

Saccharose, lactose et stéarate de magnésium.

Numéro d'autorisation

53005 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Cocculine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 30 comprimés.

Titulaire de l'autorisation

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabricant

BOIRON SA – France

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

