

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista (o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cocculine[®], compresse

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Cocculine?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Cocculine può essere usato in caso di nausea o vomito senza febbre, oppure in caso di mal di viaggio: mal di mare, mal d'auto, mal d'aria, mal di treno.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere/usare Cocculine.

Se il suo medico l'ha informata di un'intolleranza ad alcuni zuccheri, si metta in contatto con lui prima di assumere questo medicamento.

Quando non si può assumere Cocculine e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di febbre o disturbi gastrici persistenti o ricorrenti che si manifestano con l'apparizione di una zona dolente circoscritta o sotto forma di un dolore localizzato alla palpazione oppure associati a una sensazione di malessere generale, è necessario consultare un medico.

I disturbi gastrici sopravvenuti nei bambini di meno di 6 anni di età devono essere esaminati da un medico. Di conseguenza, questo medicamento non deve essere somministrato ai bambini di meno di 6 anni di età senza prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali o li applica esternamente (anche acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere Cocculine durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Cocculine?

Salvo diversa prescrizione medica:

Nausee e vomito senza febbre:

Adulti e bambini a partire dai 6 anni di età:



Sin dall'apparizione dei sintomi, 1 compressa a ogni nausea e/o vomito. Ridurre poi la frequenza secondo il miglioramento. Non assumere più di 8 compresse al giorno.

La durata del trattamento senza consulto medico non deve oltrepassare le 48 ore.

Prima di prendere il medicamento, leggere le precauzioni di utilizzo indicate nella sezione «Quando non si può usare Cocculine e quando la sua somministrazione richiede prudenza?».

Mal di viaggio:

Adulti e bambini a partire dai 2 anni di età:

Come prevenzione: 2 compresse 3 volte al dì il giorno prima di partire, se possibile, e il giorno del viaggio.

Come cura: 2 compresse ogni ora durante il viaggio

Non assumere più di 8 compresse al giorno.

Nei bambini di meno di 2 anni di età, usare il medicamento solo dopo aver consultato il proprio medico, farmacista o droghiere.

Interrompere le somministrazioni alla scomparsa dei sintomi.

Le compresse, di sapore leggermente zuccherino, possono essere succhiate o devono essere disciolte in un po' d'acqua per i bambini di meno di 6 anni di età.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Cocculine?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Cocculine e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di Cocculine.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cocculine?

Principi attivi

Anamirta cocculus 4 CH

Nicotiana tabacum 4 CH

Petroleum 4 CH

Strychnos nux vomica 4 CH

in parti uguali.



Sostanze ausiliarie

Saccarosio, lattosio e stearato di magnesio.

Numero dell'omologazione

53005 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Cocculine? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 30 compresse.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA – France

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

