

Selomida® Raffreddore

Medicamento biochimico secondo il Dr. Schüssler

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa Selomida® Raffreddore?

Selomida® Raffreddore è un medicamento omeopatico, che viene utilizzato secondo i principi terapeutici del Dr. Schüssler. Esso contiene come principi attivi i sali di Schüssler n. 3, 4, 5, 8, 10 e 21.

Secondo il principio terapeutico biochimico del Dr. Schüssler, Selomida® Raffreddore può essere utilizzato per alleviare i sintomi influenzali e quelli da raffreddamento, quali mal di gola, raucedine, rinite, tosse, brividi, febbre lieve, e per favorire i meccanismi di difesa in caso di tendenza al raffreddamento.

L'uso di questi sali di Schüssler nei campi di applicazione ricordati si basa su una lunghissima tradizione.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Selomida® Raffreddore.

Questo medicamento non è destinato al trattamento delle carenze minerali (es. ferro, zinco).

Selomida® Raffreddore contiene 7,5 g di lattosio per bustina. Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza agli zuccheri, lo informi prima di assumere questo medicamento.

Diabetici: 1 bustina corrisponde a 7,5 g di carboidrati.

Quando non si può assumere Selomida® Raffreddore e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di febbre elevata, se dopo 3 giorni non compare alcun miglioramento o se le condizioni peggiorano, bisogna rivolgersi al medico. Tosse, febbre elevata e dolore nei bambini sotto i 2 anni necessitano di un accertamento medico. Perciò, il preparato non va usato nei bambini sotto i 2 anni senza prescrizione medica.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può assumere Selomida® Raffreddore durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Selomida® Raffreddore?



Bambini dai 2 anni e adulti:

Nei disturbi acuti, sciogliere fino a 3 volte al giorno il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua o di tè e bere a piccoli sorsi.

In caso di tendenza al raffreddamento e come coadiuvante nel processo di guarigione, sciogliere ogni giorno il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua o di tè e bere a piccoli sorsi distribuiti nel corso della giornata.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se nel trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo porti da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Selomida® Raffreddore?

Nelle persone con intolleranza al lattosio (lo zucchero del latte), l'assunzione del medicamento può causare disturbi gastrointestinali o avere un effetto lassativo.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare il medicamento a temperatura ambiente (15–25°C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Selomida® Raffreddore?

1 bustina da 7,5 g contiene

Ferrum phosphoricum D12 (sale di Schüssler n. 3)

Kalium chloratum D6 (sale di Schüssler n. 4)

Kalium phosphoricum D6 (sale di Schüssler n. 5)

Natrium chloratum D6 (sale di Schüssler n. 8)

Natrium sulfuricum D6 (sale di Schüssler n. 10)

Zincum chloratum D12 (sale di Schüssler n. 21)

in parti uguali.

Questo preparato contiene come sostanza ausiliaria lattosio monoidrato.



Numero dell'omologazione

65358 (Swissmedic) ((*Vignette D*))

Dove è ottenibile Selomida® Raffreddore? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 12 e 30 bustine da 7,5 g.



Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2015 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

