

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Aricept®/- Evess

Pfizer AG

Qu'est-ce que l'Aricept et quand doit-il être utilisé?

Aricept contient comme principe actif le donépézil. Le donépézil appartient au groupe des médicaments appelés inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qui influencent certains processus du système nerveux central.

Aricept est utilisé dans le traitement des troubles des facultés mentales (par ex. perte de la mémoire, difficulté à trouver les mots, confusion mentale) qu'entraîne la maladie d'Alzheimer.

Aricept ne pourra pas guérir cette maladie. Toutefois, il peut atténuer les symptômes provoqués par la maladie et améliorer ainsi les activités de la vie quotidienne.

Selon prescription du médecin.

Quand Aricept ne doit-il pas être pris/utilisé?

Aricept ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité connue au principe actif du médicament, le donépézil, aux dérivés pipéridiniques ou à l'un des excipients.

Aricept ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Aricept?

Dans certaines circonstances, Aricept doit être utilisé uniquement avec prudence. C'est pourquoi vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous avez souffert d'un ulcère gastrique par le passé.
- vous prenez des analgésiques ou des médicaments anti-rhumatismaux.
- vous avez eu une crise d'épilepsie ou une maladie du cœur par le passé.
- vous souffrez d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire chronique.
- vous souffrez d'affections du foie.
- vous devez prochainement être hospitalisé(e) pour subir une opération sous anesthésie générale.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines! La prise d'Aricept peut, particulièrement au début du traitement ou lors d'une augmentation de la dose, provoquer de la fatigue, des vertiges et des crampes musculaires. La maladie d'Alzheimer elle-même peut affecter l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Votre médecin doit donc vérifier régulièrement votre capacité à pratiquer ces activités.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).



Informez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien si vous développez de la fièvre accompagnée de raideur musculaire, de sueurs ou un état de conscience réduit (symptômes pouvant correspondre à une maladie qu'on appelle «syndrome malin des neuroleptiques»).

Aricept peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pourriez le devenir. Aricept ne doit pas être pris durant la grossesse sauf sur prescription explicite de votre médecin.

On ignore si le donépézil passe dans le lait maternel. C'est pourquoi Aricept ne doit pas être utilisé par les femmes qui allaitent.

Comment utiliser Aricept?

Le dosage des comprimés que vous prenez peut être modifié en fonction de la durée du traitement que vous avez déjà suivi et de la prescription de votre médecin.

Sauf prescription médicale contraire, le traitement débutera par un comprimé pelliculé blanc à 5 mg ou un comprimé orodispersible blanc à 5 mg chaque soir juste avant le coucher. Par la suite (mais au plus tôt un mois après le début du traitement), votre médecin pourra vous recommander de prendre un comprimé pelliculé jaune à 10 mg ou un comprimé orodispersible jaune à 10 mg chaque soir juste avant le coucher. La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg.

Prise des comprimés pelliculés d'Aricept

Avaler les comprimés pelliculés d'Aricept avec un peu d'eau.

Prise des comprimés orodispersibles d'Aricept Evess

Placer le comprimé orodispersible sur la langue immédiatement après l'avoir sorti du blister. Laisser fondre le comprimé orodispersible sur la langue. Après sa dissolution, il peut être avalé avec ou sans eau.

Veuillez toujours suivre les directives de votre médecin concernant la façon et le moment de prendre votre médicament. Interrompez la prise des comprimés uniquement lorsque votre médecin vous l'ordonne.

Que devez-vous faire si vous avez pris trop de comprimés pelliculés ou orodispersibles?

Vous ne devez pas prendre plus de 1 comprimé pelliculé ou orodispersible par jour. Si vous en avez pris davantage, informez-en immédiatement votre médecin ou prenez contact avec l'hôpital le plus proche.

Que devez-vous faire si vous avez oublié de prendre un comprimé pelliculé ou orodispersible?

Si vous avez omis de prendre un comprimé pelliculé ou orodispersible, prenez le prochain comprimé pelliculé ou orodispersible le jour suivant à l'heure habituelle. Si vous avez omis de prendre vos comprimés pelliculés ou orodispersibles pendant plus d'une semaine, appelez votre médecin avant de poursuivre le traitement.

Quand l'effet d'Aricept se fait-il sentir?

Dans les études cliniques, une amélioration a été observée au plus tôt trois semaines après le début du traitement. Cependant, la réponse au traitement peut varier d'un individu à l'autre.

L'utilisation et la sécurité d'Aricept n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Aricept peut-il provoquer?

Les effets secondaires les plus fréquemment observés lors de la prise d'Aricept sont diarrhée, nausées et maux de tête, ainsi que crampes musculaires, fatigue, vomissements et insomnie. Dans la plupart des cas, les effets indésirables étaient de nature légère, de courte durée et ont disparu sans interruption du traitement.

La prise d'Aricept peut provoquer les effets secondaires suivants:



Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Refroidissement, hallucinations, rêves inhabituels et cauchemars, états d'excitation, comportement agressif, évanouissement, vertiges, insomnie, fatigue, douleurs, crampes musculaires, accidents (augmentation éventuelle du risque de chutes ou de blessures accidentelles), manque d'appétit, vomissements, troubles gastro-intestinaux, émission d'urine involontaire, éruption cutanée, démangeaisons.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Convulsions, ralentissement des battements cardiaques, ulcère de l'estomac ou du duodénum (pouvant provoquer des douleurs dans la région située entre le sternum et le nombril ainsi que des troubles digestifs), saignements de l'estomac ou de l'intestin (pouvant entraîner des selles noires ayant l'aspect du goudron ou un saignement visible par l'anus), faible augmentation du taux sanguin d'une enzyme musculaire (créatine kinase).

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Troubles du rythme cardiaque, raideur, tremblements ou mouvements incontrôlés, surtout du visage et de la langue, mais aussi des membres, troubles de la fonction hépatique y compris hépatite (inflammation du foie pouvant entraîner des nausées ou des vomissements, un manque d'appétit, un malaise général, une fièvre, des démangeaisons, une coloration jaune de la peau et des yeux et une coloration foncée de l'urine).

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Syndrome malin des neuroleptiques, qui, entre autres, peut se manifester par les symptômes suivants: fièvre accompagnée de raideur musculaire, sueurs ou réduction de l'état de conscience.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

Particularités: le principe actif étant dégradé très lentement dans l'organisme, les troubles du rythme cardiaque peuvent ne survenir que quelque temps après le début de la prise et peuvent également persister pendant une période prolongée après la fin du traitement. Les troubles du rythme cardiaque s'accompagnent d'un ralentissement des battements cardiaques, ce qui peut entraîner des vertiges et de brèves pertes de connaissance. Le médecin doit être informé en cas d'apparition de telles manifestations chez des patients traités par Aricept.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Vous devez rapporter tous les comprimés pelliculés restants à votre pharmacien.

Remarques concernant le stockage

Aricept, comprimés pelliculés: conserver à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Aricept Evess, comprimés orodispersibles: conserver à 15-30 °C et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Aricept?

Les comprimés pelliculés Aricept à 5 mg sont blancs, ronds, biconvexes et portent les inscriptions «ARICEPT» sur une face et «5» sur l'autre face.

Les comprimés pelliculés Aricept à 10 mg sont jaunes, ronds, biconvexes et portent les inscriptions «ARICEPT» sur une face et «10» sur l'autre face.



Les comprimés orodispersibles Aricept Evess à 5 mg sont blancs et portent les inscriptions «ARICEPT» sur une face et «5» sur l'autre face.

Les comprimés orodispersibles Aricept Evess à 10 mg sont jaunes et portent les inscriptions «ARICEPT» sur une face et «10» sur l'autre face.

Principes actifs

Chlorhydrate de donépézil.

1 comprimé pelliculé d'Aricept à 5 mg contient 5 mg de chlorhydrate de donépézil, ce qui correspond à 4.56 mg de donépézil.

1 comprimé pelliculé d'Aricept à 10 mg contient 10 mg de chlorhydrate de donépézil, ce qui correspond à 9.12 mg de donépézil.

1 comprimé orodispersible d'Aricept Evess à 5 mg contient 5 mg de chlorhydrate de donépézil, ce qui correspond à 4.56 mg de donépézil.

1 comprimé orodispersible d'Aricept Evess à 10 mg contient 10 mg de chlorhydrate de donépézil, ce qui correspond à 9.12 mg de donépézil.

Excipients

Aricept, comprimés pelliculés

Comprimés pelliculés à 5 mg: lactose monohydraté, amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, talc, macrogol 8000, hypromellose, dioxyde de titane.

Comprimés pelliculés à 10 mg: lactose monohydraté, amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, talc, macrogol 8000, hypromellose, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune.

Aricept Evess, comprimés orodispersibles

Comprimés orodispersibles à 5 mg: mannitol, silice colloïdale anhydre, carraghénane, poly(alcool vinylique).

Comprimés orodispersibles à 10 mg: mannitol, silice colloïdale anhydre, carraghénane, poly(alcool vinylique), oxyde de fer jaune.

Numéro d'autorisation

54274, 57312 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Aricept? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Aricept 5 mg/10 mg: emballages de 28 ou 98 comprimés pelliculés.

Aricept Evess 5 mg/10 mg: emballages de 28 ou 98 comprimés orodispersibles

Titulaire de l'autorisation

Pfizer AG, Zürich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

PIL V012

