

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Aricept®/- Evess

Pfizer AG

Che cos'è Aricept e quando si usa?

Aricept contiene il principio attivo donepezil. Il donepezil appartiene al gruppo di medicinali degli inibitori dell'acetilcolinesterasi, che influiscono su determinati processi del sistema nervoso centrale.

Aricept si usa per il trattamento dei disturbi delle facoltà mentali (ad es. perdita della memoria, difficoltà a trovare le parole, confusione) nella malattia di Alzheimer.

Aricept non sarà in grado di guarire la malattia, ma può migliorare i sintomi causati dalla patologia e, in tal modo, migliorare le sue funzioni generali nella vita quotidiana.

Su prescrizione medica.

Quando non si può usare Aricept?

Aricept non si può usare nei pazienti con ipersensibilità nota al principio attivo donepezil, ai derivati della piperidina o alle sostanze ausiliarie.

Aricept non va usato nei bambini e negli adolescenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Aricept?

In determinate circostanze Aricept va usato solo con cautela. Perciò deve informare il suo medico o il suo farmacista se:

- in passato ha sofferto di un'ulcera gastrica.
- prende analgesici o medicinali contro i reumatismi.
- in passato ha avuto un attacco epilettico o una malattia del cuore.
- soffre di asma o di un'altra malattia cronica dei polmoni.
- soffre di malattie del fegato.
- ha in programma un ricovero ospedaliero per sottoporsi a un'operazione in anestesia generale.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine! L'assunzione di Aricept, specialmente all'inizio del trattamento e in caso di aumento della dose, può causare stanchezza, vertigini e crampi muscolari. Anche la malattia di Alzheimer può ridurre la capacità di guidare un'auto o di utilizzare una macchina. Il suo medico deve perciò controllare regolarmente la sua capacità di svolgere queste attività.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di assumere le compresse rivestite con film di Aricept.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Informi immediatamente il suo medico o farmacista nel caso in cui sviluppi febbre associata a rigidità dei muscoli, sudorazione o stato di coscienza ridotto (sintomi riconducibili a una malattia nota come «sindrome neurolettica maligna»).



Si può assumere Aricept durante la gravidanza o l'allattamento?

Informi il suo medico se è incinta o se c'è la possibilità di una gravidanza. Aricept non deve essere usato durante la gravidanza eccetto se il suo medico lo prescriva espressamente.

Non è noto se il donepezil passi nel latte materno. Perciò, Aricept non deve essere usato da donne che allattano.

Come usare Aricept?

Il dosaggio della compressa che lei assume può cambiare in funzione della durata del trattamento già effettuato e in base alla prescrizione del suo medico.

Salvo diversa prescrizione del suo medico, all'inizio del trattamento assumerà tutte le sere, immediatamente prima di coricarsi, una compressa rivestita con film bianca da 5 mg o una compressa orodispersibile bianca da 5 mg. In seguito nel corso del trattamento (ma non meno di un mese dopo l'inizio del trattamento) il suo medico le può consigliare di assumere tutte le sere, immediatamente prima di coricarsi, una compressa rivestita con film gialla da 10 mg o una compressa orodispersibile gialla da 10 mg. La dose giornaliera massima consigliata è di 10 mg.

Assunzione delle compresse rivestite con film di Aricept

Ingerisca le compresse rivestite con film di Aricept con un po' di acqua.

Assunzione delle compresse orodispersibili di Aricept Evess

La compressa orodispersibile deve essere posta sulla lingua subito dopo essere stata tolta dal blister. Lasci sciogliere la compressa orodispersibile sulla lingua. Dopo che si è sciolta può essere ingerita con o senza acqua.

Si attenga sempre alle istruzioni del suo medico relative a come e quando assumere il medicamento. Interrompa l'assunzione delle compresse soltanto se lo ha prescritto il suo medico.

Come deve comportarsi se ha assunto troppe compresse rivestite con film od orodispersibili?

Non deve assumere più di una compressa rivestita con film od orodispersibile al giorno. Se ha assunto troppe compresse rivestite con film od orodispersibili deve informare senza indugio il suo medico o contattare l'ospedale più vicino.

Come deve comportarsi se ha dimenticato di assumere una compressa rivestita con film od orodispersibile?

Se ha dimenticato di assumere una compressa rivestita con film od orodispersibile, assuma la prossima compressa rivestita con film od orodispersibile il giorno successivo alla solita ora. Se ha dimenticato di assumere le compresse rivestite con film od orodispersibili per più di una settimana, telefoni al suo medico prima di assumere ulteriori compresse rivestite con film od orodispersibili.

In quanto tempo agisce Aricept?

In studi clinici è stato osservato un miglioramento al più presto tre settimane dopo l'inizio del trattamento. Tuttavia la risposta al trattamento può variare su base individuale.

L'uso e la sicurezza di Aricept nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Aricept?

I più comuni effetti collaterali in seguito all'assunzione di Aricept sono diarrea, nausea e mal di testa così come crampi muscolari, stanchezza, vomito e insonnia. Nella maggior parte dei casi gli effetti indesiderati sono stati lievi, di breve durata e sono scomparsi senza interrompere il trattamento.

I seguenti ulteriori effetti collaterali possono manifestarsi con l'assunzione di Aricept:



Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Raffreddore, allucinazioni, sogni insoliti e incubi, stati di eccitazione, comportamento aggressivo, svenimento, vertigini, insonnia, stanchezza, dolori, crampi muscolari, incidenti (eventuale rischio aumentato di caduta o di ferimenti accidentali), perdita di appetito, vomito, disturbi gastrointestinali, perdita involontaria di urina, eruzione cutanea, prurito.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Convulsioni, battito cardiaco rallentato, ulcera gastrica o duodenale (che si può manifestare con dolori addominali nella zona compresa tra lo sterno e l'ombelico e con disturbi digestivi), emorragie allo stomaco o all'intestino (che si possono manifestare con feci nere simili a catrame o con un sanguinamento evidente dall'ano), leggero aumento dei valori muscolari nel sangue (creatinchinasi).

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Disturbi del ritmo cardiaco, rigidità, tremore o movimenti incontrollati soprattutto del viso e della lingua ma anche delle membra, disturbi della funzionalità epatica, inclusa epatite (infiammazione del fegato; può manifestarsi con nausea o vomito, perdita di appetito, sensazione di malessere generale, febbre, prurito, colorazione gialla della pelle e degli occhi e colorazione scura delle urine).

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)

Sindrome neurolettica maligna, che può manifestarsi tra gli altri con i seguenti sintomi: febbre con rigidità dei muscoli, sudorazione o ridotto stato di coscienza.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Particolarità: poiché il principio attivo viene degradato molto lentamente nell'organismo, i disturbi del ritmo cardiaco possono manifestarsi solo qualche tempo dopo che si è iniziata l'assunzione ma durare anche per un periodo prolungato dopo l'interruzione del trattamento. I disturbi del ritmo cardiaco sono accompagnati da un rallentamento del battito cardiaco, che può provocare vertigini e brevi perdite di coscienza. Se queste manifestazioni si presentano in pazienti trattati con Aricept, si deve informarne il medico.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Le compresse rivestite con film non utilizzate devono essere riportate alla sua farmacia.

Istruzioni di conservazione

Aricept, compresse rivestite con film: conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Aricept Evess, compresse orodispersibili: conservare a 15-30 °C e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Che cosa contiene Aricept?

Le compresse rivestite con film di Aricept da 5 mg sono bianche, rotonde, biconvesse con impresso «ARICEPT» su un lato e «5» sull'altro.

Le compresse rivestite con film di Aricept da 10 mg sono gialle, rotonde, biconvesse con impresso «ARICEPT» su un lato e «10» sull'altro.

Le compresse orodispersibili di Aricept Evess da 5 mg sono bianche con impresso «ARICEPT» su un lato e «5» sull'altro.



Le compresse orodispersibili di Aricept Evess da 10 mg sono gialle con impresso «ARICEPT» su un lato e «10» sull'altro.

Principi attivi

Donepezil cloridrato.

1 compressa rivestita con film di Aricept da 5 mg contiene 5 mg di donepezil cloridrato corrispondenti a 4.56 mg di donepezil.

1 compressa rivestita con film di Aricept da 10 mg contiene 10 mg di donepezil cloridrato corrispondenti a 9.12 mg di donepezil.

1 compressa orodispersibile di Aricept Evess da 5 mg contiene 5 mg di donepezil cloridrato corrispondenti a 4.56 mg di donepezil.

1 compressa orodispersibile di Aricept Evess da 10 mg contiene 10 mg di donepezil cloridrato corrispondenti a 9.12 mg di donepezil.

Sostanze ausiliarie

Aricept, compresse rivestite con film

Comprese rivestite con film da 5 mg: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, macrogol 8000, ipromellosa, titanio diossido.

Comprese rivestite con film da 10 mg: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, macrogol 8000, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro giallo.

Aricept Evess, compresse orodispersibili

Comprese orodispersibili da 5 mg: mannitolo, silice colloidale anidra, carragenina, alcol polivinilico.

Comprese orodispersibili da 10 mg: mannitolo, silice colloidale anidra, carragenina, alcol polivinilico, ossido di ferro giallo.

Numero dell'omologazione

54274, 57312 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Aricept? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Aricept 5 mg/10 mg: confezioni da 28 o 98 compresse rivestite con film.

Aricept Evess 5 mg/10 mg: confezioni da 28 o 98 compresse orodispersibili.

Titolare dell'omologazione

Pfizer AG, Zürich.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PIL V012

