

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SEPTONSIL, liquide oral en gouttes

Médicament homéopathique-spagyrique

Quand SEPTONSIL est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique et les principes de la spagyrie, SEPTONSIL peut être utilisé en cas de pharyngite.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée sur les principes de l'homéopathie et les principes de la spagyrie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SEPTONSIL peut être pris simultanément.

Quand SEPTONSIL ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas de forte fièvre ou si aucune amélioration n'est constatée dans un délai d'une semaine, consultez un médecin. Si votre enfant est sujet aux refroidissements, il est recommandé de consulter un médecin. Le médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans. SEPTONSIL ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue aux Astéracées, par exemple à la camomille, à l'arnica, à l'échinacée, etc.

SEPTONSIL ne doit pas être utilisé en cas de maladies générales évolutives telles que la tuberculose, les maladies des globules blancs (leucémie), les collagénoses (processus auto-immuns généralisés avec modifications du tissu conjonctif comme dans le lupus érythémateux) et la sclérose en plaques.

Ce médicament contient 124 mg éthanol (d'alcool) par prise de 20 gouttes et 93 mg éthanol (d'alcool) par prise de 15 gouttes, cela correspond à 160 mg/ml (16,0 % p/v) d'éthanol. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 20 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 4 ml de bière ou 2 ml de vin. La quantité d'alcool contenue dans la prise de 15 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 3 ml de bière ou 1 ml de vin. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'a pas d'effet perceptible.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

SEPTONSIL peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de



votre droguiste.

Comment utiliser SEPTONSIL?

Sauf prescription contraire du médecin:

Adultes dès 18 ans: 20 gouttes 3 – 4 fois par jour, enfants dès 2 ans: 10 -15 gouttes 3 – 4 fois par jour dans un peu d'eau, à prendre avant les repas.

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SEPTONSIL peut-il provoquer?

La prise de SEPTONSIL peut entraîner les effets secondaires suivants: dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité peuvent survenir (Echinacea TM).

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SEPTONSIL et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «à utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SEPTONSIL?

1 g de liquide (= 1,01 ml/26 gouttes) contient:

Principes actifs

Aconitum napellus ex planta tota florentibus spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Ailanthus altissima (HAB) D4 120 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 120 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Barium carbonicum (HAB) D8 120 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex
planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 160 mg

Lachesis (HAB) D8 (HAB SV, 5a) 120 mg



Phytolacca americana (HAB) D4 120 mg

Excipients

éthanol, eau purifiée. Contient 20 % de vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

51454 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SEPTONSIL? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabricant

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

