

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SEPTONSIL, gocce orali

Medicamento omeopatico spagirico

Quando si usa SEPTONSIL?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici e il principio terapeutico della spagirica, SEPTONSIL può essere usato in caso di infiammazioni della gola.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico e il principio terapeutico della spagirica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SEPTONSIL.

Quando non si può assumere SEPTONSIL e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

In caso di febbre alta o se non si riscontra alcun miglioramento entro una settimana, consultare un medico. Se i bambini sono soggetti a raffreddori, si consiglia di consultare un medico. Il medicinale non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 2 anni. SEPTONSIL non deve essere somministrato in caso di allergia nota alle composite, ad es. camomilla, arnica, echinacea ecc. SEPTONSIL non deve essere utilizzato in caso di malattie sistemiche progressive come la tubercolosi, malattie dei globuli bianchi (leucemia), collagenosi (processi autoimmuni generalizzati con alterazioni del tessuto connettivo come nel lupus eritematoso) e sclerosi multipla.

Questo medicamento contiene 124 mg di etanolo (alcol) in 20 gocce e 93 mg di etanolo (alcol) in 15 gocce corrispondere 160 mg/ml (16.0 % w/v). La quantità in 20 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 4 ml di birra o 2 ml di vino. La quantità in 15 gocce di questo medicamento è equivalente a meno di 3 ml di birra o 1 ml di vino. La piccola quantità di alcol contenuta in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere SEPTONSIL durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.



Come usare SEPTONSIL?

Salvo diversa prescrizione medica: Adulti dai 18 anni in su: 20 gocce 3-4 volte al giorno, bambini dai 2 anni in su: 10-15 gocce 3-4 volte al giorno con un po' d'acqua prima dei pasti.

Non somministrare a bambini di età inferiore ai 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SEPTONSIL?

L'assunzione di SEPTONSIL può causare i seguenti effetti collaterali: in rari casi possono verificarsi reazioni di ipersensibilità (Echinacea TM).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SEPTONSIL e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «Verwendbar bis» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SEPTONSIL?

1 g di liquido (= 1,01 ml/26 gocce) contiene:

Principi attivi

Aconitum napellus ex planta tota florentibus spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Ailanthus altissima (HAB) D4 120 mg

Argentum nitricum (HAB) D4 120 mg

Atropa belladonna ex planta tota sine stipite spag. Peka D4 (HAB 47a) 120 mg

Barium carbonicum (HAB) D8 120 mg

Echinacea angustifolia et/aut Echinacea pallida ex
planta tota cum floribus spag. Peka TM (HAB 47a) 160 mg

Lachesis (HAB) D8 (HAB SV, 5a) 120 mg

Phytolacca americana (HAB) D4 120 mg

Sostanze ausiliarie

ethanol, acqua purificata.



Contiene 20% vol. di alcol.

Numero dell'omologazione

51454 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SEPTONSIL? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, CH-3038 Kirchlindach

Fabbricante

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, D-88353 Kisslegg

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

