

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cetirizina Streuli® 10 mg

Streuli Pharma AG

Che cos'è Cetirizina Streuli 10 mg e quando si usa?

Cetirizina Streuli 10 mg è un medicamento efficace nel trattamento base di malattie allergiche. La sua azione consiste nel blocco dell'effetto dell'istamina liberata nell'organismo durante le reazioni allergiche. Cetirizina Streuli 10 mg si usa negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età per il trattamento di malattie allergiche come il raffreddore da fieno, la rinite allergica, la congiuntivite allergica e l'orticaria cronica (spesso associata a prurito). La durata del trattamento per i bambini con rinite allergica non deve superare le 4 settimane.

Quando non si può usare Cetirizina Streuli 10 mg?

Non devono assumere il medicamento i pazienti che presentano ipersensibilità al principio attivo, ad altre sostanze affini o ad uno qualsiasi dei componenti di Cetirizina Streuli 10 mg.

Cetirizina Streuli 10 mg non dev'essere assunto durante l'allattamento.

Le donne in gravidanza possono assumere Cetirizina Streuli 10 mg solo su prescrizione medica.

I pazienti con malattia renale allo stadio finale (con un tasso di filtrazione glomerulare (GFR) inferiore a 15 ml/min) non devono assumere Cetirizina Streuli 10 mg.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Cetirizina Streuli 10 mg?

Non devono essere trattati con Cetirizina Streuli 10 mg i bambini sotto i 6 anni.

L'eventuale assunzione di Cetirizina Streuli 10 mg in concomitanza con teofillina (un principio attivo per il trattamento dell'affanno respiratorio) deve avvenire esclusivamente dopo aver consultato il proprio medico.

Cetirizina Streuli 10 mg e i preparati contenenti glipizide (una sostanza per il trattamento del diabete) non devono essere assunti contemporaneamente. Si raccomanda di assumere il medicamento a base di glipizide al mattino e Cetirizina Streuli 10 mg alla sera.

Gli epilettici devono assumere Cetirizina Streuli 10 mg con cautela, perché potrebbe scatenare attacchi convulsivi.

Si raccomanda di usare cautela in caso di assunzione concomitante di Cetirizina Streuli 10 mg e calmanti o analgesici.

Si raccomanda inoltre cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchine, in quanto l'assunzione di Cetirizina Streuli 10 mg può indurre sonnolenza.

Durante il trattamento con Cetirizina Streuli 10 mg si consiglia di non consumare alcolici.

Se deve essere sottoposto a un test allergico, chiedi al suo medico se debba interrompere l'assunzione di Cetirizina Streuli 10 mg per alcuni giorni prima del test, poiché questo medicamento potrebbe influenzare il risultato del test allergico.

Nei pazienti con predisposizione alla ritenzione urinaria (per es. in caso di lesione del midollo spinale, ingrossamento della prostata), Cetirizina Streuli 10 mg può aumentare il rischio di ritenzione urinaria.

Le compresse rivestite contengono lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui



- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere Cetirizina Streuli 10 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

Nei test sugli animali non sono stati osservati effetti indesiderati. Si consiglia tuttavia di non assumere Cetirizina Streuli 10 mg né altri medicinali durante la gravidanza. Se si assume per errore Cetirizina Streuli 10 mg in gravidanza, non si prevedono effetti nocivi per il feto, tuttavia si raccomanda di interrompere immediatamente il trattamento.

Se è incinta o se pianifica una gravidanza, ne informi il suo medico.

Cetirizina Streuli 10 mg non dev'essere assunto durante l'allattamento in quanto il principio attivo passa al latte materno.

Come usare Cetirizina Streuli 10 mg?

Adulti e bambini dai 6 anni di età: la posologia abituale è di una compressa rivestita con film una volta al giorno.

Nei bambini dai 6 ai 12 anni di età la dose può essere frazionata in due assunzioni (mezza compressa rivestita con film ciascuna, al mattino e alla sera). Qualora dovessero manifestarsi leggeri effetti collaterali (stanchezza, mal di testa, disturbi gastrointestinali) che non si risolvono spontaneamente, è consigliabile frazionare la dose giornaliera anche negli adulti, suddividendola in due somministrazioni da mezza compressa rivestita con film ciascuna, al mattino e alla sera.

Pazienti con insufficienza renale moderata o grave

I pazienti con compromissione della funzionalità renale (insufficienza renale) possono essere trattati con una dose inferiore di medicamento in base alla gravità della malattia renale, secondo la posologia stabilita dal medico curante.

Le compresse rivestite con film vanno inghiottite senza masticare, con un bicchiere d'acqua o altro liquido.

Cetirizina Streuli 10 mg si può assumere ai pasti o lontano da essi. La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal decorso dei disturbi, e viene stabilita dal medico. Se dimentica di assumere una dose di Cetirizina Streuli 10 mg, continui semplicemente il trattamento. Non assuma una dose doppia per compensare quella dimenticata.

In caso di sovradosaggio si rivolga immediatamente al suo medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Cetirizina Streuli 10 mg?

Con l'assunzione di Cetirizina Streuli 10 mg possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 su 100 persone trattate)

Sono stati riportati lieve stanchezza, leggero mal di testa, sonnolenza, capogiri, secchezza della bocca, nausea.

Non comune (riguarda da 1 a 10 su 1000 persone trattate)

Disturbi gastrointestinali (p. es. diarrea, dolori addominali), malessere, prurito, eruzione cutanea, agitazione, disturbi della sensibilità cutanea, rinite, faringite, sensazione di debolezza.

Raro (riguarda da 1 a 10 su 10 000 persone trattate)

Reazioni di ipersensibilità, episodi convulsivi, insufficienza circolatoria, danni epatici, orticaria, tachicardia, edema (gonfiore), aumento di peso corporeo, stato confusionale, allucinazioni, insonnia, aggressività, stanchezza estrema, depressione.



Molto raro (riguarda meno di 1 su 10 000 persone trattate)

Disturbi motori, tremori, tic nervosi, reazioni di fotosensibilità, shock allergico, disturbi della minzione (escrezione urinaria anomala), disturbi della visione e movimento circolare incontrollabile degli occhi, trombocitopenia (ridotto numero di piastrine nel sangue), disgeusia (alterazione del gusto), sincope (svenimento).

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Perdita della memoria (amnesia), disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, capogiri (sensazione di rotazione o movimento), ritenzione urinaria, aumento dell'appetito, pensieri di suicidio, incubi, dolori articolari, dolori muscolari, eruzione cutanea acuta su tutto il corpo accompagnato da pustole ed epatite, infiammazione dei vasi sanguigni, perdita dell'udito.

Dopo sospensione del trattamento con cetirizina, sono stati segnalati prurito e/o orticaria.

Se riscontra uno di questi effetti collaterali, interrompa l'assunzione di Cetirizina Streuli 10 mg e informi il suo medico. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare il medicamento nella confezione originale, a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cetirizina Streuli 10 mg?

Principi attivi

1 compressa rivestita con film (divisibile) contiene: 10,0 mg di Cetirizina-dicloridrato.

Sostanze ausiliarie

1 compressa rivestita con film contiene: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Povidone K30, Magnesio stearato, Ipromellosa, Macrogol 6000, Talko (E 553b), Titanio diossido (E171), Emulsione Simeticone (E 900) (contiene dimeticone, metilcellulosa, idrato di biossido di silicio (E 551), biossido di silicio altamente disperso, acido sorbico (E 200)).

Numero dell'omologazione

56330 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Cetirizina Streuli 10 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia o in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 10, 30 o 50 compresse rivestite con film (divisibili).

Titolare dell'omologazione

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

