

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Mucedokehl® D5, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Mucedokehl® D5, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Mucedokehl® D5, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di infiammazioni croniche dei seni mascellari e frontali, otite media, nonché in caso di disturbi nervosi.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se contemporaneamente può assumere Mucedokehl® D5, gocce.

Quando non si può assumere Mucedokehl® D5, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non usare in caso di ipersensibilità nota verso le muffe (*Mucor mucedo*) e in presenza di malattie autoimmuni. Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Mucedokehl® D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Mucedokehl® D5, gocce?

Posologia / uso:

Adulti e adolescenti oltre i 12 anni: Prendere 8 gocce una volta al giorno prima di un pasto. Durante il trattamento con iniezioni prendere 5-10 gocce 2 volte per settimana ai giorni senza iniezione.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Dopo una durata massima della terapia di 4 settimane si consiglia di interrompere la somministrazione di Mucedokehl® D5, gocce.

Quali effetti collaterali può avere Mucedokehl® D5, gocce?



Sussiste la possibilità che si scateni un'allergia al componente Mucor mucedo. Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Mucedokehl® D5, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Mucedokehl® D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Mucedokehl® D5, gocce?

Mucor mucedo D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Numero dell'omologazione

50407 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Mucedokehl® D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 ml.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

