

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bisolvon® sciroppo contro la tosse, sciroppo

Opella Healthcare Switzerland AG

Che cos'è Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse e quando si usa?

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids contiene il principio attivo bromexina, preparato sinteticamente e simile a quello di una pianta medicinale indiana chiamata *Adhatoda vasica*. Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids fluidifica il muco bronchiale viscoso e ristagnante agevolandone l'espettorazione. Facilita la respirazione e calma lo stimolo della tosse.

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids è un medicamento per curare l'eccessiva produzione di muco in caso di tosse dovuta a infreddature. Su prescrizione medica il medicamento si può usare anche nelle malattie croniche delle vie respiratorie con formazione di secreto viscoso e difficoltà nel trasporto dello stesso.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids è indicato per i diabetici.

Quando non si può assumere Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse?

Se il bambino è ipersensibile al principio attivo bromexina o ad un altro costituente del medicamento non può assumere lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse?

Se durante i primi giorni di trattamento il suo bambino soffre di difficoltà di respirazione, grave malessere o febbre alta, oppure se dopo 1 settimana di trattamento l'eccessiva secrezione di muco e la tosse che l'accompagna non regrediscono o addirittura si aggravano, deve consultare un medico.

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids si può assumere assieme a medicinali che bloccano la tosse (soprattutto la codeina) soltanto su esplicita prescrizione medica. In caso di forte secrezione di muco nelle vie respiratorie potrebbe infatti determinarsi un inauspicato ristagno di muco con rischio di spasmo bronchiale e infezione delle vie respiratorie.

In presenza di disturbi di stomaco bisogna consultare il medico.

La prudenza si impone nei pazienti che soffrono o hanno sofferto in passato di ulcere gastriche.

Con la somministrazione di sostanze mucolitiche, contenute anche nello sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids, sono stati riferiti dei casi molto rari di gravi danni alla pelle. Finora non è ancora stata documentata una chiara correlazione. Se si manifestano dei danni alla pelle o alle mucose si deve consultare immediatamente un medico e, come misura precauzionale, cessare il trattamento con lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids.

L'uso concomitante di certi antireumatici ed analgesici (inibitori delle prostaglandine, p. es. diclofenac, ibuprofene, salicilati) può causare un potenziamento dell'effetto irritante sulla mucosa gastrica.

L'uso concomitante dello sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids e di determinati antibiotici (p. es. eritromicina) migliora il passaggio degli antibiotici stessi nel tessuto polmonare.

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids contiene 2,5 g di maltitolo per 5 ml di sciroppo. Se sa di soffrire di un'intolleranza allo zucchero, assuma lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids solo dopo aver consultato il medico. Il valore calorico è di 2,3 kcal/g di maltitolo.



Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids può avere un leggero effetto lassativo.

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids contiene 23 mg di propilen glicole per 5 ml, corrispondente a 4,6 mg/1 ml e 6,35 mg di acido benzoico per 5 ml, corrispondente a 1,27 mg/1 ml.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui il suo bambino

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse durante la gravidanza o l'allattamento?

Lo sciroppo contro la tosse non è destinato al trattamento degli adulti. Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids non si può assumere durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids?

Salvo diversa prescrizione del medico:

A ogni flacone è accluso un misurino graduato (1,25; 2,5 e 5 ml).

Bambini da 5 a 10 anni: 5 ml-10 ml 3 volte al giorno.

Bambini piccoli sopra i 2 anni: 2,5 ml 3 volte al giorno.

Lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids non è destinato ai bambini sotto i 2 anni.

Avvertenze generali

Durante il trattamento con lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids può verificarsi un aumento della produzione di muco.

Se il suo bambino soffre di una grave malattia del fegato o dei reni, le dosi sopraindicate si devono ridurre o somministrare a intervalli di tempo maggiori. Spetta al medico decidere come va adeguata la dose.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse?

Possono manifestarsi dei disturbi gastrointestinali (come dolori alla parte superiore del ventre, nausea, vomito o diarrea), che scompaiono rapidamente dopo la cessazione della terapia, oppure delle reazioni allergiche (compresi eruzioni sulla pelle, spasmi della muscolatura bronchiale, orticaria e prurito, fino a gonfiore del viso o delle mucose). In singoli casi queste reazioni possono arrivare fino allo choc cardiocircolatorio e richiedere assistenza medica. Se si manifestano sintomi di reazioni di questo genere deve smettere subito di somministrare al suo bambino lo sciroppo contro la tosse Bisolvon Kids e chiedere consiglio a un medico.

In caso di iperdosaggio, cioè di assunzione o somministrazione di quantità superiori alle dosi consigliate sopraindicate, gli effetti collaterali possono manifestarsi in forma più accentuata. In caso di forte iperdosaggio possono verificarsi aumento della secrezione di saliva, sensazione di dover vomitare, vomito e caduta della pressione arteriosa. In un caso del genere è indispensabile informare il medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere. Ciò vale in particolare anche per gli effetti collaterali non riportati nel presente foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).



Termine di consumo una volta aperta la confezione: 6 mesi.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse?

5 ml di sciroppo contengono 4 mg del principio attivo bromexina cloridrato.

Principio attivo:

Bromexina cloridrato

Sostanze ausiliarie

Maltitolo liquido (E965), propilen glicole (E1520), sucralosio, aromi (fragola, ciliegia), acido benzoico (E 210). Idrossietilcellulosa (da cotone modificato con tecnologia genetica), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

68163 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Bisolvon Kids sciroppo contro la tosse? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sciroppo: 200 ml.

Titolare dell'omologazione

Opella Healthcare Switzerland AG, Risch

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

