

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Clindamycin Zentiva®

Helvepharm AG

Che cos'è Clindamycin Zentiva e quando si usa?

Clindamycin Zentiva è un medicamento contro le malattie infettive batteriche che contiene il principio attivo clindamicina. Poiché questo non è simile alla penicillina o ai suoi derivati, Clindamycin Zentiva può essere impiegato in caso di ipersensibilità alla penicillina.

Dietro prescrizione del medico, Clindamycin Zentiva è indicato per il trattamento di diverse malattie infettive di origine batterica negli adulti:

Infezioni delle vie respiratorie e dei polmoni, nonché nell'area dell'orecchio-naso-gola (ad es. faringite, tonsillite, polmonite, otite media, sinusite, scarlattina, bronchite); infezioni della pelle e dei tessuti molli (ad es. ascessi, foruncoli, infezioni di ferite, acne); infezioni delle ossa e delle articolazioni; infezioni degli organi genitali femminili; infezioni dentali e gengivali.

Su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per il trattamento della malattia di cui lei soffre ora.

L'antibiotico clindamicina contenuto in Clindamycin Zentiva non è efficace contro tutti i microrganismi che causano malattie infettive. L'impiego di un antibiotico sbagliato o in dosaggio non corretto può dar luogo a complicazioni. Pertanto, non lo usi quindi mai di sua iniziativa per il trattamento di altre malattie o di altre persone.

Quando non si può assumere Clindamycin Zentiva?

Clindamycin Zentiva non deve essere assunto in caso di nota o presunta ipersensibilità (allergia) alla clindamicina o alla lincomicina.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Clindamycin Zentiva?

Clindamycin Zentiva va dosato con cautela in caso di gravi malattie epatiche, renali o gastrointestinali così come di disturbi della trasmissione di segnali tra nervi e muscoli (ad es. morbo di Parkinson o miastenia gravis, una malattia caratterizzata da debolezza muscolare) e asma bronchiale. I medicinali che inibiscono la peristalsi intestinale (movimento intestinale) non devono essere assunti nel caso in cui si manifesti diarrea.

Durante il trattamento con Clindamycin Zentiva sono state osservate in casi rari gravi reazioni cutanee come la reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e la pustolosi esantematica acuta generalizzata (PEAG). Se nota reazioni della pelle e/o delle mucose, si rivolga immediatamente al suo medico prima di continuare il trattamento.

- La sindrome DRESS si manifesta inizialmente con sintomi simil-influenzali e un'eruzione cutanea sul viso, seguita da un'eruzione cutanea estesa con temperatura corporea aumentata, aumento dei valori degli enzimi epatici agli esami del sangue, aumento di un determinato tipo di globuli bianchi (eosinofilia) e ingrossamento dei linfonodi.
- La PEAG si manifesta comunemente con un'eruzione cutanea estesa, squamosa, rossa, con pustole sotto la pelle [nelle pieghe cutanee, sul petto, sull'addome (inclusa la zona dello stomaco), sulla schiena e sulle braccia] e vescicole, accompagnata da febbre. I sintomi compaiono



solitamente all'inizio del trattamento.

Capsule rigide: A causa del rischio di infiammazione dell'esofago (esofagite) e di ulcera dell'esofago, è importante che le capsule rigide di Clindamycin Zentiva vengano assunte sempre esattamente come descritto nella rubrica «Come usare Clindamycin Zentiva?».

Durante il trattamento con Clindamycin Zentiva sono state osservate in casi rari gravi reazioni cutanee. Ai primi segni di reazioni allergiche (ad es. arrossamenti cutanei, eruzione cutanea con formazione di vescicole, gonfiori di viso, cute o mucose, difficoltà respiratorie) Clindamycin Zentiva deve essere interrotto e bisogna contattare immediatamente il medico.

Medicamenti contenenti altri principi attivi antibatterici (ad es. l'eritromicina) possono influenzare l'effetto di Clindamycin Zentiva e non devono quindi essere assunti contemporaneamente.

L'uso contemporaneo di Clindamycin Zentiva e medicinali contenenti rifampicina, un altro principio attivo antibatterico, può pregiudicare fortemente l'efficacia di Clindamycin Zentiva. Pertanto, se possibile, l'uso contemporaneo di questi due medicinali deve essere evitato.

In caso di assunzione contemporanea di medicinali contenenti acenocumarolo o di medicinali simili per la fluidificazione del sangue, la probabilità di sanguinamento può aumentare. Per il controllo della capacità coagulativa, possono essere necessari esami del sangue regolari.

Anche determinati altri medicinali possono influire sull'efficacia di Clindamycin Zentiva.

Lattosio

Clindamycin Zentiva capsule rigide contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Clindamycin Zentiva durante la gravidanza o l'allattamento?

In linea di principio, durante la gravidanza Clindamycin Zentiva non va assunto se non su esplicita prescrizione del medico.

Durante l'assunzione di Clindamycin Zentiva non si deve allattare. Eventualmente si deve interrompere l'allattamento o durante l'uso di Clindamycin Zentiva estrarre il latte con un tiralatte e gettarlo.

Come usare Clindamycin Zentiva?

Il medico stabilisce il dosaggio e la durata del trattamento secondo la gravità della malattia.

In genere la dose giornaliera per gli adulti va da 600 a 1800 mg, ripartita in 3 o 4 somministrazioni di uguale entità al giorno.

Le capsule rigide possono essere assunte indipendentemente dai pasti e vanno ingerite intere con un bicchiere pieno d'acqua e non meno di 30 minuti prima di coricarsi.

Le capsule rigide di Clindamycin Zentiva non sono adatte ai bambini che non riescono ancora a ingerire del tutto le capsule rigide.

Se con le capsule rigide non è possibile somministrare un dosaggio in mg/kg calcolato con precisione, deve essere utilizzata un'altra forma farmaceutica.

Una volta iniziata, la terapia antibiotica deve essere eseguita per tutta la durata prescritta dal medico. Spesso i sintomi della malattia scompaiono prima che l'infezione sia completamente guarita. Una durata insufficiente di utilizzo o la terminazione troppo precoce del trattamento può determinare una riacutizzazione della malattia.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia o la durata del trattamento prescritta. Se ritiene che l'azione del medicinale sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Clindamycin Zentiva?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Più comunemente compaiono eruzioni cutanee; altri effetti collaterali comuni sono determinate alterazioni dell'emocromo (cosiddetta eosinofilia, occorre un chiarimento da parte del medico), diarrea e disturbi della funzionalità epatica. Tali effetti collaterali possono comparire durante l'uso dell'antibiotico o solo dopo 2-3 settimane. Se si manifestano diarree gravi e persistenti con crampi addominali e febbre, il medicamento deve essere interrotto e deve essere avvisato immediatamente il medico curante.

Altrettanto comunemente è stata osservata colite.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1'000)

Occasionalmente sono stati riferiti dolori alla pancia, nausea, vomito, patologie del gusto, bassa pressione sanguigna, disturbi cardiaci e respiratori e orticaria.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Alterazioni dell'emocromo, accumuli di liquidi nella pelle, infiammazioni vaginali, prurito e gravi reazioni cutanee e d'ipersensibilità.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10'000)

Infiammazioni del fegato, dolori articolari.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Danno renale acuto, reazioni allergiche, gravi reazioni cutanee e d'ipersensibilità (PEAG, sindrome DRESS (cfr. «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Clindamycin Zentiva?»), vasculite cutanea (infiammazione dei vasi sanguigni della pelle), SDRIFE (esantema flessurale intertriginoso simmetrico correlato a farmaco; eruzione cutanea rossa che compare comunemente su entrambi i lati dei glutei, nella parte alta dell'interno coscia, nelle ascelle o sul collo)), ittero, mal di testa, vertigini, sonnolenza, infiammazioni dell'esofago*, ulcera dell'esofago*, infiammazione dell'intestino (colite da *Clostridioides difficile*).

*Effetti indesiderati che si manifestano con maggiore probabilità se le capsule rigide di Clindamycin Zentiva vengono assunte in posizione distesa e/o senza una quantità sufficiente d'acqua.

Informi immediatamente il suo medico se sviluppa un accumulo di liquidi che porta a gonfiore alle gambe, alle caviglie o ai piedi, respiro affannoso o nausea.

Ai primi segni di reazioni allergiche (ad es. arrossamenti cutanei, eruzione cutanea con formazione di vescicole, gonfiori di viso, cute o mucose, difficoltà respiratorie), Clindamycin Zentiva deve essere interrotto e bisogna contattare immediatamente il medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Al termine del trattamento, il medicamento rimanente deve essere riportato al medico o al farmacista affinché sia smaltito correttamente.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Clindamycin Zentiva?



Principi attivi

1 capsula rigida bianca contiene 150 mg oppure 300 mg di clindamicina sotto forma di clindamicina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, titanio diossido (E171), gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico

Numero dell'omologazione

61727 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Clindamycin Zentiva? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

Clindamycin Zentiva 150 mg, capsule rigide: 16.

Clindamycin Zentiva 300 mg, capsule rigide: 16.

Titolare dell'omologazione

Helvepharm AG, Frauenfeld.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'agosto 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

