

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

PRILID LEMAN PATCH

Che cos'è PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato e quando si usa?

PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato contiene i principi attivi prilocaina e lidocaina.

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato è un cerotto pronto per l'uso con un disco bianco di cellulosa, che contiene 1 g di emulsione di Prilid Leman.

L' PRILID LEMAN PATCH anestetizza localmente la pelle intatta. Il preparato si usa in caso di piccoli interventi come p. es. le punture con aghi o il trattamento chirurgico di piccole lesioni locali.

PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato si può usare soltanto su prescrizione e sotto il costante controllo del medico.

Quando non si può usare PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato ?

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato non si può usare in caso d'ipersensibilità conosciuta nota ai principi attivi o ad una delle sostanze ausiliarie.

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato non si deve applicare né su ferite né sulla mucosa genitale.

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato non è adatto per preparare una vaccinazione antitubercolare mediante iniezione.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato ?

In prossimità degli occhi e delle orecchie l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato va usata con prudenza. Se per inavvertenza PRILID LEMAN PATCH venisse a contatto con gli occhi bisogna lavarli immediatamente bene con acqua tiepida.

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato non si deve usare per i prematuri nati prima della 37 settimana di gravidanza. Nei pazienti affetti da dermatite atopica (infiammazioni della pelle) l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato non va lasciato sulla pelle per più di 15-30 minuti per evitare che si manifestino gli effetti collaterali (come una porpora) che in questi casi sono più frequenti.

L' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato si può applicare solo sulla pelle intatta.

Informi il medico se ha uno dei rari problemi metabolici seguenti: carenza di glucoso-6-fosfato deidrogenasi, metaemoglobinemia congenita o acquisita. In questi casi il rischio di una metaemoglobinemia da farmaci è aumentato.

Informi il medico o il farmacista nel caso in cui:

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma o applichi esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o prevede una gravidanza, oppure se allatta, può usare l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato solo dopo aver consultato il medico.



Come usare PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato ?

Di solito l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato si deve applicare almeno un'ora prima dell'inizio dell'intervento previsto addresso la pelle intatta. L'effetto anestetizzante persiste per almeno due ore dopo aver tolto il cerotto.

Ai bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi non si devono applicare più di due cerotti contemporaneamente. Ai neonati sotto i tre mesi non si può applicare più di un cerotto per volta. Il cerotto non deve restare sulla pelle più di un'ora.

Date le dimensioni del cerotto, l'uso dell' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato è meno indicato su certi punti del corpo dei neonati e dei bambini piccoli.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato?

In seguito all'applicazione dell' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato provoca delle reazioni locali passeggera, come ad es. pallore, arrossamento, reazioni cutanee associate ad una lieve sensazione iniziale di bruciore e prurito o edemi (accumuli di liquido nei tessuti). Questi effetti collaterali sono di breve durata.

La prilocaina a dosi elevate può incrementare la formazione di metaemoglobina.

Se l'applicazione avviene correttamente secondo le prescrizioni sull'uso non sono da prevedersi effetti collaterali a livello sistemico. Tuttavia è opportuno consultare subito il medico se si manifestano i seguenti sintomi: nervosismo, ansia, confusione, alterazioni dello stato di coscienza, sensazione di vertigini, vista offuscata o diplopia (veder doppio), sensazione di caldo o di freddo, crampi muscolari, tremore, vomito, ridotta frequenza cardiaca (bradicardia), abbassamento della pressione arteriosa (ipotensione), svenimento.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Raramente possono verificarsi anche delle reazioni allergiche. Il medico va consultato immediatamente in presenza dei seguenti sintomi: gonfiori della pelle con prurito (orticaria), gonfiore del viso e del collo (angioedema), difficoltà respiratorie (broncospasmi), collasso cardiocircolatorio (shock anafilattico).

Se inavvertitamente PRILID LEMAN PATCH viene a contatto con gli occhi è possibile una loro irritazione.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare l' PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato a temperatura non superiore a 25°, non conservare in frigorifero e non congelare.



Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato?

1 PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato contiene 1 g di emulsione Prilid Leman.

Principi attivi

1 g di emulsione contiene come principi attivi 25 mg di lidocaina e 25 mg di prilocaina

Sostanze ausiliarie

Macrogol 54 gliceril idrossistearato, carbomero 974P, idrossido di sodio, acqua depurata

Matériel du support :

Cellulosa, copolimero etilene-acetato di vinile, poliestere, alluminio, polietilene, adesivo acrilico

Numero dell'omologazione

69921 (Swissmedic).

Dove è ottenibile PRILID LEMAN PATCH, cerotto medicato? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 2 e 20 cerotti.

Titolare dell'omologazione

Leman SKL SA, Lancy

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Modo d'uso

L'area cutanea da trattare deve essere intatta e prima dell'applicazione del cerotto deve essere pulita e asciutta.

1. Tenendo il cerotto con una mano sull'angolo della pellicola di alluminio sporgente, con l'altra mano staccare con cautela il morbido cerotto color pelle dalla carta che aderisce alla pellicola protettiva di alluminio. Qualora la carta rimanesse adesa al cerotto, occorre staccarla dal cerotto inserendo l'unghia del pollice tra la carta e il cerotto.

2. Applicare il cerotto in modo che il disco bianco di cellulosa (impregnato di Prilid Leman) copra la zona di pelle da trattare.

3. Accertarsi che il cerotto aderisca bene tutt'intorno. Per permettere un contatto ottimale della pelle coll'Prilid Leman premere leggermente il cerotto, ma non al centro.



4. Ora si può annotare sul cerotto con una penna a sfera l'ora dell'applicazione.

