

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Exmykehl D5, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Exmykehl D5, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici il Exmykehl D5, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di micosi settici della pelle e delle mucose.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Exmykehl D5, gocce. Se i sintomi persistono, bisogna consultare un medico.

Quando non si può usare Exmykehl D5, gocce e quando il suo uso richiede prudenza?

Exmykehl D5, gocce non può essere usato in caso di allergia contro la penicillina e simili. Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare Exmykehl D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Exmykehl D5, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica:

Da prendere: Adulti prendere 8 gocce al giorno.

Da inalare: Adulti 2-3 volte al giorno 10-20 inspirazioni profondi.

Da massaggiare sulla pelle: Adulti massaggiare una volta al giorno 5-10 gocce sulla parte malate o instillare nel gomito.

L'uso e la sicurezza dell Exmykehl D5, nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati.

Non toccare la punta della pipetta.. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta.



Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Exmykehl D5, gocce?

In seguito all'applicazione di Exmykehl D5, gocce possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Reazioni allergiche contro la penicillina e simili. Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento coll' Exmykehl D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Exmykehl D5, gocce?

1 mL di soluzione contiene:

1 mL Candida albicans D5 aquos. dilutio (HAB; 5a), Candida parapsilosis D5 aquos. dilutio (HAB; 5a), Penicillium roquefortii D5 aquos. dilutio (HAB; 5a) ana partes ad solutionem.

Numero dell'omologazione

54 132 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Exmykehl D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Flaconi contagocce da 10 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

