

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Escitalopram Sandoz® 5/10/15/20 mg, compresse rivestite con film/ Escitalopram Sandoz® 10/20 mg, compresse orodispersibili/ Escitalopram Sandoz® 20 mg/ml, gocce orali, soluzione

Sandoz Pharmaceuticals AG

Che cos'è Escitalopram Sandoz e quando si usa?

Escitalopram Sandoz è un antidepressivo contenente il principio attivo escitalopram e appartiene al gruppo degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Gli inibitori della ricaptazione della serotonina contribuiscono a normalizzare il livello della serotonina nel cervello.

Escitalopram Sandoz si usa per la terapia di malattie psichiche (depressioni) che si manifestano sotto forma di abbattimento persistente, mancanza di energia, tristezza, complessi d'inferiorità, disturbi del sonno, desiderio di solitudine e paura di non riuscire.

Escitalopram Sandoz è indicato anche per prevenire una recidiva della malattia.

Escitalopram Sandoz viene anche usato per il trattamento degli stati ansiosi, delle fobie sociali (paura patologica delle situazioni sociali), del disturbo d'ansia generalizzata, dei disturbi da attacchi da panico e dei disturbi ossessivi compulsivi.

Su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Escitalopram Sandoz?

- Non deve usare il medicamento se è allergico/a a uno dei costituenti di Escitalopram Sandoz.
- Escitalopram Sandoz non deve essere preso contemporaneamente ai cosiddetti inibitori della MAO. Ciò comprende la selegilina (usato per il trattamento del morbo di Parkinson), il moclobemide (usato per il trattamento delle depressioni) e il linezolid (un antibiotico).
- Il cambiamento da Escitalopram Sandoz a inibitori della MAO o viceversa, può avvenire solo sotto un accurato controllo medico e inserendo alcuni giorni senza terapia.
- In caso di passaggio dal moclobemide a Escitalopram Sandoz si deve attendere almeno un giorno dall'ultima assunzione dal moclobemide al primo giorno dell'assunzione di Escitalopram Sandoz. In caso di passaggio da Escitalopram Sandoz al moclobemide bisogna prevedere un intervallo di 7 giorni senza Escitalopram Sandoz.
- Se presenta dalla nascita o se ha avuto un episodio di anomalia del ritmo cardiaco (identificato con un ECG, un esame condotto per valutare come funziona il cuore).
- Se assume medicinali per problemi del ritmo cardiaco o che possono influenzare il ritmo del cuore (per es. antipsicotici, antidepressivi triciclici, alcuni agenti antimicrobici (come moxifloxacina, pentamidina, trattamenti antimalarici)).
- Escitalopram Sandoz non si può prendere contemporaneamente con il pimozide.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Escitalopram Sandoz?

Si attenga alle prescrizioni del medico e non interrompa la presa del medicamento senza informarlo.

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!



Avverta assolutamente il suo medico se soffre di una disfunzione del fegato o dei reni, o di diabete, o soffre di epilessia o in passato si sono verificati dei disturbi a riguardo. Informi inoltre il suo medico se sta ricevendo un trattamento elettroconvulsivante.

Il medico dovrà eventualmente adattare la posologia del farmaco.

Si rivolga al medico prima di prendere Escitalopram Sandoz, soprattutto se soffre delle seguenti malattie:

- se soffre o ha sofferto di problemi cardiaci o ha avuto recentemente un attacco di cuore;
- se ha un ritmo cardiaco a riposo basso e/o se sa di avere carenze saline a seguito di una prolungata grave diarrea e vomito o utilizza diuretici (farmaci per urinare);
- se le capita di avere un ritmo cardiaco rapido o irregolare, di svenire, collassare o provare un giramento di testa alzandosi in piedi, che può indicare un'anomalia di funzionamento del ritmo cardiaco.
- se ha una storia di disturbi emorragici o se è incinta (vedi «Si può assumere Escitalopram Sandoz durante la gravidanza o l'allattamento?»).

Alcuni pazienti affetti da malattia maniaco-depressiva possono entrare in una fase maniacale. Questa è caratterizzata da idee insolite che cambiano rapidamente, felicità inappropriata e iperattività. Se avverte queste sensazioni è importante informare il suo medico.

Sintomi come irrequietezza o difficoltà a star seduti possono verificarsi durante le prime settimane di trattamento. Se si presentano questi sintomi, informi il suo medico.

Durante la somministrazione di medicinali come Escitalopram Sandoz sono stati osservati allungamento del tempo di sanguinamento e/o disturbi emorragici (per es. sanguinamenti cutanei o mucosi ed emorragie del tratto gastro-intestinale). Il rischio aumenta se si prendono contemporaneamente medicinali che influiscono sulla coagulazione del sangue (come l'acido acetilsalicilico o antinfiammatori non steroidei).

Alcuni medicinali possono influenzare il modo in cui agiscono altri medicinali e questo a volte può causare gravi effetti collaterali.

Se prende uno dei seguenti medicinali con Escitalopram Sandoz, può portare alla sindrome serotoninergica, una condizione potenzialmente pericolosa per la vita. Questi medicinali possono interagire con escitalopram e lei può manifestare sintomi quali contrazioni muscolari ritmiche involontarie, compresi i muscoli che controllano il movimento dell'occhio, irrequietezza, allucinazioni, coma, sudorazione eccessiva, tremori, riflessi esagerati, aumento della tensione muscolare, temperatura corporea superiore 38°C. Informi immediatamente il medico o l'operatore sanitario se si verificano questi sintomi.

Escitalopram Sandoz deve quindi essere usato con cautela con i seguenti medicinali, poiché può portare alla sindrome serotoninergica:

- Il litio (un principio attivo per la cura di malattie maniaco-depressive),
- Il triptofano (un principio attivo per il trattamento delle depressioni),
- Il buprenorfina e tramadolo o altri oppioidi (un forte antidolorifico),
- Il sumatriptan e simili principi attivi per il trattamento dell'emicrania (triptani),
- L'iperico (Erba di San Giovanni), un preparato vegetale contro le variazioni dell'umore,
- e altri medicinali per la depressione (noti come inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (SNRI), inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o antidepressivi triciclici,
- Se soffre di morbo di Parkinson e se prende il principio attivo selegilina deve informarne il suo medico (vedi «Quando non si può usare Escitalopram Sandoz?»).

Anche Escitalopram Sandoz e i seguenti medicinali devono essere combinati con cautela:

- La cimetidina (un principio attivo contro l'acidità di stomaco) può aumentare il livello di escitalopram nel sangue, ragione per cui il suo medico diminuirà eventualmente la dose di Escitalopram Sandoz.



- Gli anticoagulanti presi per via orale (medicamenti come per es. la warfarina, utilizzati per ridurre la densità del sangue) possono avere un effetto ridotto se presi contemporaneamente a Escitalopram Sandoz. Il suo medico effettuerà perciò ripetutamente controlli sul tempo di coagulazione del suo sangue all'inizio e durante il trattamento con Escitalopram Sandoz.
- Durante un trattamento con medicinali, in linea di massima, si deve rinunciare a consumare alcool.

In concomitanza a Escitalopram Sandoz, prenda solo quei medicinali che le sono stati consentiti dal suo medico.

Pensieri di suicidio e peggioramento della sua depressione o del suo disturbo d'ansia:

Se soffre di depressione e/o ha disturbi d'ansia può talvolta pensare di farsi del male o di suicidarsi. Questi pensieri possono essere più rafforzati all'inizio del trattamento con gli antidepressivi, poiché questi medicinali impiegano generalmente circa due settimane o più per mostrare il loro effetto. È più probabile che lei abbia questi pensieri,

- se in precedenza aveva già pensato di farsi del male o di suicidarsi,
- se è un giovane adulto. I dati da studi clinici hanno mostrato un elevato rischio di comportamento correlato al suicidio in adulti di età inferiore a 25 anni trattati con un antidepressivo.

Se lei soffre di pensieri negativi o percepisce un peggioramento della depressione (per es. dovesse pensare di farsi del male o di suicidarsi), contatti immediatamente il suo medico o si rechi in ospedale.

Può essere d'aiuto informare un parente stretto o un amico rispettivamente un'amica che lei soffre di depressione o di un disturbo d'ansia, e chiedere loro di leggere questo foglietto illustrativo. Può chiedere loro di dirle se pensano che la sua depressione o la sua ansia stanno peggiorando o se hanno notato la presenza di qualche cambiamento del suo comportamento.

La terapia non dev'essere interrotta bruscamente e può avvenire solo con l'accordo del suo medico, data la possibilità di sintomi da sospensione.

Citalopram, un medicinale simile all'escitalopram, in studi su animali, ha dimostrato di ridurre la qualità dello sperma. Ciò potrebbe influenzare la fertilità. L'impatto sulla fertilità umana non è stato ancora osservato.

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film e Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili contengono lattosio.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film e Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili contengono meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».

Escitalopram Sandoz gocce orali, soluzione contengono piccole quantità di etanolo (alcool), inferiori a 100 mg per 1 ml di soluzione (corrispondente a 20 gocce).

Escitalopram Sandoz gocce orali, soluzione contengono meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 1 ml di soluzione (corrispondente a 20 gocce), cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o applica esternamente.

Si può assumere Escitalopram Sandoz durante la gravidanza o l'allattamento?

Informi il suo medico se è incinta o se prevede una gravidanza. Salvo esplicita prescrizione del suo medico, Escitalopram Sandoz non si deve prendere durante la gravidanza.



Nei neonati di madri che hanno ricevuto escitalopram nelle ultime fasi della gravidanza, possono comparire subito o poco tempo dopo il parto i seguenti sintomi: disturbi dell'alimentazione e del sonno, difficoltà respiratorie, colorito bluastrò della pelle, convulsioni, instabilità della temperatura corporea, ipoglicemia (bassi livelli di glucosio nel sangue), tremore, nervosismo, tensione muscolare o eccessivo rilassamento muscolare, iperreflessia, vomito, irritabilità, letargia e pianto continuo. Se il neonato presentasse uno di questi sintomi, contatti il suo medico.

Si assicuri che l'ostetrica e/o il suo medico sappiano che lei sta assumendo Escitalopram Sandoz. Quando assunti durante la gravidanza medicinali come Escitalopram Sandoz (SSRI) possono aumentare il rischio di una grave condizione nei bambini, chiamata ipertensione polmonare persistente del neonato (PPHN), che fa respirare il bambino più velocemente e lo fa apparire bluastrò. Questi sintomi di solito si manifestano durante le prime 24 ore dalla nascita del bambino. Se ciò accade al suo bimbo, deve contattare immediatamente l'ostetrica e/o il suo medico.

Se prende Escitalopram Sandoz verso la fine della gravidanza, il rischio di gravi emorragie vaginali subito dopo il parto può aumentare, soprattutto se ha una storia di disturbi emorragici. Il medico o l'ostetrica devono essere informati che sta assumendo Escitalopram Sandoz in modo che possano consigliarla di conseguenza.

Escitalopram Sandoz non può essere assunto durante l'allattamento. Se l'assunzione del prodotto è indispensabile, si deve interrompere l'allattamento.

Ci si aspetta che escitalopram venga escreto nel latte materno.

Come usare Escitalopram Sandoz?

Si attenga in ogni caso alle dosi prescritte dal suo medico.

Il dosaggio di 5 mg non può essere coperto con le compresse orodispersibili di Escitalopram Sandoz.

Escitalopram Sandoz viene preso in un'unica dose giornaliera.

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film:

Le compresse rivestite con film possono essere assunte indipendentemente dall'assunzione di cibo. Prendere le compresse rivestite con film, senza masticarle, con un bicchiere d'acqua.

Le compresse rivestite con film da 10 mg, 15 mg e 20 mg possono essere divise in dosi uguali.

In caso di problemi nella divisione delle compresse rivestite con film a mano, si consiglia l'uso di un tagliacomprese.

Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili:

Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili va assunto a digiuno. Per evitare la rottura delle compresse orodispersibili, non premere per rimuoverle dal blister. Non toccare le compresse orodispersibili con le mani bagnate, altrimenti le compresse potrebbero rompersi.

1. Tenga il blister ai bordi e strappi con cura un singolo blister lungo le linee di divisione.




Fig. 1

2. Rimuova con cautela la copertura.





Fig. 2

3. Metta la compressa orodispersibile sulla lingua. La compressa orodispersibile si scioglierà rapidamente e potrà essere ingerita senz'acqua e senza essere masticata.



Fig. 3

Escitalopram Sandoz 20 mg/ml, gocce orali, soluzione:

Le gocce orali possono essere assunte indipendentemente dall'assunzione di cibo. Le gocce orali possono essere mescolate solo con acqua, succo d'arancia o succo di mele. Le gocce orali non devono essere mescolate con altri liquidi né miscelate con altri medicinali.

1 mg corrisponde a 1 goccia (5 mg = 5 gocce, 10 mg = 10 gocce, 20 mg = 20 gocce).

Capovolgere completamente il flacone. Se nessuna goccia esce, picchiare leggermente il flacone per avviare il flusso.



Depressioni, fobia sociale, disturbi d'ansia generalizzati, disturbi ossessivi compulsivi:

Per gli adulti la dose abituale è di 10 mg al giorno. Il suo medico può aumentare la dose. La dose massima consigliata è di 20 mg al giorno.

Se soffre di una malattia del fegato il suo medico le prescriverà, durante le prime 2 settimane, una dose iniziale più bassa di 5 mg al giorno. Il dosaggio di 5 mg non può essere coperto con le compresse orodispersibili di Escitalopram Sandoz. Più in avanti il suo medico potrà aumentare la dose giornaliera a 10 mg.

Disturbi da attacchi da panico:

La dose iniziale nella prima settimana di trattamento è di 5 mg al giorno, la dose viene aumentata a 10 mg al giorno. Il dosaggio di 5 mg non può essere coperto con le compresse orodispersibili di Escitalopram Sandoz. Il suo medico può aumentare la dose. La dose massima è di 20 mg al giorno.

In pazienti anziani la dose iniziale abituale è di 5 mg al giorno. Il dosaggio di 5 mg non può essere coperto con le compresse orodispersibili di Escitalopram Sandoz. La dose può essere aumentata dal suo medico fino a 10 mg al giorno.

Escitalopram Sandoz non è indicato per il trattamento dei bambini e degli adolescenti perché la sicurezza e l'efficacia del medicamento, in questa fascia d'età, non sono state dimostrate.

Come per altri farmaci per il trattamento delle depressioni, occorrono alcune settimane prima che l'effetto si faccia sentire. Continui perciò a prendere Escitalopram Sandoz anche se non nota subito un miglioramento del suo stato.



La durata del trattamento può variare molto da persona a persona, in generale, richiede almeno 6 mesi. In alcuni casi il suo medico può giudicare necessario un trattamento più lungo. Continui a prendere il medicamento secondo la prescrizione del medico anche se si sente meglio. La malattia di base può continuare a sussistere per molto tempo; se interrompe troppo presto il trattamento i sintomi possono perciò riapparire.

Se si è dimenticato di prendere Escitalopram Sandoz, prenda la prossima dose all'ora abituale. Non raddoppi la dose.

Poiché l'interruzione improvvisa di Escitalopram Sandoz può provocare sintomi come capogiri, mal di testa, nausea e/o vomito, disturbi sensoriali, tremore, ansia, disturbi del battito cardiaco (palpitazioni), sudorazione, nervosismo, confusione, irritabilità, diarrea, disturbi visivi e disturbi del sonno, il trattamento non può essere interrotto in modo brusco. Verso la fine del trattamento la dose di Escitalopram Sandoz viene ridotta in modo progressivo. Si attenga scrupolosamente alle prescrizioni del medico.

Se pensa di aver preso, o che qualcun altro abbia preso, una dose troppo alta di Escitalopram Sandoz informi subito il suo medico o si rechi immediatamente al pronto soccorso più vicino anche se non si manifestano sintomi di malessere. Sintomi da sovradosaggio possono essere capogiri, tremore, agitazione, convulsioni, coma, nausea, vomito, alterazione del ritmo cardiaco, diminuzione della pressione del sangue e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico. Prenda con sé la confezione del medicinale.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Escitalopram Sandoz?

I seguenti effetti collaterali possono manifestarsi con l'assunzione di Escitalopram Sandoz. Solitamente la maggior parte degli effetti collaterali diminuiscono o scompaiono dopo alcune settimane di trattamento.

Prenda immediatamente contatto con il suo medico o vada immediatamente in ospedale, se si verificano i seguenti effetti collaterali:

- Non comunemente possono manifestarsi sanguinamenti anomali, inclusa emorragia gastrointestinale.
- Raramente possono manifestarsi gonfiori sulla pelle, sulla lingua, sulle labbra o sul viso o se ha difficoltà respiratoria o difficoltà a deglutire (reazione allergica). Si può verificare anche un calo della pressione sanguigna.
- Febbre elevata oltre i 38°C, agitazione, tremori, contrazioni muscolari ritmiche involontarie, compresi i muscoli che controllano il movimento dell'occhio, allucinazioni, coma, sudorazione eccessiva, riflessi esagerati e aumento della tensione muscolare possono essere i sintomi di una rara affezione denominata «sindrome serotoninergica».
- Mania (umore euforico, disturbi del pensiero), pensieri di autolesionismo o di suicidio, disturbi del movimento (movimenti muscolari involontari), alterazione del ritmo cardiaco, convulsioni o colorazione gialla della pelle e del bianco degli occhi (sono segni di compromissione della funzionalità del fegato/epatite), difficoltà a urinare, dolorosa persistente erezione senza stimolazione sessuale.
- Dolore e/oppure debolezza muscolare possono essere segni di una disgregazione muscolare (rabdomiolisi). In casi gravi, può anche verificarsi una colorazione rosso-marrone delle urine.
- Grave sanguinamento vaginale subito dopo la nascita (emorragia postpartum), vedere ulteriori informazioni nella sezione «Si può assumere Escitalopram Sandoz durante la gravidanza o l'allattamento?».

Oltre agli effetti collaterali sopra menzionati, sono stati segnalati anche i seguenti:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

Malessere e nausea.

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)



Diminuzione o aumento dell'appetito, aumento di peso, ansia, irrequietezza, sogni anomali, insonnia, sonnolenza, capogiri, tremori, disturbi della sensibilità, naso chiuso o gocciolante (sinusite), sbadigli, diarrea, costipazione, vomito, bocca secca, aumento della sudorazione, dolori muscolari e delle articolazioni, disturbi sessuali (ritardata eiaculazione, problemi di erezione, diminuzione degli impulsi sessuali, difficoltà a raggiungere l'orgasmo nelle donne), stanchezza o febbre.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Perdita di peso, digrignare i denti di notte, nervosismo, agitazione, attacchi di panico, stato confusionale, sonno disturbato, alterazioni del gusto, svenimenti, dilatazione delle pupille, disturbi della vista, suoni nelle orecchie (tinnito), battito cardiaco accelerato, sangue dal naso, orticaria, eruzioni cutanee, prurito, perdita di capelli, prolungate e rafforzate mestruazioni, sanguinamento intramezzo, gonfiore di braccia o gambe.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Aggressione, disturbi della percezione di sé stesso (depersonalizzazione), allucinazioni e diminuzione della frequenza cardiaca.

Alcuni pazienti hanno segnalato (sulla base dei dati disponibili la frequenza non può essere stimata):

Capogiri assumendo una posizione eretta dovuti ad un abbassamento della pressione arteriosa, diminuzione del livello di sodio nel sangue (i sintomi sono nausea e malessere con debolezza muscolare o confusione), disturbi della funzione del fegato (aumento della quantità degli enzimi epatici nel sangue), secrezione di latte in uomini o in donne che non allattano, sanguinamenti anomali compresi quelli della pelle e delle mucose, bassi valori delle piastrine nel sangue, improvviso gonfiore della pelle o delle mucose, aumento dell'escrezione urinaria (inappropriata secrezione di ADH), aumento dei livelli ematici dell'ormone prolattina.

Escitalopram Sandoz appartiene ai cosiddetti inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SNRI), che possono portare a disfunzione sessuale.

Sono stati segnalati casi di disfunzione sessuale prolungata in cui i sintomi persistevano nonostante l'interruzione del trattamento con SSRIs/SNRIs.

Tra i farmaci con un meccanismo d'azione simile al Escitalopram Sandoz possono verificarsi irrequietezza motoria e perdita dell'appetito (anoressia).

È stato notato un aumentato rischio di fratture ossee nei pazienti in età superiore ai 50 anni che assumono questo tipo di medicinali.

Nei bambini e negli adolescenti sottoposti a terapia antidepressiva sono stati osservati una maggiore comparsa di disturbi comportamentali e un rischio aumentato di tentativi di suicidio, ideazione suicida e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Riporti al suo medico o al suo farmacista la confezione iniziata per il corretto smaltimento.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la prima apertura del flacone di Escitalopram Sandoz, usare le gocce orali da 20 mg/ml, soluzione entro 8 settimane. Conservi sempre il flacone accuratamente chiuso.

Istruzioni di conservazione

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film e Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili: Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15–25°C) et fuori dalla portata dei bambini.



Escitalopram Sandoz 20 mg/ml gocce orali, soluzione: Conservare il flacone di gocce orali nella confezione originale, diritto e accuratamente chiuso, a temperatura ambiente (15–25°C) et fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Escitalopram Sandoz?

Principi attivi

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film contengono 5 mg, 10 mg, 15 mg o 20 mg di escitalopram (principio attivo).

Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili contengono 10 mg o 20 mg di escitalopram (principio attivo).

Escitalopram Sandoz 20 mg/ml gocce orali, soluzione (1 ml = 20 gocce) contiene 20 mg di escitalopram (come escitalopram ossalato) per 1 ml soluzione.

Sostanze ausiliarie

Escitalopram Sandoz compresse rivestite con film:

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460i), croscarmellosa sodica (E468), ipromellosa (E464), magnesio stearato (E470b), silice colloidale anidra (E551), macrogol 6000, titanio diossido (E171), talco.

Escitalopram Sandoz compresse orodispersibili:

Polacrilin potassio, acido cloridrico, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460i), carmellosa sodica (E468), acesulfame potassico (E950), neoesperidina diidrocalcone, aroma di menta (contiene maltodestrina e amido ottenilsuccinato sodico (E1450)), magnesio stearato (E470b).

Escitalopram Sandoz 20 mg/ml gocce orali, soluzione (1 ml = 20 gocce):

Propile gallato, etanolo 96%, acido citrico, idrossido di sodio, acqua purificata.

Aspetto delle compresse rivestite con film:

5 mg: rotonda, bianca.

10 mg: ovale, bianca, con linea di frattura.

15 mg: ovale, bianca, con linea di frattura.

20 mg: rotonda, bianca, con linea di frattura.

Aspetto delle compresse orodispersibili:

10 mg: rotonda, biancastra.

20 mg: rotonda, biancastra.

Aspetto della soluzione in gocce:

Soluzione trasparente.

Numero dell'omologazione

62641, 65995, 65625 (Swissmedic)



Dove è ottenibile Escitalopram Sandoz? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Escitalopram Sandoz 5 mg: 14, 28 e 98 compresse rivestite con film.

Escitalopram Sandoz 10 mg: 14, 28, 50 e 98 compresse rivestite con film (divisibili).

Escitalopram Sandoz 15 mg: 14, 28 e 98 compresse rivestite con film (divisibili).

Escitalopram Sandoz 20 mg: 14, 28, 50 e 98 compresse rivestite con film (divisibili).

Escitalopram Sandoz 10 mg: 14, 30 e 60 compresse orodispersibili.

Escitalopram Sandoz 20 mg: 30 e 60 compresse orodispersibili.

Escitalopram Sandoz 20 mg/ml: 15 ml gocce orali, soluzione.

Titolare dell'omologazione

Sandoz Pharmaceuticals S.A., Risch; domicilio: Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

