

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Selobloc

Compresse filmate

Che cos'è Selobloc e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Selobloc protegge il cuore da stimolazioni eccessive. Il lavoro del muscolo cardiaco viene ridotto e la reazione cardiaca al carico fisico e psichico è attenuata. Selobloc diminuisce la pressione sanguigna elevata. L'angina pectoris (forti dolori al petto con eventuale propagazione al braccio sinistro) è dovuta a una ossigenazione insufficiente del cuore sotto sforzo. Selobloc evita gli attacchi anginosi o ne diminuisce la frequenza e il dolore. Selobloc può normalizzare il ritmo cardiaco alterato o ridurre le pulsazioni originate da malattia o dallo stress.

L'atenololo, principio attivo del Selobloc, appartiene ad una generazione di betabloccanti ad azione specifica sul cuore. Esso riduce la pressione sanguigna elevata e calma l'attività cardiaca senza effetti sulla muscolatura delle vie respiratorie. Pertanto, con la dovuta prudenza, anche i pazienti con malattie respiratorie (respirazione difficile, asma) possono assumere Selobloc.

Il medico prescrive Selobloc:

- per ridurre la pressione sanguigna elevata (ipertensione);
- per proteggere il muscolo cardiaco da sforzi eccessivi (angina pectoris);
- per curare i disturbi del ritmo cardiaco;
- dopo infarto cardiaco;
- per prevenire un infarto cardiaco ulteriore.

Quando non si può assumere Selobloc?

In caso di una delle malattie seguenti rinunci a prendere Selobloc: se ha già avuto in precedenza una reazione allergica al Selobloc od al principio attivo atenololo, se soffre d'insufficienza cardiaca o blocco cardiaco (pulsazioni al disotto di 50 al minuto), nel caso Lei abbia avuto un polso molto lento o molto irregolare, una pressione arteriosa molto bassa o molto cattiva irrorazione sanguigna, se in Lei è stata constatata la presenza di un feocromocitoma o dopo un digiuno prolungato.

Selobloc non è adatto ai bambini.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione dell'Selobloc?

Il trattamento con questo medicamento richiede controlli medici regolari. A causa della variabilità individuale delle reazioni, la capacità di reazione può essere alterata al punto da compromettere la capacità di partecipare attivamente al traffico stradale, utilizzare macchine o lavorare in posizione instabile. Questo in misura maggiore all'inizio del trattamento, in caso di aumento della dose e cambio di terapia e in combinazione con alcol. Informi il medico o il farmacista se soffre di asma, disturbi respiratori, disturbi dell'irrorazione sanguigna, problemi al cuore, malattie dei reni o della tiroide. Comunichi al medico se usa altri medicinali quali, ad esempio disopiramide o amiodarone contro un polso irregolare, l'ipertensione o l'angina pectoris, l'insufficienza cardiaca o contro i dolori. Parli col medico se usa degli spray nasali decongestionanti o dei medicinali contro le infreddature.

Se assume clonidina per la terapia di ipertensione o di emicrania, non deve sospendere né la clonidina né il Selobloc senza averne prima parlato con il Suo medico.



Il suo polso si può rallentare durante il trattamento. Questa è una reazione normale al principio attivo. Avverta il medico se le pulsazioni, a riposo, scendono al di sotto di 50 al minuto.

Chieda consiglio al medico in caso di diabete, glicemia sovente troppo bassa, o se assume contemporaneamente altri farmaci (e in particolare farmaci per il cuore). Prima d'intervento chirurgico si devono elencare al medico anestesista i farmaci assunti.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può somministrare Selobloc durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento è opportuno evitare ogni farmaco e questa norma prudenziale vale anche per Selobloc. In casi particolari il medico deciderà se e quando Selobloc va assunto durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Selobloc?

Come ogni farmaco, Selobloc si assume attenendosi strettamente alla prescrizione medica. Generalmente la dose per l'adulto è di 1 compressa filmata al giorno di Selobloc 50 mg o 1 compressa filmata al giorno di Selobloc 100 mg. Il medico adatterà la dose ai pazienti con malattia renale e turbe dell'eliminazione. Ingerire la compressa filmata con un poco di liquido, senza masticarla, di preferenza sempre alla stessa ora, durante o dopo i pasti. Se una volta ha dimenticato di assumere una compressa filmata, la prenda appena se ne ricorda. Tuttavia, non si devono prendere due compresse filmate contemporaneamente. La pressione sanguigna troppo alta può avere conseguenze gravi. Evitare in ogni caso di interrompere la cura bruscamente e farlo gradualmente. Per rafforzare l'effetto di Selobloc il medico può aggiungere un altro farmaco. Per evitare di interrompere la cura ci si accerti di avere sempre una scorta adeguata di Selobloc.

L'uso e la sicurezza di Selobloc nei bambini e negli adolescenti non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Selobloc?

Con l'assunzione o l'applicazione di Selobloc possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Spesso sono stati riferiti stanchezza, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di freddo nelle dita delle mani e dei piedi, nausea, vomito e diarrea.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Occasionalmente possono manifestarsi dei disturbi del sonno.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Rari sono piccole emorragie nella pelle o nelle mucose (porpora), confusione, vertigini, mal di testa, cambiamenti d'umore, incubi, psicosi, allucinazioni, formicolio alle mani, disturbi della vista, «occhi secchi», aggravamento di disturbi dell'irrorazione sanguigna, blocco cardiaco (ne sono sintomi battito cardiaco irregolare, stanchezza e vertigini alzandosi troppo rapidamente), peggioramento di un'insufficienza cardiaca, pressione sanguigna bassa (ipotensione, che può essere associata a perdita di coscienza), peggioramento dei disturbi respiratori negli asmatici, secchezza della bocca, aggravamento di una psoriasi, eruzioni sulla pelle, caduta dei capelli, impotenza e curvatura del pene. Avverta immediatamente il medico se le pulsazioni, a riposo, scendono al di sotto di 50 al minuto o se la pressione sanguigna è troppo bassa.

Come tutti i farmaci regolatori della frequenza cardiaca, anche Selobloc può determinare alterazioni del ritmo cardiaco.



Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Depressione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Questo medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul recipiente.

Osservazioni riguardanti la conservazione

Le compresse filmate devono essere conservate nel loro imballaggio originale a temperatura ambiente (15-25 °C), al riparo da luce e da umidità, e fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il medico o il farmacista, che dispongono di informazioni dettagliate destinate ai professionisti.

Che cosa contiene Selobloc ?

Principi attivi

Selobloc 100 mg: compresse filmate da 100 mg di atenololo.

Selobloc 50 mg: compresse filmate da 50 mg di atenololo.

Sostanze ausiliarie

Nucleo della compressa: amido di mais, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, stearato di magnesio, talco.

Rivestimento della compressa: macrogol 6000, talco, ipromellosa, biossido di titanio, ossido di ferro giallo, dimeticone, silice colloidale, metilcellulosa, acido sorbico, copolimero di acrilato di etile e metacrilato di metile 2:1.

Numero dell'omologazione

50651 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Selobloc? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 100 *compresse filmate*.

Titolare dell'omologazione

Lagap SA, Vezia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2023 dall' autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

