

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol peuvent être utilisées en cas de dystonie neurovégétative avec faiblesse circulatoire et une tendance à l'hypotension.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol ne doivent pas être utilisées sans avis médical en cas de maladies graves du cœur et des vaisseaux sanguins.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10-15-20 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas. En cas de troubles circulatoires aigus, prendre 10 à 15 gouttes toutes les 1 à 2 heures. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples



renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 37 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol?

10 ml contiennent: Crataegus D1 1 ml, Cytisus scoparius D2 1 ml, Nerium oleander D3 1 ml, Prunus laurocerasus D3 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 37 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45072

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 07/2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

