Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol

Che cosa sono le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol e quando si usano ?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol trovano principalmente impiego in caso di distonia neurovegetativa con debolezza cardiovascolare e tendenza all’ipotensione arteriosa.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

In caso di malattie gravi del cuore e dei vasi non somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol senza prescrizione medica.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

– soffre di altre malattie,

– soffre di allergie,

– assume altri medicamenti o fa uso di medicamenti per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol durante la gravidanza o l’allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicamenti durante la gravidanza e l'allattamento o chidere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15-20 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì prima dei pasti. In caso di disturbi circolatori acuti 10-15 gocce ogni 1-2 ore. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all’uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Nel corso dell’assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 37 % Vol.

Cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol?

10 ml contengono: Crataegus D1 1 ml, Cytisus scoparius D2 1 ml, Nerium oleander D3 1 ml, Prunus laurocerasus D3 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 37 % Vol.

Numero dell'omologazione

45072

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R44 Hypotonol? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica. Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4
CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel 07/2004 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).