

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien (ou de votre droguiste). Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Dynexan® gel oral

Kreussler AG

Qu'est-ce que Dynexan gel oral et quand est-il utilisé?

Dynexan gel oral est une préparation analgésique à effet prolongé destiné au traitement des douleurs de la muqueuse buccale et des gencives.

Dynexan gel oral ne peut être également utilisé par des personnes devant suivre un régime sans sucre.

Quand Dynexan gel oral ne doit-il pas être utilisé?

Ne pas utiliser Dynexan gel oral lors d'hypersensibilité connue à la lidocaïne ou à l'un des excipients contenus dans Dynexan gel oral.

Pas pour les adolescents ou les enfants de moins de 12 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Dynexan gel oral?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Ce médicament contient 1 mg de chlorure de benzalkonium par g de gel buccal. Le chlorure de benzalkonium peut provoquer des irritations locales dans la cavité buccale.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Dynexan gel oral peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, de même que durant l'allaitement, l'utilisation de Dynexan gel oral ne devra se faire qu'avec l'accord du médecin.

Comment utiliser Dynexan gel oral?

Sauf prescription contraire du médecin, étaler jusqu'à 4 fois par jour une petite quantité de Dynexan gel oral de la grosseur d'un pois sur les endroits douloureux et si possible, masser légèrement.

Pour faciliter l'adaptation à une nouvelle prothèse dentaire, appliquer Dynexan gel oral sur les gencives, le palais et la prothèse.

Le gel adhère mieux lorsque la muqueuse est asséchée avant l'application.

.

L'utilisation et la sécurité de Dynexan gel oral n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents de moins de 12 ans.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Dynexan gel oral peut-il provoquer?

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)



Des réactions locales d'origine allergique ou non (par ex. formation de pustules, eczéma de contact, sensation de brûlure ou d'engourdissement).

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Des réactions allergiques généralisées aiguës se sont manifestées (par ex. troubles respiratoires, gonflement des muqueuses, troubles circulatoires ou baisse de la tension artérielle).

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «Utilisable jusqu'à» sur le récipient

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C). Bien refermer le tube après usage.

Conserver Dynexan gel oral hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Dynexan gel oral?

1 g de Dynexan gel buccal contient:

Principes actifs

Chlorhydrate de lidocaïne monohydrate 20 mg

Excipients

Chlorure de benzalkonium, glycérol, paraffine liquide, vaseline blanche, silice colloïdale anhydre, saccharine sodique, galactomannane du guar, thymol, huile essentielle de mentha arvensis partiellement démentholée, huile essentielle de menthe poivrée, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

56125 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Dynexan gel oral? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Dynexan gel oral est disponible en tubes de 10 g en pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Répartiteur

Profimed AG, 8802 Kilchberg

Titulaire de l'autorisation

Kreussler AG, 6300 Zug.

Fabricant

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

