

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista (o del suo droghiere). Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dynexan® gel orale

Kreussler AG

Che cos'è Dynexan gel orale e quando si usa?

Dynexan gel orale è un preparato analgesico ad effetto di lunga durata nel trattamento di dolori alla mucosa orale e alle gengive.

Dynexan gel orale può essere usato da persone che devono osservare una dieta povera di zucchero.

Quando non si può usare Dynexan gel orale?

In caso di ipersensibilità nota alla lidocaina o ad una delle componenti di Dynexan gel orale.

Non per adolescenti o bambini sotto i 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dynexan gel orale?

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni. Questo medicinale contiene 1 mg di benzalconio cloruro per g di gel orale. Il benzalconio cloruro può causare irritazione locale nella cavità orale.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Dynexan gel orale durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o se intende diventarlo ed anche durante l'allattamento dovrebbe usare Dynexan gel orale esclusivamente su consiglio medico.

Come usare Dynexan gel orale?

Salvo diversa prescrizione medica applicare un pezzettino di mezzo centimetro di Dynexan gel orale fino a quattro volte al giorno sulla parte dolente e massaggiare ove possibile.

Per abituarsi alle protesi dentarie spalmare uno strato fine di Dynexan gel orale su gengive, palato e protesi. Il gel aderisce meglio se la mucosa è stata asciugata precedentemente.

L'uso e la sicurezza di Dynexan gel orale nei bambini e negli adolescenti sotto i 12 anni finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dynexan gel orale?

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Reazioni locali allergiche e nonallergiche (p.e. la formazione di pustole, eczema da contatto, bruciore o sensazioni di intorpidimento).

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)



Reazioni generali allergiche (p.e. disturbi respiratori, gonfiori delle mucosi, disturbi circolatori o calo della pressione sanguinea) in seguito al trattamento con Dynexan gel orale.

Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verw. bis/utilisable jusqu'à» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura d'ambiente (15-25 °C). Chiudere bene il tubetto dopo l'uso.

Dynexan gel orale va conservato fuori della portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Dynexan gel orale?

1 g Dynexan gel per mucosa orale contiene:

Principi attivi

20 mg di Lidocaina cloridrato monoidrato

Sostanze ausiliarie

Benzalconio cloruro, glicerolo, , paraffina liquida, vaselina bianca morbida, silice colloidale anidra, sodio saccarinato, gomma di Guar, timolo, olio di menta parzialmente dementolato, olio di menta piperita, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

56125 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Dynexan gel orale? Quali confezioni sono disponibili?

Dynexan gel orale è disponibile in tubetti da 10 g in farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Ripartitore

Profimed AG, 8802 Kilchberg.

Titolare dell'omologazione

Kreussler AG, 6300 Zug.

Fabbricante

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, D-65203 Wiesbaden.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

