

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Zovirax Crème

GlaxoSmithKline AG

Qu'est-ce que Zovirax Crème et quand doit-il être utilisé?

Zovirax est un médicament utilisé contre les virus (= virostatique), notamment le virus de l'herpès. Le principe actif de Zovirax inhibe la multiplication des virus herpétiques sans compromettre les processus métaboliques normaux. Les virus herpétiques provoquent la formation de vésicules sur la peau et les muqueuses.

Zovirax Crème s'utilise par voie externe dans les affections circonscrites de la peau de nature légère, dont les boutons de fièvre.

Zovirax ne doit être utilisé que selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin pour traiter votre affection *actuelle*.

Le virostatique contenu dans Zovirax n'agit pas sur l'ensemble des micro-organismes responsables de maladies infectieuses. L'emploi d'un virostatique inadéquat ou mal dosé risque d'entraîner des complications. Ne l'utilisez donc jamais de votre propre initiative pour traiter d'autres affections ou d'autres personnes.

Quand Zovirax Crème ne doit-il pas être utilisé?

Ne pas utiliser Zovirax Crème en cas d'hypersensibilité connue ou présumée aux principes actifs aciclovir et valaciclovir ou à l'un des excipients contenus dans Zovirax Crème (le propylène glycol, par exemple).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Zovirax Crème?

En cas d'herpès génital, éviter tout contact sexuel, en raison du risque de contamination du partenaire.

Zovirax Crème contient du propylène glycol, qui peut causer une irritation cutanée.

Ne pas utiliser ce médicament chez les bébés de moins de 4 semaines présentant des plaies ouvertes ou de grandes zones de peau lésée ou endommagée (brûlures) sans en informer au préalable votre médecin ou votre pharmacien.

Zovirax Crème contient de l'alcool cétostéarylique, qui peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament contient 7,5 mg de laurylsulfate de sodium par g de crème. Le laurylsulfate de sodium peut provoquer des réactions cutanées locales (comme une sensation de piquûre ou de brûlure) ou augmenter les réactions cutanées causées par d'autres produits lorsqu'ils sont appliqués sur la même zone.

Avertissez votre médecin si vous prenez du probénécide, médicament utilisé dans le traitement de la goutte.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)



Zovirax Crème peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

L'application de Zovirax Crème pendant la période d'allaitement n'exige aucune interruption de l'allaitement.

Comment utiliser Zovirax Crème?

Sauf prescription contraire de votre médecin, les posologies usuelles sont les suivantes:

Appliquer la crème 5 fois par jour, toutes les 4 heures, sur 5 jours, voire évent. 10 jours.

Une fois commencé, le traitement par des virostatiques doit être maintenu pendant toute la durée prescrite par le médecin. Les symptômes d'une maladie disparaissent souvent avant la guérison définitive de l'infection. C'est pourquoi, il faut poursuivre le traitement quelques jours après la disparition des symptômes de la maladie. Une durée d'utilisation trop courte ou un arrêt prématuré du traitement peuvent entraîner une récurrence de l'affection.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Zovirax Crème peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants risquent d'apparaître lors de l'application de Zovirax Crème:

Une sensation transitoire de brûlure et de picotement peut apparaître occasionnellement après l'application de la crème. Des démangeaisons, un léger dessèchement de la peau et une desquamation au site d'application sont également possibles. Dans des cas rares, une rougeur cutanée, une dermatite de contact ou une réaction allergique soudaine, très rarement associée à un gonflement au niveau du visage – les paupières, la langue et le larynx inclus – risque d'apparaître.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Zovirax doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé et à une température ne dépassant pas 25°C et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Une légère sensation de brûlure ou une faible rougeur peuvent apparaître immédiatement après l'application de la crème, mais sans nécessiter l'interruption du traitement. La crème ne doit pas être employée pour le traitement des yeux.

A l'arrêt du traitement, restituer le médicament inutilisé à votre point de vente (à un médecin ou un pharmacien), en vue de son élimination adéquate.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée, destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Zovirax Crème?

Principes actifs

Aciclovir 50 mg/g.

Excipients



Propylène glycol, vaseline blanche, alcool cétostéarylique, paraffine liquide, stéarate de glycéryle/stéarate de PEG-100, poloxamère 407, diméticone 20, laurylsulfate de sodium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

45'705 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Zovirax Crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Crème: tube de 5 g et 10 g

Titulaire de l'autorisation

GlaxoSmithKline AG, 6340 Baar

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

