

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Zovirax Crema

GlaxoSmithKline AG

Che cos'è Zovirax Crema e quando si usa?

Zovirax è un medicamento utilizzato contro i virus (= virostatico), in particolare quella del virus dell'herpes. Il principio attivo di Zovirax impedisce la moltiplicazione dei virus erpetici senza interferire nei normali processi metabolici. I virus erpetici provocano la formazione di vescichette sulla pelle e sulle mucose.

Zovirax Crema si usa esternamente per curare lievi lesioni cutanee circoscritte, p. es. eruzioni vescicolari da virus erpetici (erpete febbrile).

Zovirax va usato solo su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal medico per curare la sua *attuale* infezione.

La sostanza virostatica contenuta in Zovirax non agisce contro tutti i microorganismi che provocano malattie infettive. L'uso di un virostatico scelto male o dosato in maniera errata può causare complicazioni. Quindi non lo usi mai di propria iniziativa per curare altre malattie o altre persone.

Quando non si può usare Zovirax Crema?

Zovirax Crema non si può usare in caso di ipersensibilità nota o supposta ai principi attivi aciclovir e valaciclovir o ad un'altra sostanza ausiliaria di Zovirax Crema (p. es. glicole propilenico).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Zovirax Crema?

In caso d'infezioni da virus erpetici nella regione genitale, è opportuno astenersi da ogni contatto sessuale per evitare di contagiare il partner.

Zovirax Crema contiene glicole propilenico che può causare irritazioni della pelle.

Non usi questo medicamento in neonati sotto le 4 settimane di vita con ferite aperte oppure lesioni o danni cutanei estesi (come ustioni) senza aver prima consultato il suo medico o farmacista.

Zovirax Crema contiene alcool cetostearilico, che può causare irritazioni della pelle localizzate (p. es. dermatite da contatto).

Questo medicamento contiene 7,5 mg di sodio laurilsolfato per g di crema. Il sodio laurilsolfato può provocare reazioni cutanee locali (come una sensazione di punture di spilli o di bruciore) o intensificare reazioni cutanee causate da altri prodotti applicati sulla stessa parte.

Qualora si assuma probenecide, un medicinale per il trattamento della gotta, è opportuno segnalarlo al medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffra d'altre malattie,
- soffra di allergie
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Zovirax Crema durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali



durante la gravidanza o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Se la paziente usa Zovirax Crema durante il periodo dell'allattamento non deve smettere di allattare.

Come usare Zovirax Crema?

Salvo diversa prescrizione del suo medico, valgono i seguenti criteri posologici:

Applicare la crema 5 x al giorno, ogni 4 ore circa, per un periodo di 5 ev. 10 giorni.

Una volta iniziata una terapia con virostatici, è opportuno seguirla per il periodo prescritto dal medico. Dato che i sintomi morbosi spesso scompaiono prima che l'infezione sia guarita completamente, si dovrebbe continuare il trattamento ancora per qualche giorno dopo la scomparsa dei segni della malattia. Una durata d'uso insufficiente o un'interruzione prematura del trattamento possono causare una recidiva.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Zovirax Crema?

Con l'applicazione di Zovirax Crema possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Dopo l'applicazione della crema possono manifestarsi occasionalmente bruciore e fitte transitorie. È inoltre possibile la comparsa di prurito e lieve secchezza e desquamazione della pelle nel punto di applicazione. Raramente può insorgere eritema cutaneo, dermatite da contatto o una reazione allergica improvvisa, che in casi rarissimi è accompagnata da gonfiore nell'area del viso, incluse palpebre, lingua e laringe.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Zovirax deve essere conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura non superiore ai 25°C e fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Subito dopo l'applicazione della crema possono verificarsi un lieve bruciore o arrossamento, senza però che occorra interrompere il trattamento. La crema non dev'essere usata per il trattamento degli occhi.

Una volta terminato il trattamento, il medicamento con il contenuto residuo dovrà essere riportato all'ente presso di cui lo si è ritirato (medico o farmacista), affinché sia eliminato in modo corretto.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Zovirax Crema?

Principi attivi

Aciclovir 50 mg/g.

Sostanze ausiliarie

Glicole propilenico, vaselina bianca, alcool cetostearilico, paraffina liquida, gliceril stearato/PEG-100 stearato, polossamero 407, dimeticone 20, sodio laurilsolfato, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

45'705 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Zovirax Crema? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.



Crema: Tubetti da 5 g e 10 g

Titolare dell'omologazione

GlaxoSmithKline AG, 6340 Baar

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

