

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Mediaven®, Mediaven® forte

Qu'est-ce que Mediaven, Mediaven forte et quand doit-il être utilisé ?

Mediaven, Mediaven forte augmente le tonus veineux, ce qui améliore le retour du sang veineux vers le cœur et en même temps diminue l'activité de certaines substances de l'organisme qui jouent un rôle dans le développement de varices.

Mediaven, Mediaven forte est indiqué dans toutes les formes d'insuffisance veineuse des membres inférieurs:

- Jambes lourdes et fatiguées, œdème des chevilles, crampes nocturnes des mollets.
- Varices douloureuses.
- Troubles de l'irrigation sanguine veineuse secondaires à une thrombose, troubles subjectifs au niveau des jambes causés par des contraceptifs hormonaux (pilule).

Mediaven, Mediaven forte ne peut être pris que sur prescription du médecin

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a conseillé de faire des exercices physiques, de porter des bas de compression ou de bander les jambes, Mediaven, Mediaven forte peut soutenir ces mesures mais non les remplacer.

Quand Mediaven, Mediaven forte ne doit-il pas être pris ?

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients conformément à la composition.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Mediaven, Mediaven forte ?

Si vous souffrez d'une maladie grave du rein ou du foie, c'est à votre médecin de décider si vous pouvez prendre Mediaven, Mediaven forte.

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines! (Voir des effets secondaires.)

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez

- d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé pelliculé, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Mediaven, Mediaven forte peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?



Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant, vous devriez renoncer à des médicaments par principe de prudence. Mediaven, Mediaven forte ne doit pas être utilisé durant les trois premiers mois de la grossesse et la période d'allaitement. C'est à votre médecin de décider si vous pouvez prendre Mediaven, Mediaven forte à partir du 4ème mois de votre grossesse.

Comment utiliser Mediaven, Mediaven forte ?

Adultes: En général, prendre 1 comprimé pelliculé de Mediaven (10 mg) 3 fois par jour ou 1 comprimé pelliculé de Mediaven forte (30 mg) 1 fois par jour durant un mois ou plus longtemps.

Enfants: L'emploi et la sécurité d'emploi de Mediaven, Mediaven forte chez l'enfant et l'adolescent n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet d'études systématiques.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Mediaven, Mediaven forte peut-il provoquer ?

La prise de Mediaven, Mediaven forte peut provoquer les effets secondaires suivants:

Rares (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Troubles gastro-intestinaux bénins (sensation de poids sur l'estomac), maux de tête, vertige, réactions allergiques cutanées.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver hors de la portée des enfants, à température ambiante (15°C-25°C) et dans l'emballage d'origine.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Mediaven, Mediaven forte ?

1 comprimé pelliculé de Mediaven contient:

Principes actifs

10 mg de naftazone.

Excipients



Hydrogénophosphate de calcium, cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, talc, carboxyméthylamidon sodique (type A), stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, hypromellose (E464), macrogol 6000.

Les comprimés pelliculés de 10 mg portent l'empreinte «D10».

1 comprimé pelliculé de Mediaven forte contient:

Principes actifs

30 mg de naftazone.

Excipients

Hydrogénophosphate de calcium, cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, talc, carboxyméthylamidon sodique (type A), stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, hypromellose (E464), macrogol 6000.

Numéro d'autorisation

37979 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Mediaven, Mediaven forte ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Mediaven (10 mg): emballages de 30, 60 et 100 comprimés pelliculés.

Mediaven forte (30 mg): emballages de 30 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'autorisation

Drossapharm AG, Bâle.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

