

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento è stato prescritto al bambino dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

OMIDA® Globuli raffreddore per bambini, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa OMIDA Globuli raffreddore per bambini?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici OMIDA Globuli raffreddore per bambini può essere usato in caso di:

- raffreddori di vario genere,
- catarro,
- febbre.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere OMIDA Globuli raffreddore per bambini.

Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il medicamento dev'essere somministrato solo dopo aver consultato il medico. In caso di febbre alta o di peggioramento dello stato, consultare un medico entro 3 giorni.

Quando non si può assumere OMIDA Globuli raffreddore per bambini e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

OMIDA Globuli raffreddore per bambini non può essere usato in caso di ipersensibilità (allergia) al chinino (Cinchona pubescens).

Informi il suo medico, il farmacista o il droghiere, se il suo bambino:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere OMIDA Globuli raffreddore per bambini durante la gravidanza o l'allattamento?

L'uso durante la gravidanza e l'allattamento non è previsto e quindi non è raccomandato.

Come usare OMIDA Globuli raffreddore per bambini?

Salvo diversa prescrizione medica, i bambini da 2 a 5 anni ricevono 3-5 globuli 3-4 volte al giorno e i bambini e gli adolescenti da 6 a 16 anni 5-10 globuli 3-4 volte al giorno. All'inizio della malattia, ogni ora, massimo 12 volte al giorno. Mettere i globuli direttamente sotto la lingua. Si consiglia di lasciar sciogliere lentamente i globuli in bocca. Il momento migliore per la somministrazione è almeno 10 minuti prima dei pasti.



Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, il medicamento dev'essere somministrato solo dopo aver consultato il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere OMIDA Globuli raffreddore per bambini?

In seguito all'assunzione di OMIDA Globuli raffreddore per bambini possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: reazioni di ipersensibilità (allergia) al componente Cinchona pubescens e al componente Eupatorium perfoliatum e ad altre piante composite.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con OMIDA Globuli raffreddore per bambini e informi il suo medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene OMIDA Globuli raffreddore per bambini?

1 g globuli contiene:

Principi attivi

Allium cepa (HAB) D3 2 mg, Cinchona pubescens (HAB) D3 1 mg, Eupatorium perfoliatum (HAB) D3 3 mg, Ferrum phosphoricum (HAB) D12 2 mg, Sepia officinalis purificata (Sepia officinalis HAB) D6 (SV) 2 mg.

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967), ipromellosa.

1 g corrisponde a 110-130 globuli.

Numero dell'omologazione

50457 (Swissmedic)

Dove è ottenibile OMIDA Globuli raffreddore per bambini? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione da 10 g di globuli.



Titolare dell'omologazione

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

