

Informazioni per i pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan

Medicinale omeopatico

Che cos'è le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan e quando si usa?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan trovano principalmente impiego su prescrizione del suo medico in caso di iperfunzione della tiroide.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Disturbi della tiroide devono essere valutati da un medico. Quindi il medicamento non è da usarsi senza accertamento e monitoraggio medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

A tutt'oggi l'uso e la sicurezza delle gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan, non sono stati testati nei bambini e negli adolescenti.

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan?

Adulti:

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 4 volte al dì prima dei pasti per ca. 1 settimana, poi passare a 3 dosi per un'altra settimana. Dalla terza settimana, sono sufficienti 1 o 2 dosi al giorno per un periodo prolungato. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

A tutt'oggi l'uso e la sicurezza delle gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan, non sono stati testati nei bambini e negli adolescenti.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce

Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan e informi il medico o il farmacista.



Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista. Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan?

10 ml contengono: Belladonna D30 1 ml, Iodum D30 1 ml, Lapis albus D12 1 ml, Lycopus virginicus D12 1 ml, Natrium chloratum D30 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 % Vol.

Numero dell'omologazione

45079

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R51 Thyreosan? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4
CH-1680 Romont

Fabbricante

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32
D-64625 Bensheim

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

