

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Urispas

Che cos'è Urispas e quando si usa?

Urispas viene utilizzato per il trattamento delle irritazioni della vescica (con sintomi quali incontinenza, minzione difficile, frequente o dolorosa) da differenti cause.
Su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Il suo medico le ha prescritto questo medicamento per la cura della sua attuale malattia. Non usi quindi mai Urispas di sua iniziativa per curare altre malattie o altre persone.

Urispas non sostituisce le misure specifiche usate per curare le cause dei problemi di minzione

Quando non si può assumere/usare Urispas?

Urispas non deve essere assunto in caso di ipersensibilità al principio attivo o a una qualsiasi delle sostanze ausiliarie di Urispas, in presenza di ostruzioni, nonché in caso di infiammazioni o sanguinamenti gastrointestinali.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Urispas?

Si richiede cautela se si sospetta la presenza di glaucoma.

Non sono disponibili esperienze sufficienti per garantire un utilizzo privo di rischi di Urispas nei bambini di età inferiore a 12°anni.

Se assume Urispas assieme ad altri medicinali, possono comparire delle interazioni.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa rivestita con film, cioè essenzialmente «senza sodio».

Poiché Urispas può causare stanchezza, vertigini e disturbi visivi, si richiede la massima cautela quando si usano macchine e quando si è alla guida nel traffico stradale. Urispas può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Urispas durante la gravidanza o l'allattamento?



Urispas può essere assunto durante la gravidanza o l'allattamento solo se espressamente prescritto dal medico.

Come usare Urispas?

Salvo diversa prescrizione del medico, per gli adulti e gli adolescenti di età superiore ai 12°anni è valida la seguente posologia: 1°compressa rivestita con film 3°volte al giorno.

Tuttavia, in caso di disturbi particolarmente fastidiosi durante la notte, è indicata l'assunzione di una quarta compressa rivestita con film prima di coricarsi.

Se i sintomi migliorano, la dose può essere ridotta.

L'esperienza sull'uso di Urispas nei bambini e negli adolescenti sotto i 12°anni di età non è sufficiente.

Pertanto la somministrazione nei bambini non può essere raccomandata.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Urispas?

Con l'assunzione di Urispas si possono manifestare i seguenti effetti collaterali:

Urispas può causare stipsi, diarrea, nausea, vomito, secchezza delle fauci, cefalee, orticaria, vertigini, palpitazioni cardiache, disturbi visivi e stanchezza. Possono comparire anche reazioni allergiche come eruzioni cutanee e prurito.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

L'assunzione di Urispas non ha effetti sul colore delle urine e delle feci.

Il medico, il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Urispas?

1 compressa rivestita con film di Urispas contiene:

Principi attivi

200 mg di flavossato cloridrato

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina E460, povidone K30, carbossimetilamido sodico (tipo A), talco, magnesio stearato E572.



I nuclei delle compresse rivestite con film sono rivestiti con un film di ipromellosa E464, cellulosa microcristallina E460, macrogol stearato, titanio diossido E171, macrogol 6000 e magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

58644 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Urispas? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 100 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Recordati AG, 4057 Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

