

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

VICKS AngiMed Citron Spray

Che cos'è VICKS AngiMed Citron Spray e quando si usa?

VICKS AngiMed Citron Spray contiene i principi attivi lidocaina e clorexidina digluconato.

VICKS AngiMed Citron Spray può essere utilizzato per la disinfezione locale e per combattere i sintomi in caso di infiammazioni della gola e della faringe accompagnate da dolore.

Quando non si può usare VICKS AngiMed Citron Spray?

VICKS AngiMed Citron Spray non dovrebbe essere utilizzato in caso di ipersensibilità nota a uno qualsiasi dei componenti.

I pazienti con ipersensibilità agli anestetici locali non dovrebbero utilizzare VICKS AngiMed Citron Spray.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di VICKS AngiMed Citron Spray?

VICKS AngiMed Citron Spray contiene clorexidina. La clorexidina può causare reazioni di ipersensibilità acute (reazioni anafilattiche) della cute e delle mucose, che si manifestano con arrossamento cutaneo, orticaria, prurito, gonfiori della cute o delle mucose e, in casi più gravi, con nausea, coliche, asma, gonfiore delle vie respiratorie superiori, caduta della pressione arteriosa o shock circolatorio. Se si manifestano segni di questo tipo, deve interrompere l'utilizzo di VICKS AngiMed Citron Spray e rivolgersi al medico. Nei pazienti sensibilizzati, la clorexidina può causare anafilassi, soprattutto nell'ambito di interventi chirurgici. Dal punto di vista allergologico la clorexidina è quindi considerata problematica. Se durante l'utilizzo di VICKS AngiMed Citron Spray si manifestano sintomi che fanno sospettare un'allergia, i prodotti contenenti clorexidina (anche i cosmetici) dovrebbero essere evitati. L'ipersensibilità può essere diagnosticata mediante esame allergologico.

Lo spray non dovrebbe essere utilizzato in presenza di ferite sanguinanti nella cavità orofaringea.

In caso di febbre elevata o se dopo una settimana non si osserva alcun miglioramento, dovrebbe essere consultato un medico.

Il medicamento non deve essere deglutito. Dopo utilizzo in bocca, i residui di liquido dovrebbero essere sputati.

Va evitato qualsiasi contatto con gli occhi.

Questo medicamento contiene 18 mg di glicole propilenico per erogazione, equivalente a 200 mg/ml.

Questo medicamento contiene piccole quantità di etanolo (alcol), inferiori a 100 mg per erogazione.

Questo medicamento contiene un aroma a sua volta contenente allergeni (citrale, citronellolo, geraniolo e linalolo). Gli allergeni possono causare reazioni allergiche.

L'aroma contiene anche butilidrossianisolo e butilidrossitoluene, che possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente



Si può usare VICKS AngiMed Citron Spray durante la gravidanza o l'allattamento?

VICKS AngiMed Citron Spray non deve essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento, salvo che l'impiego non avvenga su prescrizione medica.

Come usare VICKS AngiMed Citron Spray?


Adulti e adolescenti da 12 anni di età:

da 3 a 5 erogazioni per applicazione, 6-10 applicazioni al giorno.

A causa dell'effetto analgesico del medicamento viene sconsigliato l'utilizzo immediatamente prima dei pasti.

L'uso e la sicurezza nei bambini finora non sono stati esaminati.

Modo di somministrazione



Passo 1 Passo 2

Passo 1. Prima dell'uso, ruotare il nebulizzatore in modo da formare un angolo retto con il flacone.

Passo 2. Aprire bene la bocca, introdurre il nebulizzatore in direzione della gola e premere sull'erogatore. Trattenere il respiro durante l'erogazione.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere VICKS AngiMed Citron Spray?

Si possono manifestare reazioni di ipersensibilità acute, soprattutto a carico della cute e delle mucose (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso di VICKS AngiMed Citron Spray?»).

Non comunemente sono state osservate irritazioni locali. Si possono manifestare disturbi del gusto e una sensazione di bruciore in bocca.

In caso di utilizzo regolare si può verificare un'alterazione di colore giallastra o brunastra dei denti, che può essere rimossa mediante pulizia intensiva dei denti.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?



Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene VICKS AngiMed Citron Spray?

1 erogazione VICKS AngiMed Citron Spray, spray per mucosa orale, soluzione contiene:

Clorexidina digluconato sotto forma di soluzione di clorexidina digluconato 180 µg; lidocaina cloridrato monoidrato 45 µg.

Acido citrico monoidrato, sucralosio, aroma di limone (contiene citrale, citronellolo, geraniolo, linalolo, butilidrossianisolo (E320), butilidrossitoluene (E321)), glicole propilenico (E1520), glicerolo, etanolo 96%, acqua depurata.

Contiene 18 mg di glicole propilenico (E1520) e 21.60 mg (pari al 29,7% V/V) di etanolo per erogazione.

Numero dell'omologazione

62906 (Swissmedic).

Dove è ottenibile VICKS AngiMed Citron Spray? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Spray per mucosa orale, soluzione, flacone spray con 30 ml di soluzione.

Titolare dell'omologazione

Procter & Gamble International Operations SA.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel ottobre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

