

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, farmacista o droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

LuVit D3[®] per la profilassi, soluzione orale

Che cos'è LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale e quando si usa?

LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale è una soluzione orale oleosa contenente colecalciferolo (vitamina D₃).

Generalmente, la vitamina D₃ può essere prodotta autonomamente dall'uomo grazie all'effetto della luce solare sulla pelle.

La vitamina D₃ è necessaria per l'assorbimento di calcio dall'alimentazione e indispensabile per una normale formazione delle ossa e dei denti.

In caso di luce solare insufficiente o di apporto insufficiente di alimenti ricchi di vitamina D₃, così come in caso di un fabbisogno maggiore di vitamina D₃ durante la crescita, la gravidanza e l'allattamento, occorre offrire al corpo questa quantità aggiuntiva di vitamina.

LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale viene impiegato in presenza delle seguenti malattie:

- prevenzione dell'indebolimento delle ossa nel bambino (rachitismo);
- prevenzione dell'indebolimento delle ossa nell'adulto (osteomalacia);
- prevenzione di una patologia da carenza di vitamina D in persone altrimenti sane, senza disturbi di assunzione del cibo (senza disturbi di assorbimento);
- sostituzione durante la gravidanza e l'allattamento.

Quando non si può assumere LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?

LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale non deve essere assunto

- in caso di allergia alla vitamina D₃ o a uno degli eccipienti di questo medicamento (cfr. «Cosa contiene LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?»);
- in caso di un aumento della concentrazione di calcio nel sangue, disturbi dell'eliminazione attraverso i reni e tutte le malattie con aumento esistente della concentrazione di calcio nel sangue o nelle urine (ipercalcemia e/o ipercalcemia);
- in caso di elevata concentrazione di vitamina D nel sangue (ipervitaminosi D);
- in caso di tendenza alla formazione di calcoli renali contenenti calcio;
- in caso di pseudoipoparatiroidismo (disturbo genetico della concentrazione di paratormone).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?

Tutte le vitamine D possono essere nocive se assunte in dosi troppo elevate (10 000 UI al giorno per almeno 6 mesi; i lattanti e i bambini piccoli possono rispondere in modo sensibile anche a concentrazioni inferiori).



Eviti l'assunzione di dosi aumentate di vitamina D per mesi o anni, in particolare in caso di assunzione concomitante di calcio e/o alimenti o pappe arricchite di calcio.

Si raccomanda cautela

- in caso di disturbi di metabolismo del calcio e fosfato,
- in caso di funzionalità renale limitata,
- in caso di eliminazione disturbata di calcio e fosfato per via renale,
- in caso di malattie cardiache, arteriosclerosi o calcoli renali,
- in caso di una malattia infiammatoria con piccoli noduli di tessuto (sarcoidosi),
- in caso di pazienti degenti o sedati (ad es. in seguito a operazioni),
- in caso di assunzione di medicinali contenenti benzotiadiazina (diuretici o medicinali per l'aumento dell'eliminazione di acqua attraverso i reni),
- in caso di malattie della tiroide.

In questi casi informi il suo medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Ciò è importante soprattutto se assume i seguenti medicinali:

- medicinali con effetto sul cuore o sui reni, soprattutto glicosidi cardiaci (ad es. digossina) o diuretici (ad es. benzotiadiazine); in caso di impiego concomitante di vitamina D₃, questi medicinali possono provocare un notevole aumento della concentrazione di calcio nel sangue e nelle urine;
- medicinali che contengono vitamina D₃ o se assume alimenti ricchi di vitamina D, come ad esempio determinati tipi di latte arricchiti di vitamina D₃;
- i medicinali elencati di seguito, in quanto possono influenzare l'effetto o l'assorbimento di vitamina D₃:
 - i medicinali contro l'epilessia (anticonvulsivi) e i barbiturici possono indebolire l'effetto della vitamina D₃;
 - la rifampicina (medicamento contro la tubercolosi) può ridurre l'effetto della vitamina D₃;
 - glucorticoidi (ormoni steroidei, come idrocortisone o prednisolone) che possono indebolire l'effetto della vitamina D₃;
 - medicinali per la riduzione del livello di colesterolo nel sangue (ad esempio, colestiramina o colestipolo);
 - determinati medicinali per perdere peso che riducono l'assorbimento dei grassi nel corpo (per es. orlistat);
 - determinati lassativi (ad es. paraffina liquida).

Si può assumere LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in gravidanza o sta allattando, può assumere LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale solo dopo averne parlato con il medico, il farmacista o il droghiere.



Come usare LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?

Gruppo di pazienti	Somministrazione	Dosaggio
Neonati prematuri	Prevenzione dell'indebolimento delle ossa	0,1 ml-0,2 ml (= 400-800 UI) al giorno fino alla fine del 1° anno di vita.
Lattanti		0,1 ml (= 400 UI) al giorno fino alla fine del 1° anno di vita.
Bambini a partire da 1 anno compiuto		0,15 ml (= 600 UI) al giorno.
Adulti < 60 anni		0,15 ml (= 600 UI) al giorno.
Adulti ≥ 60 anni		0,2 ml (= 800 UI) al giorno.
Bambini e adolescenti da 2 a < 18 anni	Prevenzione di una patologia da carenza di vitamina D in persone altrimenti sane, senza disturbi di assunzione del cibo	0,15 ml (= 600 UI) al giorno.
Adulti < 60 anni		0,15 ml (= 600 UI) al giorno.
Adulti ≥ 60 anni		0,2 ml (= 800 UI) al giorno.
Donne in gravidanza/allattamento	Per la sostituzione	0,15 ml (= 600 UI) al giorno.


Consulti il medico se non è possibile eseguire la somministrazione giornaliera della soluzione orale.

Si attenga alla dosaggio indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, farmacista o droghiere.

Somministrazione in lattanti e bambini piccoli

La soluzione può essere somministrata in un cucchiaino insieme al latte materno, al latte o alla pappa. In caso di aggiunta, accertarsi che venga consumato tutto, altrimenti non verrà assunta tutta la quantità di principio attivo.

Somministrazione della soluzione



LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale viene assunto non diluito.





La soluzione viene dosata mediante una pipetta dosatrice, versata su un cucchiaino e assunta.



Assicurarsi assolutamente che la pipetta non entri a contatto con la bocca, la saliva o gli alimenti.

LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale viene dosato in millimetri (ml) mediante una pipetta dosatrice: 0,1 ml corrisponde a 400 UI (*unità internazionali*). Non è possibile definire una dosaggio in gocce.

pipetta dosatrice flacone da 10 ml

0,05 ml = 200 UI


0,10 ml = 400 UI

pipetta dosatrice flacone da 20 ml


0,10 ml = 400 UI

0,15 ml = 600 UI

0,20 ml = 800 UI



**pipetta
dosatrice flacone da 10 ml**



**pipetta dosatrice flacone da 20
ml**

Quali effetti collaterali può avere LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?

- *Patologie del tratto gastrointestinale*

Disturbi del tratto gastrointestinale come stitichezza, gonfiore, nausea, mal di pancia o diarrea.

- *Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Reazioni di ipersensibilità come prurito, eruzione cutanea od orticaria.



Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo l'apertura, consumare entro 6 mesi.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15 - 25 °C) e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Non utilizzare se la soluzione appare torbida.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale?

1 ml contiene 4000 unità internazionali (UI) di colecalciferolo.

Principio attivo

Colecalciferolo

Sostanze ausiliarie

Trigliceridi a media catena (olio neutro)

Numero dell'omologazione

66124 (Swissmedic)

Dove è ottenibile LuVit D3 per la profilassi, soluzione orale? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 10 ml con pipetta dosatrice, graduata a intervalli di 0,05/0,1 ml.

Confezioni da 20 ml con pipetta dosatrice, graduata a intervalli di 0,10/0,15/0,20 ml.

Titolare dell'omologazione

Drossapharm AG, 4002 Basel

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

