

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Diclo-Acino 10 mg/g, gel

Qu'est-ce que Diclo-Acino 10 mg/g, gel et quand doit-il être utilisé?

Diclo-Acino 10 mg/g, gel contient le principe actif diclofénac qui fait partie d'un groupe de médicaments appelés antirhumatismaux non stéroïdiens (analgésiques et anti-inflammatoires). Diclo-Acino 10 mg/g, gel agit contre la douleur et l'inflammation. Grâce à sa teneur en eau et en alcool, il exerce un effet apaisant et rafraîchissant.

Diclo-Acino 10 mg/g, gel est utilisé pour le traitement local de douleurs, inflammations et tuméfactions en cas de:

- blessures des tendons, ligaments, muscles et articulations, p. ex. entorses, contusions, claquages ou douleurs dorsales suite à une activité sportive ou un accident;
- formes localisées de rhumatisme extra-articulaire, comme p. ex. tendinite (coude du tennisman), syndrome épaule-main, bursite, périarthropathies;
- et pour la thérapie symptomatique de l'arthrose des petites et moyennes articulations situées près de la peau, comme p. ex. les articulations des doigts ou des genoux.

Diclo-Acino 10 mg/g est destiné à une utilisation chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.

Quand Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit-il pas être utilisé?

Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif diclofénac ou à d'autres substances qui calment les douleurs, l'inflammation et la fièvre (en particulier l'acide acétylsalicylique/aspirine et ibuprofène) ni en cas d'hypersensibilité à l'un des excipients (p. ex. disulfite de sodium E 223, alcool isopropylique; liste complète des excipients dans la rubrique «Que contient Diclo-Acino 10 mg/g, gel?»). Cette hypersensibilité se manifeste entre autres, par une respiration sifflante ou un souffle court (asthme), des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées avec formation de vésicules, de l'urticaire, un gonflement du visage et de la langue, un écoulement nasal.

Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être utilisé pendant les 3 derniers mois de la grossesse (voir aussi «Diclo-Acino 10 mg/g, gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Diclo-Acino 10 mg/g, gel?

- Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être appliqué sur une plaie ouverte (p. ex. écorchure, coupure) ni sur une peau lésée (p. ex. eczéma, éruptions cutanées).
- Arrêter immédiatement le traitement si une éruption cutanée apparaît après utilisation de la préparation.
- Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être appliqué de façon prolongée sur de grandes surfaces, sauf si une telle utilisation est prescrite par le médecin.



Eviter tout contact de la préparation avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez les yeux abondamment avec de l'eau courante. Informez votre médecin en cas de troubles persistants. Ne pas avaler le produit. Se laver les mains après l'utilisation, sauf pour le traitement de l'articulation des doigts (voir aussi «Comment utiliser Diclo-Acino 10 mg/g, gel?»).

- Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être utilisé avec un pansement hermétique (pansement occlusif).

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous avez présenté des réactions allergiques après l'utilisation de produits similaires («pommades antirhumatismales») par le passé, si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Diclo-Acino 10 mg/g, gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pendant le 1^{er} et le 2^e trimestre de la grossesse et pendant l'allaitement, Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être utilisé, sauf si expressément prescrit par le médecin. Au cours des trois derniers mois de la grossesse, Diclo-Acino 10 mg/g, gel ne doit pas être utilisé, car le produit peut nuire à l'enfant à naître ou être la cause de problèmes à la naissance. Si vous planifiez une grossesse, vous devez, avant toute utilisation, demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Diclo-Acino 10 mg/g, gel?

La préparation est uniquement destinée à l'usage externe.

Adultes et adolescents dès 12 ans

Selon l'étendue de la zone douloureuse ou enflée à traiter, faire pénétrer par massage léger ou, en cas de douleurs musculaires, par massage plus prononcé, 2 à 4 g de Diclo-Acino 10 mg/g, gel (le volume d'une cerise ou d'une noix) 3 à 4 fois par jour.

Après l'application:

- s'essuyer les mains avec une serviette en papier sèche, puis se laver soigneusement les mains, sauf en cas de traitement des doigts. Jeter la serviette en papier avec les ordures ménagères;
- avant de prendre une douche ou un bain, vous devez attendre que le gel soit sec sur la peau.

Si vous avez oublié un traitement par Diclo-Acino 10 mg/g, gel, rattrapez l'application le plus tôt possible. N'appliquez pas la quantité double pour rattraper le traitement oublié.

Si vous ne constatez aucune amélioration après une semaine, ou si votre état s'aggrave, consultez votre médecin. En l'absence de prescription médicale, n'utilisez pas Diclo-Acino 10 mg/g, gel pendant plus de deux semaines. Utilisez la préparation sur une période la plus courte possible. Ne pas appliquer une quantité plus importante que nécessaire.

Enfants de moins de 12 ans

L'utilisation et la sécurité de Diclo-Acino 10 mg/g, gel n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 12 ans. L'utilisation n'est donc pas recommandée chez ce groupe d'âge.

En cas d'ingestion (accidentelle) de Diclo-Acino 10 mg/g, gel par un adulte ou un enfant, consultez immédiatement un médecin.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Diclo-Acino 10 mg/g, gel peut-il provoquer?

L'utilisation de Diclo-Acino 10 mg/g, gel peut provoquer les effets secondaires suivants. Dans des cas rares à très rares, les effets secondaires peuvent être très sévères.

Si l'un des effets indésirables suivants survient, arrêtez le traitement par Diclo-Acino 10 mg/g, gel et informez-en immédiatement votre médecin:

- éruption cutanée avec formation de vésicules, urticaire;
- respiration haletante, souffle court ou sensation d'oppression dans la poitrine (asthme);
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge.

Les autres effets secondaires suivants sont généralement légers et passagers:

- *fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100):* éruption cutanée, démangeaisons, rougeurs, sensation de brûlure au niveau de la peau;
- *très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000):* éruption cutanée avec pustules, sensibilisation accrue de la peau à la lumière du soleil. Les symptômes d'une telle sensibilisation cutanée sont coup de soleil avec démangeaisons, gonflement de la peau et formation de vésicules.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur, ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Diclo-Acino 10 mg/g, gel?

Principes actifs

1 g de Diclo-Acino 10 mg/g, gel contient 10 mg de diclofénac sodique.

Excipients

Acide lactique, adipate diisopropylique, alcool isopropylique, métabisulfite de sodium (E 223), hydroxyéthylcellulose, hydroxypropylcellulose, eau purifiée.



Numéro d'autorisation

62771 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Diclo-Acino 10 mg/g, gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tubes de 50 et de 100 g de gel.

Titulaire de l'autorisation

Acino Pharma AG, Liesberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

