

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Sumatriptan Spirig HC[®], compresse

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Sumatriptan Spirig HC e quando si usa?

Sumatriptan Spirig HC si usa nel trattamento acuto di attacchi di emicrania.

Si suppone che i dolori associati all'emicrania siano causati da una dilatazione e infiammazione dolorosa dei vasi sanguigni della testa. Sumatriptan Spirig HC allevia i dolori da emicrania restringendo i vasi sanguigni dilatati.

Non si deve usare Sumatriptan Spirig HC a scopo di prevenzione (profilassi) dell'emicrania. Sumatriptan Spirig HC deve essere usato solo su prescrizione medica.

Quando non si può assumere Sumatriptan Spirig HC?

Non si deve assumere Sumatriptan Spirig HC in caso di ipersensibilità ad un componente del preparato, di ipertensione arteriosa non curata, di infarto cardiaco pregresso, di compromissione della funzione renale e gravi malattie epatiche o disturbi circolatori noti del cuore (angina pectoris), del cervello e degli arti.

Sumatriptan Spirig HC non deve essere usato insieme ai seguenti medicinali:

- inibitori MAO (certi antidepressivi o preparati per la terapia del morbo di Parkinson). Il trattamento con Sumatriptan Spirig HC non deve essere cominciato prima che siano trascorse 2 settimane dalla sospensione dell'inibitore MAO.
- preparati contro l'emicrania contenenti ergotamina o suoi derivati (quali diidroergotamina o metisergide). Per questa ragione non si devono usare/assumere preparati contenenti ergotamina durante le 24 ore precedenti e le 6 ore successive all'uso di Sumatriptan Spirig HC.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Sumatriptan Spirig HC?

In rari casi può insorgere una cosiddetta «sindrome serotoninergica» quando si assumono triptani (ad es. Sumatriptan Spirig HC) insieme ad altri medicinali ad azione serotoninergica. Fanno parte di questa classe di farmaci determinati medicinali contro le depressioni (p.es. i cosiddetti inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina/noradrenalina, i cosiddetti inibitori MAO, l'aminoacido L-triptofano, il litio, gli antidepressivi triciclici ecc.). Informi il suo medico se assume questi medicinali. Possono rientrare nella «sindrome serotoninergica» i seguenti sintomi: accentuazione dei riflessi muscolari, contrazioni muscolari, tremore, agitazione, ansia, allucinazioni, irritabilità fino ad arrivare allo stato confusionale e alla perdita di coscienza, aumento della frequenza del polso, oscillazioni della pressione arteriosa, nausea, vomito, febbre e diarrea. Informi il suo medico se dopo l'assunzione di Sumatriptan Spirig HC insorge uno di questi sintomi.

Si sconsiglia di somministrare Sumatriptan Spirig HC contemporaneamente ad altri antiemicranici specifici (cosiddetti triptani).

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffra di ipertensione arteriosa, malattie cardiache, disturbi circolatori, malattie del fegato o dei reni, epilessia.

Il suo medico le prescriverà Sumatriptan Spirig HC con particolare prudenza se lei è in cura con cosiddetti betabloccanti, medicinali usati anche nella profilassi dell'emicrania.

Le cefalee possono peggiorare se si ricorre ad Sumatriptan Spirig HC con troppa frequenza. In questi casi, può darsi che il medico faccia sospendere il trattamento con Sumatriptan Spirig HC.



Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Come conseguenza dell'emicrania o del trattamento con Sumatriptan Spirig HC possono comparire anche sonnolenza, capogiri, nausea e disturbi della vista. Si raccomanda pertanto prudenza quando si guida un veicolo o si manovrano macchine durante il trattamento.

Lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Sodio

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffra di altre malattie,
- soffra di allergie o
- assuma altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applichi esternamente.

Si può assumere Sumatriptan Spirig HC durante la gravidanza o l'allattamento?

Se ha in corso o in programma una gravidanza, non dovrebbe usare Sumatriptan Spirig HC eccetto casi di assoluta necessità.

Il principio attivo di Sumatriptan Spirig HC passa in piccole quantità nel latte materno. È possibile proteggere i lattanti dagli effetti del principio attivo rinunciando ad allattarli nelle 12 ore successive all'uso di Sumatriptan Spirig HC e pompando il latte durante tale periodo.

Come usare Sumatriptan Spirig HC?

Salvo diversa prescrizione medica, valgono le direttive posologiche di seguito indicate.

Adulti e adolescenti a partire dai 18 anni:

La compressa di Sumatriptan Spirig HC da 50 mg presenta una linea di frattura, in corrispondenza della quale può essere divisa.

Ai primi sintomi di emicrania o anche durante l'attacco, assumere ½ compressa di Sumatriptan Spirig HC da 50 mg (dose da 25 mg).

In caso di efficacia insufficiente di una dose di 25 mg, il medico le prescriverà l'assunzione di una intera compressa Sumatriptan Spirig HC da 50 mg. Solo se i sintomi di emicrania già scomparsi tornano a manifestarsi, si possono assumere altre compresse di Sumatriptan Spirig HC, a condizione che venga rispettato un intervallo di tempo di almeno 2 ore tra le dosi.

Tuttavia, nel giro di 24 ore non si devono assumere più di 200 mg (cioè 4 compresse da 50 mg). Durante queste 24 ore non si possono usare, in aggiunta alle compresse Sumatriptan Spirig HC, né iniezioni di sumatriptan o né sumatriptan spray nasale.

È invece possibile sostituire per una volta la seconda dose con un'altra forma galenica di sumatriptan (spray nasale, soluzione per iniezioni) nella dose rispettivamente consigliata. In questi casi bisogna rinunciare ad assumere altre compresse Sumatriptan Spirig HC.

Se la prima dose non ha avuto effetto, non si devono prendere per lo stesso attacco di emicrania altre dosi di Sumatriptan Spirig HC, ma bisogna proseguire la cura dell'attacco con gli analgesici abituali, purché questi non contengano ergotamina o diidroergotamina. Sumatriptan Spirig HC potrà essere nuovamente usato per successive crisi di emicrania.

Le compresse Sumatriptan Spirig HC si devono inghiottire con un po' d'acqua.



Bambini e adolescenti sotto i 18 anni e adulti sopra i 65 anni:

Le compresse Sumatriptan Spirig HC non si devono usare per i bambini o per gli adolescenti sotto i 18 anni, né per gli adulti sopra i 65 anni, perché non si possiedono ancora esperienze sufficienti o perché non è stato ancora possibile dimostrarne l'efficacia in queste fasce di età.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Sumatriptan Spirig HC?

Con la somministrazione di Sumatriptan Spirig HC possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

Vertigini, stordimento, formicolio, aumento transitorio della pressione arteriosa, arrossamento del viso, dispnea, nausea, vomito, dolori, debolezza, stanchezza, sensazione di caldo, freddo, pressione, costrizione o pesantezza in diversi punti del corpo (compresi torace e collo).

Raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 1000)

Dolore mammario.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

Reazioni d'ipersensibilità con gradi di severità diversi (p.es. eruzione cutanea, sensazione di mancanza di respiro fino ad arrivare allo shock che può mettere in pericolo la vita), convulsioni, tremore, distonia (aumento involontario e lento della contrazione muscolare con movimenti e posture abnormi), tremore oculare (nistagmo), limitazioni del campo visivo (scotomi), disturbi visivi quali sfarfallio, visione doppia, diminuzione dell'acuità visiva o perdita della vista (i disturbi visivi possono manifestarsi anche come fenomeno concomitante dell'emicrania), rallentamento o accelerazione del battito cardiaco, palpitazioni, aritmie cardiache, disturbi circolatori del cuore, spasmi coronarici, infarto miocardico, calo della pressione arteriosa, sindrome di Raynaud (insufficiente irrorazione sanguigna delle estremità), colite ischemica (infiammazione di un segmento del colon causata da una vascolarizzazione colica insufficiente), lievi alterazioni dei valori epatici.

Qualora insorgessero difficoltà con la pressione sanguigna o dolori al petto, si rivolga subito al medico.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- se ha recentemente subito una lesione o se soffre di una malattia infiammatoria (ad es. reumatismi o infiammazione del colon), può comparire dolore o un aumento del dolore nella sede della lesione o dell'infiammazione.
- disturbi della deglutizione.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente (15-25°C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.



Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Sumatriptan Spirig HC?

Principi attivi

50 mg di sumatriptan (come sumatriptan succinato).

Sostanze ausiliarie

Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ossido di ferro rosso (E 172).

Numero dell'omologazione

62417 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Sumatriptan Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Sumatriptan Spirig HC 50 mg: 6 e 12 compresse (con linea di frattura, divisibili)

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

