

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Zolmitriptan Spirig HC® 2.5, compresse orosolubili

Spirig HealthCare AG

Che cos'è Zolmitriptan Spirig HC 2.5 e quando si usa?

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 appartiene ad un gruppo di medicinali, chiamati agonisti della serotonina, che agiscono sulle zone del cervello direttamente interessate durante gli attacchi di emicrania. Zolmitriptan Spirig HC 2.5 allevia nel giro di un'ora il mal di testa causato dall'emicrania e migliora altri sintomi quali nausea, vomito, sensibilità alla luce e al rumore. Zolmitriptan Spirig HC 2.5 trova impiego nel trattamento degli attacchi di emicrania.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 dev'essere assunto esclusivamente su prescrizione medica e sotto costante controllo medico.

Quando non si può assumere Zolmitriptan Spirig HC 2.5?

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non dev'essere assunto in caso di ipersensibilità al principio attivo zolmitriptan oppure al dolcificante saccarina sodica o ad altre sostanze ausiliarie contenute in Zolmitriptan Spirig HC 2.5, in caso di ipertensione arteriosa non trattata, dopo un infarto cardiaco o in presenza di disturbi della circolazione sanguigna del cuore (angina pectoris), del cervello e degli arti e in caso di storia di eventi cerebrovascolari o di attacchi ischemici transitori (TIA).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Zolmitriptan Spirig HC 2.5?

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Informi il suo medico o il suo farmacista, se soffre di malattie come p. es. epilessia, gravi disturbi della funzionalità epatica e/o renale, ipertensione arteriosa o malattie cardiache, ivi compresa l'angina pectoris, l'infarto del miocardio e la sindrome di Wolff-Parkinson-White.

L'uso prolungato di qualsiasi antidolorifico per il trattamento della cefalea può peggiorare la situazione. Se questa situazione si verifica o si sospetta, occorre consultare il medico e sospendere il trattamento. La diagnosi di cefalea da abuso di farmaci deve essere sospettata nei pazienti che hanno cefalea frequente o quotidiana malgrado (o a causa di) uso regolare di farmaci per il trattamento della cefalea.

In rari casi, può comparire una malattia potenzialmente fatale, una cosiddetta «sindrome da serotonina», quando i triptani come Zolmitriptan Spirig HC 2.5 vengono utilizzati in combinazione con altri farmaci serotoninergici. Di questi fanno parte determinati medicinali contro la depressione (p. es. i cosiddetti inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina/noradrenalina, i cosiddetti MAO-inibitori, L-triptofano, il litio, gli antidepressivi triciclici).

Informi il suo medico se Lei è in terapia con questi medicinali. La «sindrome da serotonina» può comprendere i seguenti sintomi: aumentata eccitabilità dei riflessi muscolari propriocettivi, spasmi muscolari, tremore, agitazione, ansia, allucinazioni, irritabilità fino a stati confusionali ed a perdita di conoscenza, battito cardiaco accelerato, oscillazioni della pressione arteriosa, nausea, vomito, febbre e diarrea. Informi il suo medico, se dopo l'assunzione di Zolmitriptan Spirig HC 2.5 si verifica uno di questi sintomi.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non deve essere somministrato ai bambini, in quanto non si dispone di esperienze con pazienti in questa fascia di età.

L'efficacia del medicamento negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni non è stata dimostrata. Pertanto, Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non dev'essere impiegato in pazienti in questa fascia di età.



Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non va impiegato per la profilassi dell'emicrania.

Dopo aver assunto Zolmitriptan Spirig HC 2.5, non deve assumere per 24 ore nessun altro medicamento contro l'emicrania appartenente alla categoria degli agonisti della serotonina.

Se prende medicinali contenenti ergotamina, aspetti 24 ore prima di assumere Zolmitriptan Spirig HC 2.5. Dopo aver assunto Zolmitriptan Spirig HC 2.5 per 6 ore non deve assumere medicinali contenenti ergotamina.

Gli effetti indesiderati possono essere più comuni durante l'uso concomitante di triptani e preparati erballi contenenti l'erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*).

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa orosolubile, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Zolmitriptan Spirig HC 2.5 durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, prevede una gravidanza o se allatta, prima di assumere Zolmitriptan Spirig HC 2.5 deve consultare il suo medico.

Come usare Zolmitriptan Spirig HC 2.5?

Salvo diversa prescrizione medica, per gli adulti valgono le seguenti linee guida posologiche:

In caso di attacco acuto di emicrania lasciar sciogliere sulla lingua 1 compressa orosolubile di Zolmitriptan Spirig HC 2.5.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 agisce indipendentemente dal momento dell'assunzione della compressa nel corso dell'attacco di emicrania. Ciononostante si consiglia di assumere Zolmitriptan Spirig HC 2.5 il più presto possibile dopo l'inizio della cefalea emicranica. Se dopo 2 ore ha ancora una forte cefalea emicranica, o se l'emicrania si ripresenta entro 24 ore, prenda un'altra compressa orosolubile di Zolmitriptan Spirig HC 2.5.

Se avesse accidentalmente assunto una dose di Zolmitriptan Spirig HC 2.5 superiore a quella prescritta, contatti il suo medico o si rechi all'ospedale più vicino.

Nell'arco di 24 ore non si devono assumere più di 4 compresse orosolubili di Zolmitriptan Spirig HC 2.5.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non dev'essere somministrato ai bambini e agli adolescenti sotto i 18 anni di età, dato che la sua sicurezza ed efficacia in questa categoria di pazienti non sono state dimostrate.

Modalità d'assunzione di Zolmitriptan Spirig HC 2.5

La compressa orosolubile di Zolmitriptan Spirig HC 2.5 si scioglie rapidamente. Viene messa sulla lingua dove la compressa si scioglie immediatamente e viene ingerita con la saliva. Per l'assunzione delle compresse orosolubili di Zolmitriptan Spirig HC 2.5 non è necessario assumere liquidi.

Lasciare sciogliere sulla lingua la compressa orosolubile di Zolmitriptan Spirig HC 2.5.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 è indicato per quei pazienti che soffrono di nausea o che durante un attacco di emicrania non sono in condizioni di assumere liquidi o hanno difficoltà ad inghiottire le normali compresse.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Zolmitriptan Spirig HC 2.5?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)



Mal di testa, sonnolenza, vertigini, palpitazioni cardiache, sensazione di calore, formicolii nelle dita delle mani e dei piedi, aumentata sensibilità al contatto, debolezza generale, dolori muscolari, dolori addominali, nausea, vomito, secchezza della bocca, disturbi della deglutizione, sensazione di costrizione, pesantezza, dolore o pressione nella zona del petto e del collo o negli arti.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Aumento del flusso di urina, tachicardia e aumento passeggero della pressione sanguigna.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Reazioni allergiche (orticaria, gonfiori a livello di cute, mucose e organi interni).

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

Un restringimento passeggero dei vasi sanguigni cardiaci, un infarto del miocardio, una diarrea sanguinolenta, un bisogno di urinare frequente, un infarto alla milza e all'intestino.

Se osserva uno di questi effetti collaterali, è importante che consulti immediatamente il suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a 15-30 °C, nella confezione originale, al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Zolmitriptan Spirig HC 2.5?

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 compresse orosolubile contengono come

Principi attivi

2,5 mg di Zolmitriptan.

Sostanze ausiliarie

Mannitolo (E 421), cellulosa microcristallina, maltodestrina, silice colloidale anidra, crospovidone, sodio bicarbonato, acido citrico, saccarina sodica, aroma di mentolo con octenilsuccinato di amido sodico (E 1450), magnesio stearato.

Numero dell'omologazione

62789 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Zolmitriptan Spirig HC 2.5? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Zolmitriptan Spirig HC 2.5 compresse orosolubili da 2,5 mg in confezioni da 2, 6 e 12 compresse orosolubili.



Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

