

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Aceduo Leman Gel

Qu'est-ce que Aceduo Leman Gel et quand doit-il être utilisé ?

Aceduo Leman Gel est utilisé pour traiter l'acné. Il contient deux principes actifs, l'adapalène et le peroxyde de benzoyle, qui agissent de façons différentes.

L'adapalène est un rétinoïde et agit spécifiquement sur la peau sur divers processus qui causent l'acné.

Le peroxyde de benzoyle agit comme un agent anti-microbien. Il a également une action adoucissante et exfoliante sur la couche supérieure cutanée, une action qui s'avère bénéfique dans le traitement de l'acné. Selon prescription du médecin.

Quand Aceduo Leman Gel ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas utiliser Aceduo Leman Gel

- si vous souffrez d'une hypersensibilité connue (allergie) à l'adapalène, au peroxyde de benzoyle ou à tout autre composant d'Aceduo Leman
- pendant la grossesse
- si vous prévoyez une grossesse
- sur une peau présentant des coupures, des éraflures ou des coups de soleil, et sur une peau eczémateuse,
- chez les enfants de moins de 12 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation Aceduo Leman Gel?

Appliqué sur le visage, Aceduo Leman ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses (dans les yeux, le nez ou la bouche) ; le contact avec les autres zones très sensibles du corps doit également être évité. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède.

Pendant l'application du gel Aceduo Leman, vous devez éviter de traiter de manière concomitante l'acné avec d'autres préparations contenant du peroxyde de benzoyle et/ou des rétinoïdes.

Eviter l'utilisation concomitante de produits cosmétiques irritants, desséchants ou exfoliants.

Si vous ressentez une irritation cutanée pendant l'utilisation d'Aceduo Leman, contactez votre médecin (voir « Comment utiliser Aceduo Leman ? »).

Évitez une exposition excessive au soleil ou aux lampes à ultraviolets.

Les femmes en âge de procréer ne doivent utiliser Aceduo Leman qu'en association avec une méthode de contraception sûre (voir « Aceduo Leman peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ? »).

Aceduo Leman Gel contient du propylène glycol comme excipient, ce qui peut provoquer des irritations cutanées.

Aceduo Leman Gel ne doit pas entrer en contact avec des matériaux colorés, notamment les cheveux ou les textiles colorés en raison du risque de blanchiment ou de décoloration.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication !).

Aceduo Leman Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

N'UTILISEZ PAS Aceduo Leman si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être. Votre médecin pourra vous fournir de plus amples informations. Si vous tombez enceinte au cours du traitement par Aceduo Leman, interrompez immédiatement le traitement et informez-en votre médecin dès que possible pour mettre en place un nouveau traitement.



Les femmes en âge de procréer devraient utiliser un contraceptif approprié pendant le traitement et jusqu'à un mois après la fin du traitement. Parlez à votre médecin de la méthode que vous désirez utiliser. Aceduo Leman ne doit pas être utilisé pendant la période d'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Comment utiliser Aceduo Leman Gel ?

Aceduo Leman doit toujours être utilisé selon les indications du médecin. Si vous avez des questions au sujet de ce traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Appliquez une fine couche de gel de façon homogène sur l'ensemble de la zone affectée par l'acné, une fois par jour avant le coucher, en évitant les yeux, les lèvres et les narines, sur une peau propre et sèche. Lavez-vous les mains soigneusement après application.

Une application plus fréquente ou l'utilisation de plus grandes quantités d'Aceduo Leman Gel n'apporte pas de meilleurs résultats, mais peut provoquer irritations et rougeurs cutanées.

Si vous avez oublié d'appliquer Aceduo Leman, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Votre médecin vous indiquera combien de temps vous devez appliquer Aceduo Leman.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Si vous ressentez une irritation de la peau lors de l'application d'Aceduo Leman, parlez-en à votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'appliquer une crème hydratante non comédogène et d'espacer les applications de gel voire de suspendre le traitement pendant une courte période ou de l'arrêter complètement.

Contactez votre médecin si le médicament a été pris par erreur.

Quels effets secondaires Aceduo Leman Gel peut-il provoquer ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été observés :

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

irritation de la peau, peau sèche, éruption cutanée localisée (dermite de contact irritative), desquamation excessive, rougeur de la peau (érythème), sensation de brûlure.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)

Coup de soleil et démangeaisons.

Avec une fréquence d'apparition inconnue (cette dernière ne peut être déterminée à partir des données disponibles), gonflement du visage, réactions allergiques de contact, douleurs cutanées (sensations de picotement), ampoules (vésicules), urticaire, décoloration de la peau, gonflement de la paupière, essoufflement, sensation de gorge serrée et réactions allergiques graves pouvant être associées à des difficultés respiratoires et des vertiges, ainsi que brûlures au site d'application peuvent apparaître.

Les irritations de la peau après l'application d'Aceduo Leman sont généralement de légères à modérées, avec des signes locaux (rougeurs, peau sèche, desquamation cutanée, brûlures et douleurs cutanées), qui surviennent principalement pendant la première semaine de traitement puis se résolvent sans traitement supplémentaire.

Les brûlures au site d'application sont en général superficielles, mais des cas plus graves avec formation de cloques ont été signalés.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur l'emballage.



Délai d'utilisation après ouverture

Aceduo Leman Gel a une durée de conservation de 6 mois après ouverture de l'emballage lorsque stocké à température ambiante (15-25 °C).

Remarque concernant le stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Que contient Aceduo Leman Gel ?

Aceduo Leman est un gel opaque de couleur blanche à jaune très pâle.

1 g d'Aceduo Leman gel contient

Principes actifs

1 mg d'adapalène et 25 mg de peroxyde de benzoyle.

Excipients

Propylène glycol (E 1520), copolymère d'acrylamide et d'acryloyldiméthyltaurate de sodium, isohexadécane, polysorbate 80, oléate de sorbitan, docusate de sodium, édétate disodique, glycérol (E 422), poloxamère 124, eau purifiée.

Ce médicament contient 40 mg de propylène glycol (E1520) par 1 g de gel.

Numéro d'autorisation

68957 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Aceduo Leman Gel ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Récipients multidoses avec système de pompe sans gaz contenant 30 g ou 45 g ou 60 g de gel [B].

Titulaire de l'autorisation

Leman SKL SA, Lancy.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

