

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Aceduo Leman Gel

Che cos'è Aceduo Leman Gel e quando si usa?

Aceduo Leman Gel è indicato per il trattamento dell'acne. Contiene due principi attivi, l'adapalene e il benzoile perossido, che agiscono in modi diversi.

L'adapalene è un retinoide che agisce specificamente sui processi cutanei che causano l'acne.

Il benzoile perossido è efficace come sostanza antimicrobica ed esercita un'azione lenitiva ed esfoliante sullo strato più esterno della pelle, favorevole per il trattamento dell'acne.

Su prescrizione medica.

Quando non si può usare Aceduo Leman Gel?

Non usi Aceduo Leman Gel

- in caso di nota ipersensibilità (allergia) ad adapalene, benzoile perossido o qualsiasi altro ingrediente di Aceduo Leman
- durante la gravidanza
- se sta pianificando una gravidanza
- su aree cutanee ove siano presenti ferite, graffi, ustioni solari o eczema,
- nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Aceduo Leman Gel?

Durante l'applicazione sul viso, eviti la penetrazione di Aceduo Leman nelle mucose (occhi, narici o bocca); eviti il contatto con altre zone sensibili del corpo. Se ciò accade, sciacqui immediatamente la zona interessata con abbondante acqua tiepida.

Durante l'uso di Aceduo Leman gel, non utilizzi altri prodotti per il trattamento dell'acne contenenti benzoile perossido e/o retinoidi.

Eviti di utilizzare Aceduo Leman in concomitanza con prodotti cosmetici che abbiano effetti irritanti, essiccanti o esfolianti sulla pelle.

In caso di irritazione della pelle durante l'uso di Aceduo Leman, contatti il medico (vedere «Come si usa Aceduo Leman?»).

Eviti l'eccessiva esposizione alla luce del sole e alle lampade UV.

Le donne in età fertile devono utilizzare un metodo contraccettivo efficace durante il trattamento con Aceduo Leman (vedere «Si può usare Aceduo Leman durante la gravidanza o l'allattamento?»).

Aceduo Leman Gel contiene glicole propilenico come eccipiente, un componente che può causare irritazione cutanea.

Eviti il contatto di Aceduo Leman Gel con materiali colorati, inclusi capelli o tessuti colorati, poiché potrebbe decolorarli o scolorirli.

Informi il medico o il farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre patologie,



- soffre di allergie
- se assume altri medicinali (anche da banco!) per via orale o esterna.

Si può usare Aceduo Leman Gel durante la gravidanza o l'allattamento?

NON USI Aceduo Leman in caso di gravidanza, o se sta pianificando una gravidanza. Il medico potrà fornirle maggiori informazioni. Se inizia una gravidanza durante il trattamento con Aceduo Leman, interrompa immediatamente il trattamento e informi il medico il prima possibile per sottoporsi a eventuali controlli.

Le donne in età fertile devono usare un contraccettivo adeguato durante il trattamento e per 1 mese dopo l'interruzione della terapia. Discuta con il medico il metodo contraccettivo adatto a Lei.

Aceduo Leman non deve essere utilizzato durante l'allattamento. Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di assumere il medicamento.

Come usare Aceduo Leman Gel?

Aceduo Leman deve essere sempre usato secondo le istruzioni del medico. Si rivolga al medico o al farmacista per qualsiasi domanda in merito al trattamento.

Applichi il gel una volta al giorno, prima di coricarsi, uniformemente in uno strato sottile, sulle zone colpite dall'acne. Eviti accuratamente il contatto con le labbra, gli occhi, le narici e le mucose. La pelle deve essere pulita e asciutta prima dell'applicazione. Si lavi accuratamente le mani immediatamente dopo l'uso. L'uso più frequente o in grandi quantità di Aceduo Leman Gel non darà risultati migliori, ma la pelle potrebbe irritarsi e arrossarsi.

Se dimentica di usare Aceduo Leman, non applichi una dose doppia per compensare la dimenticanza di singole applicazioni. Il medico Le dirà per quanto tempo usare Aceduo Leman.

Non modifichi di sua iniziativa la dose prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, consulti il medico o il farmacista.

In caso di irritazione cutanea durante l'uso di Aceduo Leman, consulti il medico, che potrà consigliarle se applicare una crema idratante non comedogena, ridurre la frequenza di applicazione del gel o interromperne l'uso per breve tempo o definitivamente.

Contatti il medico o l'ospedale se il medicamento è stato preso per errore.

Quali effetti collaterali può avere Aceduo Leman Gel?

Come tutti i medicinali, Aceduo Leman può causare effetti indesiderati in alcuni individui, occasionalmente possono verificarsi reazioni avverse nel sito di applicazione.

I seguenti effetti indesiderati sono stati segnalati con questa frequenza:

Comune (riguarda da 1 a 10 pazienti su 100)

irritazione cutanea, pelle secca, reazioni allergiche localizzate (dermatite da contatto), eccessiva forfora e desquamazione, arrossamento della pelle (eritema), bruciore cutaneo.

Non comune (riguarda da 1 a 10 pazienti su 1.000)

Eritema solare e prurito.

Con frequenza sconosciuta (non può essere stimata in base ai dati disponibili) possono manifestarsi gonfiore, dermatite allergica, orticaria, dolore cutaneo (sensazioni di bruciore), bolle (vescicole), decolorazione della pelle, gonfiore delle palpebre, mancanza di respiro, sensazione di oppressione nel collo, gravi reazioni allergiche che possono essere associate a mancanza di respiro o vertigini, nonché ustioni nel sito di applicazione.



Le irritazioni cutanee dopo l'uso di Aceduo Leman sono in genere da moderatamente leggere a pronunciate, con segni locali (rossore, pelle secca, desquamazione cutanea, bruciore e dolore della pelle), che si manifestano soprattutto durante la prima settimana di trattamento e che regrediscono quindi durante l'ulteriore trattamento.

Le ustioni nel sito di applicazione sono per lo più superficiali, ma sono già stati segnalati casi di formazione di vesciche più gravi.

Se nota effetti collaterali, informi il suo medico o farmacista. Ciò vale in particolare per gli effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento può essere usato esclusivamente entro la data di scadenza (indicata dalla dicitura «EXP» sulla confezione).

Conservazione dopo l'apertura

Aceduo Leman Gel ha una durata di conservazione di 6 mesi dopo l'apertura, se conservato a temperatura ambiente (15-25°C).

Indicazioni sulla conservazione

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25°C) e lontano dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni si rivolga al medico o al farmacista. Queste persone dispongono di esaurienti informazioni professionali.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Aceduo Leman Gel?

Aceduo Leman è un gel di colore da bianco a giallastro pallido.

1 g di Aceduo Leman Gel contiene

Principi attivi

1 mg di adapalene e 25 mg di benzoile perossido.

Sostanze ausiliarie

Glicole propilenico (E1520), copolimero di acrilammide - Sodio acrilodimetiltaurato, isoesadecano, polisorbato 80, sorbitan monooleato, sodio docusato, sodio edetato, glicerolo (E422), polossamero 124, acqua purificata.

Questo medicinale contiene 40 mg di glicole propilenico (E1520) per 1 g di gel.

Numero dell'omologazione

68957 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Aceduo Leman Gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, solo dietro prescrizione medica.

Contenitori multidose con pompa senza gas a tenuta d'aria contenenti 30 g o 45 g o 60 g di gel [B].



Titolare dell'omologazione

Leman SKL SA, Lancy.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

