

DUL-X® Gel cool Wallwurz comp.

Was ist DUL-X Gel cool Wallwurz comp. und wann wird es angewendet?

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. wird äusserlich angewendet:

- bei Zerrungen, Prellungen, Stauchungen, kleineren Hämatomen (Blutergüssen), Muskelanrissen.

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. ist auch geeignet für die symptomatische Behandlung von stumpfen Verletzungen.

Wann darf DUL-X Gel cool Wallwurz comp. nicht angewendet werden?

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. darf nicht angewendet werden:

- bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe (siehe «Was ist in DUL-X Gel cool Wallwurz comp. enthalten?»).

Wann ist bei der Anwendung von DUL-X Gel cool Wallwurz comp. Vorsicht geboten?

DUL-X Gel Cool Wallwurz comp. darf bei Klein-Kindern nicht angewendet werden. Auch auf Venenentzündungen, auf Krampfadern, auf offenen Wunden und grossflächig geschädigter Haut, auf Schleimhäuten wird die Anwendung nicht empfohlen.

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. bei Kindern unter 8 Jahren vorsichtig anwenden.

Bei stark schmerzhaften Blutergüssen ist eine ärztliche Kontrolle angezeigt.

Nach der Anwendung von DUL-X Gel cool Wallwurz comp. Hände waschen. Augenkontakt vermeiden. DUL-X Gel cool Wallwurz comp. ist kein Sportmassagemittel im eigentlichen Sinn und soll deshalb kurzfristig und nur für den beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Bei Patienten mit vorgeschädigten Nieren darf DUL-X Gel cool Wallwurz comp. nur kurzfristig und nicht grossflächig angewendet werden.

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. enthält Natriummethylparahydroxybenzoat E 219, welches allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen kann.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf DUL-X Gel cool Wallwurz comp. während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf DUL-X Gel cool Wallwurz comp. nicht angewendet werden, es sei denn kurzfristig, nicht grossflächig und nur auf ärztliche Verschreibung.

Wie verwenden Sie DUL-X Gel cool Wallwurz comp.?



Erwachsene

DUL-X Gel cool Wallwurz comp. bis 5-mal täglich in dünner Schicht und ohne Druck auf der zu behandelnden Stelle leicht einmassieren. Die Dauer der Anwendung sollte 6 Wochen nicht übersteigen.

Die Anwendung und Sicherheit von DUL-X Gel cool Wallwurz comp. bei Kindern und Jugendlichen ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann DUL-X Gel cool Wallwurz comp. haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von DUL-X Gel cool Wallwurz comp. auftreten:

- Hautreizungen,
- Hautausschläge.

In diesem Fall ist die Behandlung abubrechen und gegebenenfalls ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „EXP“ bezeichneten Datum verwendet werden. Bei allfälligem Augenkontakt kann Augenbrennen auftreten. Die Augen sind dabei mit viel Wasser auszuspülen. Die Beschwerden verschwinden nach kurzer Zeit.

Lagerungshinweis

Das Arzneimittel ist für Kinder unerreikbaar und bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufzubewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in DUL-X Gel cool Wallwurz comp. enthalten?

100 g Gel enthalten:

Wirkstoffe

Flüssigextrakt aus Wallwurz Wurzel 10.0 g (Symphytum officinale L., Droge-Extrakt-Verhältnis 2:1, Auszugsmittel: Ethanol 65 % V/V), Trockenextrakt aus Roskastaniensamen 10.0 g (Aesculus hippocastanum L., Droge-Extrakt-Verhältnis 5-7:1, Auszugsmittel Ethanol 60 % V/V), Arnikablüten-Tinktur 4.0 g (Arnica montana L., Droge-Extrakt-Verhältnis 1:10, Auszugsmittel: Ethanol 60-70 % V/V), Allantoin 0.6 g, Aesculin 0.5 g, Menthol 0.35 g, Pfefferminz-Öl 0.11 g, Rosmarin-Öl 0.35 g.

Hilfsstoffe

Ethanol 94 %, Polysorbat 80, Carbomere, Trolamin, Wasser, Nelkenöl, Eucalyptusöl, Campher, Zimtblätteröl, Citronellöl, Natriummethylparahydroxybenzoat E 219, Imidazolidinylureum.



Zulassungsnummer

43609 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie DUL-X Gel cool Wallwurz comp.? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Tube zu 125 ml.

Zulassungsinhaberin

Melisana AG, 8004 Zürich.

Diese Packungsbeilage wurde im *Februar 2020* letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

