

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Zovirax Lip Duo, Crema

Haleon Schweiz AG

L'efficacia e la sicurezza di Zovirax Lip Duo, crema sono state verificate da Swissmedic solo sommariamente. L'omologazione di Zovirax Lip Duo, crema si basa su Zoviduo con stato dell'informazione aggiornato a maggio 2021, che contiene gli stessi principi attivi ed è omologato in Danimarca.

Che cos'è Zovirax Lip Duo e quando si usa?

Zovirax Lip Duo contiene due principi attivi: aciclovir e idrocortisone.

Il principio attivo *aciclovir* impedisce la moltiplicazione del virus che causa l'herpes labiale. L'*idrocortisone* è uno steroide a bassa potenza che riduce l'infiammazione associata all'herpes labiale.

Zovirax Lip Duo, crema è usato in adulti e adolescenti (a partire da 12 anni) per il trattamento dei segni e dei sintomi precoci (ad es. formicolio, prurito e arrossamento) dell'herpes labiale sulle labbra e sulla pelle vicino alle labbra per ridurre le possibilità che si sviluppino le vescicole.

Qualora si manifestassero le vescicole, Zovirax Lip Duo sarà in grado di ridurre la durata del processo di guarigione di circa una o mezza giornata rispetto alle creme senza i principi attivi.

L'herpes labiale è causato da un virus denominato Herpes simplex. Il virus causa la comparsa di vescicole ed ulcere principalmente sulle labbra, ma anche in altre zone del viso. L'herpes labiale può svilupparsi quando il sistema immunitario è debole (ad es. in presenza di raffreddore o altre infezioni). Anche stress, eccessiva esposizione alla luce solare, temperature fredde o mestruazioni possono causarne la comparsa.

Si rivolga al medico se i sintomi persistono 5 giorni dopo aver completato il trattamento.

Quando non si può usare Zovirax Lip Duo?

Non usi Zovirax Lip Duo:

- se è allergico ai principi attivi (aciclovir, idrocortisone), al valaciclovir, o ad una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione.
- per infezioni cutanee diverse dall'herpes labiale.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Zovirax Lip Duo?

Utilizzare Zovirax Lip Duo soltanto sull'herpes labiale su labbra o pelle vicino alle labbra.

Si rivolga al medico se soffre di herpes labiale ricorrente per accertarsi che non sia affetto da altre malattie sottostanti.

Non usi Zovirax Lip Duo:

- negli occhi, dentro la bocca o nel naso o sui genitali
- per trattare l'herpes genitale
- se il suo sistema immunitario non funziona correttamente (ad es. se è stato sottoposto a trapianto del midollo osseo o se è affetto da HIV) o se le è stato diagnosticato un indebolimento del sistema immunitario
- con bendaggi, quali cerotti e cerotti apposti per l'herpes labiale.

Lavarsi le mani prima e dopo l'applicazione per evitare che l'herpes labiale peggiori e che venga trasmesso a un'altra persona.



Non usare per oltre 5 giorni.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi (vedere anche «Quali effetti collaterali può avere Zovirax Lip Duo?»).

Bambini di età inferiore ai 12 anni

Questo medicamento non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 12 anni, poiché la sua efficacia e sicurezza nei bambini di età inferiore ai 12 anni finora non sono stati esaminati.

Uso di Zovirax Lip Duo con altri medicinali

Non è noto se l'effetto di Zovirax Lip Duo possa essere alterato dall'uso concomitante di altri medicinali.

Uso di Zovirax Lip Duo con cibi e bevande

Non applicare la crema immediatamente prima dei pasti poiché potrebbe essere ingerita.

Capacità di condurre veicoli e di utilizzare macchine

L'uso di Zovirax Lip Duo non influisce sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchine.

Zovirax Lip Duo contiene alcool cetostearilico e glicole propilenico. L'alcool cetostearilico può causare irritazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto). Il glicole propilenico (E 1520) può causare irritazioni cutanee.

Zovirax Lip Duo contiene sodio laurilsolfato (E 487). 1 g di crema contiene 8 mg di sodio laurilsolfato corrispondente a 0,8%. Sodio laurilsolfato può causare reazioni cutanee locali (come sensazione di pizzicore o bruciore) o intensificare le reazioni sulla pelle causate da altri medicinali quando applicati sulla stessa area.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Zovirax Lip Duo durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico, al farmacista o al droghiere prima di utilizzare questo medicinale.

Non utilizzare Zovirax Lip Duo durante la gravidanza o l'allattamento, a meno che il medico non ritenga che i potenziali benefici superino la possibilità di rischi non noti.

Come usare Zovirax Lip Duo?

Solo per uso esterno.

Non usare più della dose raccomandata.

Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni

Applicare la crema cinque volte al giorno per 5 giorni (ossia ogni 3-4 ore circa durante il giorno, quando si è svegli, senza applicazione durante la notte).

Si raccomanda di iniziare il trattamento il prima possibile, preferibilmente quando compaiono i primi segni o sintomi (ad es. formicolio, rossore o prurito).

Il trattamento non deve essere protratto per oltre 5 giorni. Se i sintomi persistono 5 giorni dopo la conclusione del trattamento, si rivolga al medico.

Modo di somministrazione

Si lavi le mani prima e dopo l'applicazione della crema per evitare che l'herpes labiale peggiori e che venga trasmesso a un'altra persona.



Se dovesse manifestare un'ulcerazione, non la tocchi più del necessario per non diffondere l'infezione in altre aree del corpo o negli occhi.

Se utilizza più Zovirax Lip Duo di quanto deve

Se utilizza accidentalmente Zovirax Lip Duo più del dovuto o se ingerisce la crema, è improbabile che si manifestino effetti indesiderati. Tuttavia, se ingerisce una grande quantità di crema, si rivolga al medico.

Contatti il suo medico o il pronto soccorso se ha usato più Zovirax Lip Duo di quanto indicato in questo foglietto illustrativo o più di quanto prescritto dal suo medico e si sente male.

Se dimentica di utilizzare Zovirax Lip Duo

Se ha dimenticato di applicare la crema, la applichi appena se ne ricorda e continui il trattamento come prima.

Bambini di età inferiore ai 12 anni

Questo medicamento non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 12 anni, poiché la sua efficacia e sicurezza nei bambini di età inferiore ai 12 anni finora non sono stati esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Zovirax Lip Duo?

Come tutti i medicinali, Zovirax Lip Duo può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Interrompa l'uso del medicamento e contatti immediatamente il medico se manifesta uno dei seguenti sintomi di reazione allergica (effetto indesiderato molto raro: riguarda meno di 1 persona su 10 000):

- gonfiore del viso, della lingua e della gola che può causare difficoltà respiratorie o di deglutizione
- orticaria.

I seguenti effetti indesiderati sono elencati in base alla frequenza con cui potrebbero verificarsi:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Secchezza eccessiva o desquamazione cutanea

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Bruciore, formicolio o dolore pungente transitori possono manifestarsi direttamente dopo l'applicazione. Prurito.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Arrossamento della pelle, variazione del colore della pelle, eruzione cutanea localizzata o irritazione cutanea con sensazione di prurito e bruciore nella sede in cui la crema è stata applicata.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Visione offuscata (vedere anche «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Zovirax Lip Duo?»).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura



Dopo la prima apertura del tubo: 3 mesi.

Non usi il medicamento se nota alterazioni dell'aspetto e/o della consistenza della crema.

Istruzioni di conservazione

Non conservare a temperature superiori a 25°C. Non conservare in frigorifero. Non congelare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Zovirax Lip Duo?

Principi attivi

1 g di crema contiene: 50 mg di aciclovir e 10 mg di idrocortisone.

Sostanze ausiliarie

Alcool cetostearilico, acido citrico monoidrato, sodio laurilsolfato (E 487), isopropile miristato, paraffina liquida, polossamero 188, glicole propilenico (E 1520), vaselina bianca, sodio idrossido e acido cloridrico (per la regolazione del pH) e acqua depurata.

Zovirax Lip Duo è una crema di colore dal bianco al giallastro.

Il tubo è realizzato di alluminio.

Numero dell'omologazione

68022 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Zovirax Lip Duo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 2 g di crema.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2021 dall'autorità di riferimento estera. Senza integrazioni rilevanti per la sicurezza da parte di Swissmedic: luglio 2021.

