

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pemzek®

AstraZeneca AG

Che cos'è Pemzek e quando si usa?

Pemzek contiene come principio attivo il candesartan cilexetil e viene utilizzato per il trattamento della pressione alta (ipertensione arteriosa) negli adulti nonché nei bambini e negli adolescenti di 1-17 anni di età e della debolezza del muscolo cardiaco (insufficienza cardiaca) negli adulti. Pemzek blocca in modo specifico dei recettori endogeni (i cosiddetti recettori dell'angiotensina II). Questo provoca una dilatazione dei vasi sanguigni e una diminuzione della pressione arteriosa, migliorando le prestazioni cardiache. Il suo medico può usare Pemzek per migliorare le prestazioni cardiache in associazione con altri medicinali o in sostituzione di medicinali che non sono adatti a causa di determinati effetti indesiderati.

Pemzek si può usare soltanto su prescrizione medica.

Quando non si può usare Pemzek?

Pemzek non deve essere assunto in caso di ipersensibilità nota al principio attivo candesartan cilexetil o ad una delle sostanze ausiliarie, nei pazienti con gravi malattie del fegato e/o colestasi oppure durante la gravidanza e l'allattamento. Pemzek non deve essere assunto da bambini di età inferiore a 1 anno.

Non deve assumere Pemzek se soffre di diabete mellito (tipo 1 o tipo 2), se la funzionalità renale è compromessa e se assume medicinali contenenti il principio attivo aliskiren per il trattamento dell'ipertensione (ad es. Rasilez®).

Lei non deve assumere Pemzek se, in occasione di una precedente assunzione di medicinali anti-ipertensivi, ha manifestato gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola (disturbi della deglutizione o della respirazione).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Pemzek?

È particolarmente importante che informi il suo medico se soffre di una malattia dei reni o del fegato oppure in caso di assunzione contemporanea di determinati anticoagulanti. Una particolare cautela deve essere osservata anche nei pazienti con malattie delle valvole cardiache.

Inoltre deve informare il suo medico se, insieme ad Pemzek, lei assume altri medicinali contro l'ipertensione arteriosa, medicinali che possono far aumentare i livelli di potassio nel sangue (ad es. determinati diuretici come i diuretici risparmiatori di potassio, preparati a base di potassio, eparina), preparati a base di litio o se assume regolarmente antidolorifici contro i reumatismi (antinfiammatori non steroidei o inibitori della COX2) o acido acetilsalicilico (principio attivo contenuto in Aspirina ed in altri antidolorifici). L'impiego di Pemzek in associazione con medicinali che contengono il principio attivo aliskiren è sconsigliato.

Prima di un intervento chirurgico, informi il suo medico o il suo dentista che sta assumendo Pemzek. Se questo medicamento viene usato insieme a determinati anestetici può verificarsi un abbassamento della pressione arteriosa.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).



Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Pemzek contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicamento.

Si può assumere Pemzek durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è in gravidanza, sta pianificando una gravidanza o sta allattando al seno, non deve assumere Pemzek. È noto che medicinali simili, usati durante la gravidanza, possono causare danni al feto. Se dovesse restare incinta durante la somministrazione di Pemzek informi immediatamente il medico, che deciderà se sia il caso di sospendere il trattamento o no.

Come usare Pemzek?

Il medico stabilirà il dosaggio adatto al suo caso basandosi su regolari controlli della pressione arteriosa. È molto importante che assuma Pemzek ogni giorno così come le è stato prescritto.

Pemzek può essere assunto indipendentemente dai pasti. È preferibile assumere le compresse sempre alla stessa ora, ad es. al mattino.

Iperensione arteriosa negli adulti

Per il trattamento dell'ipertensione arteriosa il dosaggio raccomandato è di 8 mg una volta al giorno. Se necessario, il medico può aumentare la dose a 16 mg una volta al giorno. Se dopo 4 settimane di trattamento con una dose giornaliera di 16 mg la riduzione della pressione sanguigna non è sufficiente, la dose può essere ulteriormente aumentata fino a un massimo di 32 mg una volta al giorno.

Iperensione arteriosa nei bambini e negli adolescenti di 1-17 anni di età

Il medico stabilirà il dosaggio esatto.

Per i bambini che non sono in grado di deglutire le compresse vi è la possibilità di sospendere le compresse di Pemzek. Il suo medico le può rilasciare una ricetta per la preparazione specifica della sospensione.

Insufficienza cardiaca negli adulti

Per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, la dose iniziale di Pemzek è di solito pari a 4 mg una volta al giorno. In seguito la posologia verrà lentamente aumentata nell'arco di diverse settimane fino a un massimo di 32 mg una volta al giorno. È importante seguire esattamente la prescrizione del medico.

L'efficacia nei bambini e negli adolescenti con insufficienza cardiaca finora non è stata esaminata. Per questo motivo Pemzek non deve essere assunto dai bambini e dagli adolescenti affetti da insufficienza cardiaca.

Nei pazienti anziani o nei pazienti con compromissione da lieve a moderata della funzionalità renale o epatica non è necessario alcun aggiustamento della dose. Se soffre di una malattia renale grave, il suo medico potrebbe prescrivere un dosaggio iniziale più basso.

Non esiste alcuna esperienza sull'uso di Pemzek nei bambini di età inferiore a 1 anno.

Se ha assunto una dose superiore a quella prescritta, contatti immediatamente il medico o il farmacista.

Se ha dimenticato di assumere una compressa, la prenda più tardi, non appena se ne ricorda. Tuttavia, se è quasi ora di assumere la compressa successiva tralasci quella dimenticata.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Pemzek?

Con l'assunzione di Pemzek possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Vi sono state frequenti segnalazioni di infezioni delle vie respiratorie, stordimento e capogiri, mal di testa, dolore alla schiena e abbassamento della pressione arteriosa (frequentemente nei pazienti con



insufficienza cardiaca). Molto raramente è possibile la comparsa di gonfiori della pelle (soprattutto a carico del viso, delle labbra, della lingua, degli occhi) e/o delle mucose (angioedema), prurito o eruzione di tipo orticaria. In questo caso deve interrompere immediatamente l'assunzione di Pemzek e consultare il medico. In casi molto rari sono stati segnalati anche capogiri, tosse, nausea, malattie del fegato (ad es. epatiti), eruzioni cutanee, orticaria, prurito, riduzione della funzionalità renale, dolori articolari e muscolari.

Altri possibili effetti collaterali sono: febbre, accelerazione delle pulsazioni, palpitazioni cardiache, dolori al petto, angina pectoris (sintomi come dolori al torace e/o nella zona della spalla e del braccio, difficoltà respiratorie), infarto del miocardio, formicolii a carico delle mani e dei piedi, sangue dal naso, stati ansiosi, depressione, difficoltà respiratorie e accumulo di acqua nei tessuti.

Questi effetti collaterali non sono necessariamente da attribuirsi alla somministrazione di Pemzek, dato che sono stati riscontrati anche in pazienti che non hanno assunto il medicamento.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Se fosse in possesso di medicinali scaduti, li riporti in farmacia per l'eliminazione.

Indicazioni concernenti l'immagazzinamento

Pemzek deve essere conservato a temperature inferiori a 30 °C e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pemzek?

Principi attivi

Pemzek 4 mg, compresse contengono 4 mg di Candesartan cilexetil.

Pemzek 8 mg, compresse contengono 8 mg di Candesartan cilexetil.

Pemzek 16 mg, compresse contengono 16 mg di Candesartan cilexetil.

Pemzek 32 mg, compresse contengono 32 mg di Candesartan cilexetil.

Sostanze ausiliarie

Pemzek 4 mg, compresse:

Lattosio monoidrato, Macrogol 8000, carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais

Pemzek 8 mg, compresse:

Lattosio monoidrato, macrogol 8000, carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, ossido di ferro rosso (E172)

Pemzek 16 mg, compresse:

Lattosio monoidrato, macrogol 8000, carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, ossido di ferro rosso (E172)

Pemzek 32 mg, compresse:

Lattosio monoidrato, macrogol 8000, carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, amido di mais, ossido di ferro rosso (E172)

Numero dell'omologazione



62498 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Pemzek? Quali confezioni sono disponibili?

Pemzek è ottenibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Sono disponibili le seguenti confezioni:

7, 28 e 30 compresse Pemzek 4 mg (con linea di frattura, divisibile).

28, 30 e 98 compresse Pemzek 8 mg (con linea di frattura, divisibile).

28, 30 e 98 compresse Pemzek 16 mg (con linea di frattura, divisibile).

28, 30 e 98 compresse Pemzek 32 mg (con linea di frattura, divisibile).

Titolare dell'omologazione

AstraZeneca AG, 6340 Baar

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

