

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Burgerstein Zink 15 mg

Antistress Aktiengesellschaft

Che cos'è Burgerstein Zink 15 mg e quando si usa?

Lo zinco è un oligoelemento importante per il nostro organismo ed essenziale per la vita. Burgerstein Zink 15 mg viene impiegato in caso di carenza di zinco dovuta all'alimentazione (apporto insufficiente o alimentazione non equilibrata), che può essere associata ad esempio a una maggiore predisposizione alle infezioni, problemi cutanei o ritardo nella guarigione delle ferite.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Quando non si può usare Burgerstein Zink 15 mg?

Burgerstein Zink 15 mg non può essere assunto in caso di ipersensibilità a una delle sostanze ausiliarie, di gravi disturbi della funzionalità renale o insufficienza renale acuta.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Burgerstein Zink 15 mg?

L'assunzione di zinco può compromettere l'assorbimento di altri oligoelementi. Ad esempio possono insorgere una riduzione dell'assorbimento del rame, un abbassamento del livello del rame nel sangue, o disturbi dell'assorbimento del ferro.

Lo zinco può compromettere l'assorbimento di un determinato gruppo di antibiotici (tetracicline). Di conseguenza si consiglia di assumere questi antibiotici prima o dopo almeno 5 ore dall'assunzione di Burgerstein Zink 15 mg. Poiché l'assimilazione dello zinco può essere diminuita da preparati contenenti calcio e fosforo, dal caffè e dai prodotti integrali, osservare l'avvertenza di assumere Burgerstein Zink 15 mg 1 ora prima o 2 ore dopo i pasti.

Si può assumere Burgerstein Zink 15 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Burgerstein Zink 15 mg?

Adulti: assuma 1 compressa rivestita con film al giorno, senza masticarla, con un po' di liquido, 1 ora prima o 2 ore dopo i pasti. Burgerstein Zink 15 mg non è destinato all'uso nei bambini e negli adolescenti.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Burgerstein Zink 15 mg?

Con l'assunzione di Burgerstein Zink 15 mg, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: raramente bruciore di stomaco, vomito, diarrea o lieve nausea.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.



Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «Exp» sul contenitore.

Burgerstein Zink 15 mg deve essere conservato ben chiuso, in un luogo asciutto, a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Burgerstein Zink 15 mg?

Principi attivi

Lo zinco gluconato è un composto organico dello zinco. Ogni compressa rivestita con film contiene 15 mg di zinco.

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina (E 460), povidone K25 (E 1201), crospovidone tipo B (E 1202), talco (E 553b), magnesio stearato, gommalacca (E 904), olio di ricino vergine.

Numero dell'omologazione

47133 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Burgerstein Zink 15 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Confezioni: 100 compresse rivestite con film da 15 mg.

Titolare dell'omologazione

Antistress SA, Società per la protezione della salute, CH-8640 Rapperswil-Jona.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

