

L'efficacité et la sécurité du sirop Triofan Antitussif Levodrop n'ont été que sommairement contrôlées par Swissmedic. L'autorisation du sirop Triofan Antitussif Levodrop repose sur celle de LevoDril, qui contient le même principe actif, qui est autorisé en Pologne et dont l'information a été mise à jour en février 2024.

Qu'est-ce que le sirop Triofan Antitussif Levodrop et quand doit-il être utilisé?

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop contient le principe actif lévodropropizine, qui calme la toux et soulage les contractions des muscles des voies respiratoires.

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop est utilisé pour le traitement symptomatique de la toux non productive (sèche) chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 2 ans.

Il est largement prouvé que ce médicament supprime efficacement les toux d'origines diverses, telles que les toux causées par le cancer du poumon, les infections des voies respiratoires supérieures et inférieures ou la coqueluche. Consultez un médecin si vous ne vous sentez pas mieux ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Quand le sirop Triofan Antitussif Levodrop ne doit-il pas être utilisé?

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop ne doit pas être administré:

- chez les enfants de moins de 2 ans;
- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants de ce médicament
- si vous souffrez d'une sécrétion bronchique excessive et de troubles des cils épithéliaux bronchiques (syndrome de Kartagener, dyskinésie ciliaire)
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- si l'on a constaté chez vous de graves limitations de la fonction hépatique.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise du sirop Triofan Antitussif Levodrop?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre le sirop Triofan Antitussif Levodrop.

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop est un médicament utilisé pour le traitement symptomatique de la toux non productive (sèche) et il ne doit être utilisé que en attendant le diagnostic de la cause de la toux et/ou le traitement de la maladie à l'origine de la toux.

La prudence est de mise en cas de toux productive, car l'utilisation simultanée de médicaments mucolytiques peut entraîner une accumulation indésirable de sécrétions dans les bronches. Cela augmente le risque d'infection des voies respiratoires et de rétrécissement spasmodique des bronches (bronchospasme).

Enfants:

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.

Patients âgés:

La lévodropropizine doit être utilisée avec une prudence particulière chez les patientes et les patients âgés, car il existe des indices d'une modification de la sensibilité à de nombreux médicaments dans ce groupe de patients.

Patients présentant des troubles de la fonction rénale:

La prudence est de mise lors de l'utilisation de ce médicament chez les personnes dont la fonction rénale est fortement réduite (clairance de la créatinine < 35 ml/min).

Prise du sirop Triofan Antitussif Levodrop avec d'autres médicaments:



Informez votre médecin ou votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez ou avez pris récemment, ainsi que de tous les médicaments que vous envisagez de prendre. Dans les études chez l'homme, aucun changement de l'EEG n'a été observé lorsque le sirop Triofan Antitussif Levodrop a été administré en association avec des benzodiazépines.

Chez les personnes particulièrement sensibles, la prudence est de mise lors de la prise concomitante de sédatifs.

Prise du sirop Triofan Antitussif Levodrop avec des aliments et des boissons:

En raison du manque d'informations sur l'effet de la nourriture sur l'absorption du sirop Triofan Antitussif Levodrop, il est recommandé de le prendre entre les repas.

Conduite et utilisation de machines:

Aucune étude n'a été menée pour évaluer les effets sur l'aptitude à conduire ou utiliser des machines. Cependant, comme une somnolence peut survenir occasionnellement (voir rubrique «Quels effets secondaires le sirop Triofan Antitussif Levodrop peut-il provoquer ?») les patients doivent être avertis du risque de somnolence lorsqu'ils conduisent ou utilisent des machines et informés de la possibilité de devoir arrêter l'activité temporairement.

Excipients revêtant un intérêt particulier:

1 ml du sirop Triofan Antitussif Levodrop contient 400 mg de saccharose. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré. Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. Le sirop Triofan Antitussif Levodrop contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E 216), qui peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées). Ce médicament contient 1.39 mg d'alcool (éthanol) par 1 ml de sirop. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte, ou si vous planifiez une grossesse.

Comment utiliser le sirop Triofan Antitussif Levodrop?

Veillez à toujours utiliser ce médicament conformément aux instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne pas utiliser le sirop Triofan Antitussif Levodrop pendant plus de 7 jours sans consulter un médecin.

Enfant à partir de 2 ans et pesant:

10-20 kg: 3 ml de sirop 3 fois par jour;

21-30 kg: 5 ml de sirop 3 fois par jour.

Adultes:

10 ml de sirop jusqu'à 3 fois par jour.

Mode d'administration:



Prenez le sirop Triofan Antitussif Levodrop par voie orale 3 fois par jour à des intervalles d'au moins 6 heures. Le flacon de sirop est fourni avec un gobelet gradué qui permet de mesurer entre autres 3, 5 et 10 ml.

Poursuivez le traitement jusqu'à ce que la toux cesse ou selon les directives de votre médecin. Si votre toux ne s'améliore pas après 7 jours de traitement, cessez de prendre le médicament et consultez votre médecin. Rappelez-vous qu'une toux est un symptôme et que la maladie qui la provoque doit être diagnostiquée et traitée.

Si vous avez pris plus de sirop Triofan Antitussif Levodrop que vous n'auriez dû:

Si vous avez pris une dose du sirop Triofan Antitussif Levodrop supérieure à la dose recommandée, vous devez en informer immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, votre médecin les traitera immédiatement et appliquera, si nécessaire, les mesures d'urgence habituelles (lavage d'estomac, charbon actif, hydratation parentérale, etc.).

Si vous avez oublié de prendre le sirop Triofan Antitussif Levodrop:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Si vous oubliez de prendre le sirop Triofan Antitussif Levodrop, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires le sirop Triofan Antitussif Levodrop peut-il provoquer?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires sont très rares lors de l'utilisation du sirop Triofan Antitussif Levodrop. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de complications graves et les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement, un traitement médicamenteux spécifique n'est qu'occasionnellement nécessaire.

Arrêtez de prendre le sirop Triofan Antitussif Levodrop et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants:

- réactions cutanées sévères (urticaire, démangeaisons) ou de maladies cutanées telles que des cloques (épidermolyse);
- rythme cardiaque irrégulier (risque de bigéminisme auriculaire);
- réaction allergique et anaphylactique sous forme de gonflement, d'essoufflement, de vomissements et de diarrhée;
- coma hypoglycémique (taux de sucre dans le sang dangereusement bas, ce qui peut entraîner une perte de conscience).

Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets secondaires mentionnés, car ils peuvent mettre votre vie en danger:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000):

- irritabilité, somnolence, dépersonnalisation (perception perturbée de soi et de l'environnement);
- vertiges, troubles de l'équilibre, tremblements, picotements, engourdissements;
- palpitations, tachycardie, hypotension;
- essoufflement, toux, gonflement des muqueuses des voies respiratoires;
- maux d'estomac, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée;
-



urticaire, rougeur de la peau, éruption cutanée, démangeaisons, angioœdème (gonflement du visage ou de la gorge pouvant mettre la vie en danger), réactions cutanées;

- manque d'énergie (asthénie) et faiblesse des membres inférieurs.
- réactions allergiques, y compris réactions immédiates, malaise généralisé;

En outre, les effets secondaires suivants sont apparus

- somnolence, diminution de la tension musculaire et vomissements chez le nouveau-né, attribués au passage de la lévodropropizine de la mère allaitante. Les symptômes sont apparus après l'allaitement et ont disparu spontanément après avoir sauté quelques tétées.
- crise d'épilepsie - crise tonico-clonique (grand mal) et non-convulsive (petit mal);
- inflammation de la langue et stomatite aphteuse avec fièvre;
- inflammation causée par l'arrêt de l'écoulement de la bile du foie (hépatite cholestatique);
- dilatation pupillaire et perte de vision. Dans les deux cas, les symptômes ont disparu après l'arrêt du médicament;
- des cas d'œdème généralisé, d'évanouissement et de faiblesse;

L'utilisation du sirop Triofan Antitussif Levodrop comme indiqué dans cette notice réduit le risque d'effets secondaires.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

À utiliser dans les 2 ans après ouverture (mais pas au-delà de la date d'expiration).

Remarques particulières concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C) et dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.

Que contient le sirop Triofan Antitussif Levodrop?

Principes actifs

1 ml de sirop contient 6 mg de lévodropropizine.

Excipients

Saccharose, acide citrique monohydraté, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), arôme orange (contient éthanol), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

70418 (Swissmedic).

Où obtenez-vous le sirop Triofan Antitussif Levodrop? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Le sirop Triofan Antitussif Levodrop est disponible en pharmacies et en drogueries, sans ordonnance médicale, en flacon de 150 ml.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2024 par l'autorité de référence étrangère. Sans ajout d'informations pertinentes pour la sécurité par Swissmedic: mai 2026



