

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch. Sie finden darin alle wichtigen Informationen über dieses Arzneimittel.

Dieses Arzneimittel wurde Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben oder ohne ärztliche Verschreibung von Ihrem Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin übergeben. Um den besten Nutzen zu erzielen, wenden Sie es bitte gemäß der Packungsbeilage bzw. gemäß den Anweisungen Ihres Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an. Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf, damit Sie sie später bei Bedarf noch einmal lesen können.

Bioflorin®

Opella Healthcare Switzerland AG

Was ist Bioflorin und wann wird es angewendet?

Bioflorin wirkt gegen Diarrhoe und normalisiert die gestörte Darmflora, zum Beispiel bei Infektionen durch pathogene Keime oder bei einer Behandlung mit Antibiotika (Abschwächung der Darmflora). Bioflorin besteht aus Bakterien, die normalerweise in der menschlichen Darmflora vorkommen.

Bioflorin ist für bestimmte Erkrankungen indiziert, bei denen die Veränderung der Darmflora und die daraus resultierende Beeinträchtigung des Ökosystems eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere als adjuvante Therapie bei Diarrhoe oder, auf ärztlichen Rat, zusammen mit einer Behandlung mit Antibiotika.

Wann darf Bioflorin nicht angewendet werden?

Abgesehen von möglichen Überempfindlichkeitsreaktionen auf das Produkt sind bislang keine Einschränkungen der Anwendung bekannt.

Wann ist bei der Anwendung von Bioflorin Vorsicht geboten?

Bei Diarrhoe, die länger als 2-3 Tage und bei Kindern länger als 1 Tag anhält, oder bei Fieber sollte unverzüglich ein Arzt bzw. Ärztin aufgesucht werden. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist das Risiko einer Dehydrierung besonders hoch.

Wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie bestimmte Zuckerarten nicht vertragen, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, bevor Sie Bioflorin einnehmen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel einnehmen (oder andere Arzneimittel zur externen Anwendung verwenden) (auch als Selbstmedikation!).

Darf Bioflorin während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen sind keine Risiken für Kinder bekannt, wenn das Arzneimittel bestimmungsgemäss verwendet wird. Es wurde jedoch keine systematische wissenschaftliche Studie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf die Einnahme von Medikamenten verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Bioflorin?

- Bei Diarrhoe beträgt die durchschnittliche Dosis bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen 3 Kapseln pro Tag.
- Zur Vorbeugung von Diarrhoe, z.B. auf Reisen, beträgt sie 2 Kapseln pro Tag.

Die Anwendung von Bioflorin während einer Behandlung mit Antibiotika erfolgt nach den Anweisungen des Arztes bzw. Ihrer Ärztin.



Um die Einnahme von Bioflorin zu erleichtern, können die Kapseln geöffnet und ihr Inhalt mit flüssigen, kalten oder lauwarmen Lebensmitteln gemischt werden.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 5–7 Tage, auch wenn die Symptome bereits im Laufe der ersten Tage abgeklungen sind. Je nach Meinung des Arztes oder der Ärztin und dem Schweregrad der Diarrhoe können die angegebenen Dosen verdoppelt und die Dauer verlängert werden, ohne dass die Gefahr einer Unverträglichkeit besteht.

Bitte halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, dass das Arzneimittel zu schwach oder zu stark wirkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Bioflorin haben?

Bis jetzt wurden keine Nebenwirkungen festgestellt.

Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Wenn Sie eine Packung mit abgelaufenem Verfalldatum haben, geben Sie sie bitte Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin zurück, der/die sie entsorgen wird.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern. Am Ende der Behandlung wird empfohlen, das restliche Medikament nicht mehr aufzubewahren.

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Bioflorin enthalten?

Wirkstoffe

Mindestens 75 Millionen lebende Enterokokken (*Enterococcus lactis*), Stamm SF 68.

Hilfsstoffe

Laktose-Monohydrat, Magnesiumstearat, kolloidales Siliciumoxid, Gelatin, Markierungsfarbe.

Zulassungsnummer

40506 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Bioflorin? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, rezeptfrei.

Erhältlich in Packungen mit 25 und 50 (2 x 25) Kapseln.

Zulassungsinhaber

Opella Healthcare Switzerland AG, Risch.

Diese Packungsbeilage wurde im April 2026 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

